


# Massa

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 38.37 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.36 °C | n sezioni: 416 (su 434 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 12  | 44.9       | 5.54      | 1.14 | 43.92 | 45.5  |
| Rete infrastrutturale       | 16  | 40.7       | 1.34      | 2.68 | 39.85 | 43.14 |
| Impianti sportivi           | 4   | 39.61      | 0.24      | 4.56 | 38.8  | 41.6  |
| Edifici pubblici e servizi  | 45  | 39.39      | 0.03      | 2.22 | 38.17 | 40.99 |
| Tessuto urbano continuo     | 276 | 39.36      | 0.0       | 3.0  | 37.92 | 41.41 |
| Verde urbano                | 3   | 37.38      | -1.98     | 1.98 | 36.72 | 38.52 |
| Acqua e zone umide          | 5   | 36.22      | -3.15     | 1.31 | 35.69 | 35.93 |
| Colture agricole            | 6   | 33.27      | -6.09     | 3.91 | 30.83 | 36.25 |
| Superficie minerale nuda    | 27  | 30.88      | -8.48     | 3.08 | 28.26 | 33.5  |
| Vegetazione naturale        | 22  | 29.56      | -9.8      | 1.94 | 28.3  | 31.1  |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).