


# Reggio\_nellEmilia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 41.06 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 41.15 °C | n sezioni: 1,960 (su 2,393 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n    | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 222  | 43.01      | 1.86      | 2.16 | 41.5  | 44.69 |
| Tessuto urbano continuo     | 1120 | 41.15      | 0.0       | 1.68 | 40.1  | 42.27 |
| Edifici pubblici e servizi  | 177  | 41.03      | -0.12     | 1.86 | 39.75 | 42.31 |
| Impianti sportivi           | 40   | 40.94      | -0.21     | 2.13 | 39.85 | 41.86 |
| Superficie minerale nuda    | 6    | 40.85      | -0.29     | 0.81 | 40.21 | 41.22 |
| Verde urbano                | 127  | 40.84      | -0.31     | 1.56 | 39.88 | 42.1  |
| Rete infrastrutturale       | 62   | 40.71      | -0.44     | 1.64 | 39.61 | 41.84 |
| Colture agricole            | 122  | 38.86      | -2.29     | 1.33 | 37.86 | 39.66 |
| Acqua e zone umide          | 74   | 38.41      | -2.74     | 1.62 | 37.37 | 39.55 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).