


# Roma

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 44.54 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 44.42 °C | n sezioni: 17,457 (su 23,591 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n     | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 833   | 45.98      | 1.56      | 2.52 | 44.21 | 47.77 |
| Impianti sportivi           | 395   | 45.34      | 0.92      | 2.76 | 43.42 | 47.42 |
| Rete infrastrutturale       | 1230  | 45.21      | 0.79      | 2.58 | 43.6  | 46.96 |
| Edifici pubblici e servizi  | 2525  | 44.79      | 0.37      | 2.32 | 43.29 | 46.39 |
| Colture agricole            | 827   | 44.45      | 0.02      | 2.9  | 42.56 | 46.56 |
| Tessuto urbano continuo     | 10067 | 44.42      | 0.0       | 2.11 | 42.95 | 45.91 |
| Verde urbano                | 900   | 44.16      | -0.26     | 2.71 | 42.47 | 45.92 |
| Superficie minerale nuda    | 330   | 44.15      | -0.27     | 2.71 | 42.49 | 46.07 |
| Vegetazione naturale        | 29    | 39.42      | -5.0      | 2.66 | 37.43 | 40.67 |
| Acqua e zone umide          | 156   | 37.63      | -6.79     | 2.69 | 35.9  | 39.24 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).