


Siracusa

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 44.22 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 44.08 °C | n sezioni: 563 (su 730 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Impianti sportivi	9	46.71	2.64	1.52	46.1	47.51
Colture agricole	46	46.53	2.45	1.54	45.99	47.33
Superficie impervia pesante	13	45.8	1.72	2.05	44.19	47.33
Superficie minerale nuda	5	44.62	0.55	2.18	43.15	46.08
Verde urbano	8	44.54	0.46	1.65	43.9	45.9
Tessuto urbano continuo	372	44.08	0.0	1.98	43.48	45.2
Edifici pubblici e servizi	56	44.03	-0.05	2.62	43.05	45.4
Rete infrastrutturale	38	43.7	-0.37	4.07	40.09	46.82
Acqua e zone umide	15	39.68	-4.4	2.76	38.67	41.01

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).