


Trani

Puglia | Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 43.07 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 42.36 °C | n sezioni: 261 (su 566 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Colture agricole	25	45.41	3.05	1.31	44.53	46.42
Impianti sportivi	5	45.12	2.76	1.74	44.55	46.12
Rete infrastrutturale	30	44.57	2.21	3.26	43.59	46.93
Superficie impervia pesante	7	43.55	1.18	1.95	43.5	44.54
Superficie minerale nuda	21	43.45	1.09	1.96	42.47	44.48
Edifici pubblici e servizi	24	43.02	0.66	2.27	41.14	45.17
Tessuto urbano continuo	140	42.36	0.0	1.23	41.78	43.14
Verde urbano	4	40.92	-1.44	2.32	40.43	42.35
Acqua e zone umide	3	38.0	-4.36	1.3	37.26	38.51

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).