


# Brindisi

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 43.45 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 43.28 °C | n sezioni: 1,403 (su 1,403 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Colture agricole            | 120 | 45.02      | 1.74      | 1.79 | 44.08 | 46.18 |
| Edifici pubblici e servizi  | 210 | 43.95      | 0.66      | 2.45 | 43.0  | 45.57 |
| Impianti sportivi           | 27  | 43.81      | 0.52      | 1.5  | 43.06 | 44.8  |
| Superficie impervia pesante | 45  | 43.76      | 0.48      | 1.25 | 42.82 | 44.69 |
| Tessuto urbano continuo     | 875 | 43.28      | 0.0       | 1.28 | 42.59 | 44.03 |
| Rete infrastrutturale       | 58  | 42.98      | -0.31     | 2.64 | 41.97 | 44.5  |
| Verde urbano                | 25  | 42.13      | -1.15     | 1.62 | 41.4  | 42.81 |
| Superficie minerale nuda    | 29  | 41.73      | -1.55     | 6.23 | 41.74 | 46.38 |
| Acqua e zone umide          | 5   | 34.52      | -8.76     | 0.23 | 34.42 | 34.68 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).