


Imperia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 37.84 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 38.06 °C | n sezioni: 466 (su 466 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Impianti sportivi	8	39.2	1.14	1.9	38.31	40.28
Superficie impervia pesante	19	38.49	0.43	2.49	36.1	40.83
Tessuto urbano continuo	314	38.06	0.0	1.91	36.68	39.61
Edifici pubblici e servizi	47	38.01	-0.05	2.25	36.25	39.56
Rete infrastrutturale	38	37.33	-0.73	2.08	35.46	39.25
Verde urbano	5	36.48	-1.58	2.08	35.6	37.17
Acqua e zone umide	11	35.8	-2.26	3.28	33.47	38.52
Superficie minerale nuda	6	35.39	-2.67	1.6	34.21	36.81
Colture agricole	10	34.04	-4.02	1.15	32.96	34.9

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unite amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).