


Isernia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.30 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.77 °C | n sezioni: 337 (su 337 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Verde urbano	6	42.03	1.26	1.39	41.11	42.99
Edifici pubblici e servizi	48	41.11	0.34	2.27	39.96	42.79
Impianti sportivi	7	40.99	0.22	2.39	39.28	42.86
Tessuto urbano continuo	207	40.77	0.0	1.81	39.3	42.3
Superficie impervia pesante	23	40.39	-0.38	1.78	39.42	41.62
Colture agricole	6	38.2	-2.56	1.96	36.8	39.25
Rete infrastrutturale	13	38.15	-2.62	2.6	36.07	39.93
Vegetazione naturale	19	35.33	-5.43	1.92	34.69	36.63
Superficie minerale nuda	3	34.53	-6.23	3.37	32.78	36.14

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).