


Trani

Puglia | Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 42.64 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 42.33 °C | n sezioni: 566 (su 566 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Colture agricole	25	45.41	3.08	1.31	44.53	46.42
Impianti sportivi	5	45.12	2.79	1.74	44.55	46.12
Rete infrastrutturale	38	43.98	1.65	3.33	43.04	46.61
Superficie impervia pesante	7	43.55	1.21	1.95	43.5	44.54
Superficie minerale nuda	21	43.45	1.12	1.96	42.47	44.48
Edifici pubblici e servizi	43	42.41	0.08	2.18	41.1	43.62
Tessuto urbano continuo	410	42.33	0.0	1.02	41.8	42.94
Verde urbano	7	41.81	-0.52	2.04	41.82	42.62
Acqua e zone umide	3	38.0	-4.33	1.3	37.26	38.51

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).