


# Venezia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 39.58 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.31 °C | n sezioni: 4,548 (su 4,548 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n    | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 194  | 41.67      | 1.36      | 2.94 | 39.86 | 43.87 |
| Tessuto urbano continuo     | 2932 | 40.31      | 0.0       | 1.97 | 39.13 | 41.75 |
| Edifici pubblici e servizi  | 430  | 39.79      | -0.53     | 2.38 | 38.54 | 41.49 |
| Rete infrastrutturale       | 135  | 39.03      | -1.28     | 3.32 | 37.06 | 41.3  |
| Impianti sportivi           | 66   | 38.4       | -1.91     | 2.36 | 36.53 | 40.17 |
| Verde urbano                | 154  | 38.19      | -2.12     | 2.95 | 36.22 | 40.47 |
| Colture agricole            | 354  | 37.24      | -3.07     | 1.64 | 36.4  | 38.21 |
| Vegetazione naturale        | 10   | 35.06      | -5.25     | 2.0  | 33.44 | 36.5  |
| Superficie minerale nuda    | 1    | 34.46      | -5.85     | nan  | 34.46 | 34.46 |
| Acqua e zone umide          | 165  | 31.29      | -9.02     | 2.72 | 29.22 | 32.97 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 è parziale (stagione in corso).