


# Barletta

Puglia | Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 43.28 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 43.08 °C | n sezioni: 501 (su 501 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Impianti sportivi           | 8   | 44.97      | 1.89      | 2.12 | 43.3  | 46.88 |
| Superficie minerale nuda    | 14  | 44.95      | 1.87      | 2.2  | 43.71 | 45.93 |
| Superficie impervia pesante | 22  | 44.74      | 1.66      | 1.07 | 44.03 | 45.27 |
| Colture agricole            | 56  | 43.66      | 0.58      | 1.39 | 42.72 | 44.47 |
| Rete infrastrutturale       | 28  | 43.48      | 0.4       | 1.27 | 42.77 | 44.54 |
| Tessuto urbano continuo     | 307 | 43.08      | 0.0       | 0.79 | 42.6  | 43.55 |
| Edifici pubblici e servizi  | 38  | 43.01      | -0.07     | 2.29 | 42.04 | 44.37 |
| Acqua e zone umide          | 19  | 42.21      | -0.87     | 2.01 | 40.96 | 43.63 |
| Verde urbano                | 5   | 42.11      | -0.97     | 1.32 | 41.32 | 42.97 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).