


# Bergamo

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.48 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.79 °C | n sezioni: 917 (su 1,067 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 54  | 43.41      | 2.62      | 2.43 | 41.68 | 45.21 |
| Edifici pubblici e servizi  | 142 | 41.27      | 0.48      | 2.19 | 39.91 | 42.9  |
| Tessuto urbano continuo     | 471 | 40.79      | 0.0       | 2.7  | 39.34 | 42.86 |
| Rete infrastrutturale       | 52  | 40.73      | -0.06     | 2.12 | 39.23 | 42.04 |
| Impianti sportivi           | 28  | 40.5       | -0.29     | 2.32 | 39.73 | 41.51 |
| Superficie minerale nuda    | 5   | 40.18      | -0.61     | 0.51 | 40.32 | 40.44 |
| Verde urbano                | 64  | 39.77      | -1.02     | 1.99 | 38.27 | 41.19 |
| Colture agricole            | 83  | 37.39      | -3.4      | 2.2  | 35.82 | 38.71 |
| Vegetazione naturale        | 15  | 32.32      | -8.47     | 1.46 | 31.11 | 33.26 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).