


# Catanzaro

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 41.79 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 41.79 °C | n sezioni: 614 (su 614 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 46  | 43.47      | 1.68      | 2.17 | 42.37 | 44.98 |
| Impianti sportivi           | 31  | 43.41      | 1.62      | 2.5  | 42.24 | 44.88 |
| Superficie minerale nuda    | 10  | 42.82      | 1.03      | 1.68 | 42.36 | 43.78 |
| Verde urbano                | 10  | 42.67      | 0.88      | 2.4  | 41.0  | 44.27 |
| Edifici pubblici e servizi  | 90  | 42.14      | 0.35      | 2.07 | 40.79 | 43.51 |
| Rete infrastrutturale       | 56  | 41.89      | 0.1       | 2.53 | 41.31 | 43.48 |
| Tessuto urbano continuo     | 230 | 41.79      | 0.0       | 2.13 | 40.74 | 43.32 |
| Colture agricole            | 86  | 41.04      | -0.75     | 3.69 | 37.82 | 44.24 |
| Acqua e zone umide          | 36  | 40.1       | -1.7      | 2.71 | 38.62 | 41.83 |
| Vegetazione naturale        | 16  | 38.22      | -3.57     | 3.3  | 36.12 | 40.79 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).