


# Cremona

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 39.16 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.54 °C | n sezioni: 982 (su 1,247 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Superficie impervia pesante | 101 | 39.97      | 0.43      | 2.66 | 37.9  | 41.67 |
| Tessuto urbano continuo     | 648 | 39.54      | 0.0       | 1.79 | 38.44 | 40.91 |
| Edifici pubblici e servizi  | 70  | 39.25      | -0.29     | 1.55 | 38.17 | 40.6  |
| Rete infrastrutturale       | 45  | 38.8       | -0.74     | 2.48 | 37.84 | 40.33 |
| Verde urbano                | 32  | 38.0       | -1.53     | 2.05 | 36.9  | 39.45 |
| Impianti sportivi           | 21  | 37.78      | -1.76     | 1.69 | 36.5  | 38.44 |
| Vegetazione naturale        | 6   | 35.67      | -3.87     | 1.58 | 34.78 | 36.49 |
| Colture agricole            | 52  | 35.66      | -3.87     | 1.86 | 34.55 | 37.08 |
| Acqua e zone umide          | 6   | 31.78      | -7.76     | 2.07 | 31.06 | 32.74 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).