


# Isernia

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 40.30 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 40.77 °C | n sezioni: 337 (su 337 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD\_TIPO\_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)



\* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)




Tabella statistiche per macro-classe

| Macro-classe                | n   | Media (°C) | Δ vs base | Std  | Q25   | Q75   |
|-----------------------------|-----|------------|-----------|------|-------|-------|
| Verde urbano                | 6   | 42.03      | 1.26      | 1.39 | 41.11 | 42.99 |
| Edifici pubblici e servizi  | 48  | 41.11      | 0.34      | 2.27 | 39.96 | 42.79 |
| Impianti sportivi           | 7   | 40.99      | 0.22      | 2.39 | 39.28 | 42.86 |
| Tessuto urbano continuo     | 207 | 40.77      | 0.0       | 1.81 | 39.3  | 42.3  |
| Superficie impervia pesante | 23  | 40.39      | -0.38     | 1.78 | 39.42 | 41.62 |
| Colture agricole            | 6   | 38.2       | -2.56     | 1.96 | 36.8  | 39.25 |
| Rete infrastrutturale       | 13  | 38.15      | -2.62     | 2.6  | 36.07 | 39.93 |
| Vegetazione naturale        | 19  | 35.33      | -5.43     | 1.92 | 34.69 | 36.63 |
| Superficie minerale nuda    | 3   | 34.53      | -6.23     | 3.37 | 32.78 | 36.14 |

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD\_TIPO\_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).