

СПАС — 30 сценариев первой помощи

Печатное издание для школ без интернета. Каждая страница — одна ситуация. Не заменяет звонок 112/103.

♥ Остановка сердца у взрослого

□ Экстренный: 112

Человек упал, не дышит или дышит судорожно

1. {'text': 'Убедитесь, что место безопасно: машины, ток, огонь, вода. Если нет — НЕ подходите.'}
2. {'text': 'Окликните пострадавшего. Потрясите за плечо. Если не реагирует — он без сознания.'}
3. {'text': 'Запрокиньте голову, поднимите подбородок. Смотрите на грудную клетку 10 секунд: дышит ровно?'}
4. {'text': 'Если нет дыхания или дыхание судорожное (агональное) — это остановка сердца. Действуйте.'}
5. {'text': '"Звоните 112 (или 103). Включите громкую связь. Скажите: 'остановка сердца', адрес, ориентиры.'"}
6. {'text': 'Попросите кого-то рядом принести АНД (автоматический наружный дефибриллятор) — есть в торговых центрах, метро, аэропортах.'}
7. {'text': 'Положите пострадавшего на твёрдую ровную поверхность лицом вверх. Расстегните одежду на груди.'}
8. {'text': 'Поставьте основание ладони на центр грудины (между сосками). Вторую ладонь — сверху, пальцы переплетите.'}
9. {'text': 'Жмите ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ. Глубина 5-6 см. Темп 100-120 в минуту. Не бойтесь сломать рёбра — это норма.'}
10. {'text': 'Каждые 30 компрессий — 2 вдоха рот в рот (если умеете и готовы). Не умеете — жмите без перерыва.'}
11. {'text': 'Не останавливайтесь до приезда скорой или появления признаков жизни. Меняйтесь с другим спасателем каждые 2 минуты.'}
12. {'text': 'Если принесли АНД — включите его, наклейте электроды как нарисовано, выполняйте голосовые подсказки.'}

□ Остановка сердца у ребёнка (1-8 лет)

□ Экстренный: 112

Ребёнок без сознания, не дышит

1. {'text': 'Безопасность места. Окликните ребёнка, легко потрясите.'}
2. {'text': 'Если не реагирует — звоните 112. Громкая связь.'}
3. {'text': 'Запрокиньте голову, проверьте дыхание 10 секунд.'}
4. {'text': 'Если не дышит — 5 спасательных вдохов рот-в-рот-и-нос (мягко, объёмом своих щёк).')}
5. {'text': 'После 5 вдохов — компрессии. У ребёнка глубина $\approx 1/3$ толщины грудной клетки (≈ 5 см).')}
6. {'text': 'Темп тот же: 100-120 в минуту. Жмите ОДНОЙ ладонью (или двумя пальцами для младенца до 1 года).')}
7. {'text': 'Цикл: 30 компрессий + 2 вдоха. Не останавливайтесь до приезда СМП.'}

■ Остановка сердца у младенца (до 1 года)

■ Экстренный: 112

Младенец вялый, синюшный, не дышит

1. {'text': 'Окликните. Слегка пощипайте за пятку. Не трясите.'}
 2. {'text': 'Звоните 112, громкая связь.'}
 3. {'text': 'Запрокиньте голову СЛЕГКА (нейтральное положение). Проверьте дыхание 10 секунд.'}
 4. {'text': '5 спасательных вдохов: ваш рот закрывает РОТ И НОС младенца, объём — щёки.'}
 5. {'text': 'Компрессии ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ (указательным и средним) на середине грудины, чуть ниже линии сосков.'}
 6. {'text': 'Глубина $\approx$ 4 см (1/3 толщины груди). Темп 100-120 в минуту.'}
 7. {'text': 'Цикл 30 : 2. Не прерывайте до СМП.'}
-

■ Удушье (подавился) — взрослый или ребёнок > 1 года

■ Экстренный: 112

Не может говорить, кашлять, держится за горло

1. {'text': '"Спросите: \'Ты подавился?\''. Если кивает и не может говорить — действуйте."}
 2. {'text': 'Наклоните вперёд. Сделайте 5 ударов между лопаток основанием ладони.'}
 3. {'text': 'Если не помогло — приём Геймлиха: встаньте сзади, обхватите руками, кулак в эпигастрий, второй ладонью прижмите, резко толкните вверх и на себя. До 5 раз.'}
 4. {'text': 'Чередуйте: 5 ударов между лопаток + 5 толчков Геймлиха. До отхождения предмета.'}
 5. {'text': 'Если потерял сознание — уложите на спину, вызовите 112, начинайте СЛР.'}
-

■ Удушье у младенца (до 1 года)

■ Экстренный: 112

Младенец задыхается, посинел

1. {'text': 'Положите младенца лицом вниз на ваше предплечье, голова ниже туловища. Голова поддержана вашей ладонью.'}
 2. {'text': '5 ударов между лопаток основанием ладони.'}
 3. {'text': 'Перевернуть на спину, голова ниже туловища. 5 толчков двумя пальцами в центр грудины.'}
 4. {'text': 'Чередовать. Если потерял сознание — звонок 112, СЛР младенца.'}
-

☐ **Сильное артериальное кровотечение**

☐ Экстренный: 112

Кровь бьёт фонтаном, ярко-красная

1. {'text': 'Ваша безопасность: перчатки или чистая ткань между вашей и его кровью.'}
 2. {'text': 'ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ. Прижмите рану плотным куском ткани с силой обеими руками.'}
 3. {'text': 'Не отнимайте руки 5–10 минут. Сверху можно добавлять ткань, не убирая нижнюю.'}
 4. {'text': 'Если конечность — поднимите выше уровня сердца.'}
 5. {'text': 'Звоните 112.'}
 6. {'text': 'Жгут — только если давление НЕ останавливает кровь и есть угроза смерти. Накладывается на 10 см выше раны, на одежду или подкладку, ЗАПИСАТЬ ВРЕМЯ. Не более 1 часа летом, 30 мин зимой.'}
 7. {'text': 'Не давайте пить и есть. Согрейте, успокойте.'}
-

☐ **Ожог (термический)**

☐ Экстренный: 112

Кипяток, огонь, горячий металл

1. {'text': 'Удалите источник: уведите от огня, снимите одежду, если она НЕ ПРИКЛЕИЛАСЬ.'}
 2. {'text': 'Прохладная (НЕ ледяная) вода 15–20 минут на ожог. Это критично, не пропускайте.'}
 3. {'text': 'Снимите кольца, часы выше места ожога — потом будет отёк.'}
 4. {'text': 'Накройте чистой влажной тканью или специальной повязкой.'}
 5. {'text': 'НЕ мажьте маслом, сметаной, мочой, зубной пастой, спиртом.'}
 6. {'text': 'Большая площадь (> ладони), лицо, шея, кисть, пах, дети — звонок 112.'}
 7. {'text': 'Обезболивающее (парацетамол / ибупрофен) — можно.'}
-

⚡ **Удар электрическим током**

☐ Экстренный: 112

Человек на проводах, не отпускает источник

1. {'text': 'ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ! Не трогайте человека голыми руками, пока ток не отключён.'}
 2. {'text': 'Обесточьте источник: выключите рубильник, выньте вилку. Если не можете — отбросьте провод сухой деревяшкой/пластиком, стоя на сухой резине/дереве.'}
 3. {'text': 'После того как ток отключён — оцените сознание и дыхание.'}
 4. {'text': 'Если не дышит — звонок 112, СЛР.'}
 5. {'text': 'Если в сознании — уложите, согрейте, ищите ожоги в местах входа/выхода тока (часто кисти и стопы).'} - 6. {'text': 'Любой удар током — обязательная госпитализация! Скрытая травма сердца возможна.'}
-

□ Утопление

□ Экстренный: 112

Извлекли из воды, не дышит

1. {'text': 'Безопасность: не лезьте в воду без подготовки. Бросьте плавающий предмет, спасательный круг, верёвку.'}
 2. {'text': 'На берегу: проверьте сознание и дыхание.'}
 3. {'text': 'Если не дышит — звонок 112. Запрокиньте голову. 5 СПАСАТЕЛЬНЫХ ВДОХОВ (важно, утопление = гипоксия, начните с вдохов).'}
5 СПАСАТЕЛЬНЫХ ВДОХОВ (важно, утопление = гипоксия, начните с вдохов).}
 4. {'text': 'Если нет признаков жизни — компрессии в обычном режиме 30:2.'}
 5. {'text': 'Слив воды из лёгких НЕ НУЖЕН и опасен — теряете время. Сразу СЛР.'}
 6. {'text': 'После восстановления дыхания — на бок, согреть, вызвать СМП всегда (риск отёка лёгких до 72 часов).'}
(риск отёка лёгких до 72 часов).}
-

□ Инсульт

□ Экстренный: 112

Внезапная асимметрия лица, слабость в руке, нарушение речи

1. {'text': "Тест 'УДАР': У — улыбка (асимметрична?), Д — два языка (попросить произнести фразу — нечёткая речь?), А — Айда руки поднять (одна падает?), Р — решение — звонок 112."}
 2. {'text': 'Запомните ВРЕМЯ начала симптомов — врачам это важно (окно тромболизиса — 4,5 часа).'}
окно тромболизиса — 4,5 часа).}
 3. {'text': 'Уложите с приподнятой головой 30°. Не давайте есть и пить.'}
 4. {'text': 'Не давайте лекарства, кроме тех, что человек уже принимает (по назначению).'}
по назначению).}
 5. {'text': 'Откройте окно. Расстегните воротник, ремень.'}
 6. {'text': 'Не оставляйте одного — следите за дыханием. Если потеряет сознание и перестанет дышать — СЛР.'}
-

□ Инфаркт миокарда

□ Экстренный: 112

Сильная боль за грудиной > 15 мин, отдаёт в левую руку, челюсть

1. {'text': 'Прекратите любую нагрузку. Усадите с опорой, расслабьте одежду.'}
 2. {'text': "Звонок 112. Скажите 'подозрение на инфаркт'."}
 3. {'text': 'Если человек УЖЕ принимает нитроглицерин — 1 таблетка под язык, через 5 мин ещё одна (макс 3).'}
через 5 мин ещё одна (макс 3).}
 4. {'text': 'Аспирин 250–500 мг РАЗЖЕВАТЬ (если нет аллергии и язвы).'}
РАЗЖЕВАТЬ (если нет аллергии и язвы).}
 5. {'text': 'НЕ давайте есть и пить.'}
 6. {'text': 'Следите за дыханием. Если потерял сознание и не дышит — СЛР.'}
-

■ Анафилаксия (тяжёлая аллергическая реакция)

□ Экстренный: 112

Отёк лица/гортани, удушье, сыпь после укуса/еды/лекарства

1. {'text': 'Звонок 112 НЕМЕДЛЕННО.'}
 2. {'text': 'Если есть автоинъектор адреналина (EpiPen / Эпипен) — введите в наружную поверхность БЕДРА через одежду. Ждите 5 мин — если нет улучшения, второй укол.'}
 3. {'text': 'Удалите источник аллергена (жало пчелы, прекратить приём препарата).')}
 4. {'text': 'Уложите на спину, ноги выше — для притока крови к мозгу. Если отёк гортани и удобнее сидеть — можно сидя.'}
 5. {'text': 'Если есть антигистаминное (цетиризин, лоратадин) — дать.'}
 6. {'text': 'Готовьтесь к СЛР, если потеряет сознание.'}
-

■ Эпилептический приступ

□ Экстренный: 112

Судороги, потеря сознания, пена

1. {'text': 'НЕ держите конечности силой. Уберите острые/твёрдые предметы рядом.'}
 2. {'text': 'Подложите что-нибудь мягкое под голову.'}
 3. {'text': 'НЕ суйте в рот ничего (ложку, палец) — повредите зубы и можете перекрыть дыхание.'}
 4. {'text': 'Засеките время. Большинство приступов — 1-3 минуты.'}
 5. {'text': 'Когда судороги пройдут — поверните на бок (восстановительное положение), чтобы не захлебнулся слюной.'}
 6. {'text': 'Звоните 112 если: приступ > 5 мин, повторяется, человек беременная/диабетик, травма при падении, первый приступ в жизни.'}
-

☹ Обморок

□ Экстренный: 103

Кратковременная потеря сознания

1. {'text': 'Уложите на спину. Поднимите ноги выше уровня сердца на 30 см.'}
 2. {'text': 'Расстегните воротник, ремень. Откройте окно.'}
 3. {'text': 'Не суйте под нос нашатырь близко — рефлекторное запрокидывание головы опасно. Можно кратко на расстоянии 10 см.'}
 4. {'text': 'Когда придёт в себя — не давайте сразу вставать. 5-10 мин полежать.'}
 5. {'text': 'Звонок 112 если: не приходит в себя > 1 мин, удар головой при падении, есть боль в груди или одышка, повторный обморок.'}
-

☐ Гипогликемия (низкий сахар у диабетика)

☐ Экстренный: 103

Слабость, потливость, дрожь, спутанность у больного диабетом

1. {'text': 'Если в сознании — дайте быстрый сахар: 3-4 кусочка сахара / стакан сока / 2 ст.л. мёда / глюкозу из аптечки.'}
 2. {'text': 'Через 10-15 мин — проверьте сахар глюкометром, если есть. Должно быть лучше.'}
 3. {'text': 'После — сложный углевод (хлеб, печенье, каша).')}
 4. {'text': 'Если без сознания — НЕ давайте ничего в рот. На бок, звонок 112. У диабетиков может быть глюкагон в шприце — введите внутримышечно по инструкции.'}
-

☐ Переохлаждение

☐ Экстренный: 112

Долго на холоде, дрожь сменилась апатией

1. {'text': 'Перенесите в тёплое место. Снимите мокрую одежду.'}
 2. {'text': 'Заверните в одеяла, термопокрывало. Грейте подмышечные впадины, шею, пах (магистральные сосуды).')}
 3. {'text': 'Если в сознании — тёплое сладкое питьё. НЕ алкоголь, НЕ кофе.'}
 4. {'text': 'НЕ растирайте снегом, НЕ опускайте сразу в горячую воду — рискуете остановкой сердца.'}
 5. {'text': 'Звонок 112 при тяжёлом переохлаждении: апатия, спутанность, $T < 35^{\circ}\text{C}$.'}
 6. {'text': '"Если без сознания и не дышит — СЛР; продолжайте дольше обычного, при гипотермии возможна 'мнимая смерть'."'
-

☀ Тепловой / солнечный удар

☐ Экстренный: 103

Слабость, головная боль, тошнота, $T > 39^{\circ}\text{C}$ после жары

1. {'text': 'В тень / прохладное помещение. Лечь, ноги выше головы.'}
 2. {'text': 'Снять лишнюю одежду, расстегнуть.'}
 3. {'text': 'Холодные мокрые компрессы на шею, подмышки, пах. Обмахивать.'}
 4. {'text': 'Если в сознании — пить прохладную воду маленькими глотками, лучше с щепоткой соли.'}
 5. {'text': 'Звонок 112 если: $T > 40^{\circ}\text{C}$, потеря сознания, рвота, судороги.'}
-

☐ Отравление угарным газом

☐ Экстренный: 112

Головная боль, тошнота, спутанность в задымлённом/закрытом помещении

1. {'text': 'СНАЧАЛА БЕЗОПАСНОСТЬ. Не лезьте в задымлённое помещение без СИЗ. Если зашли — низко по полу, защитите дыхание мокрой тканью.'}
 2. {'text': 'Вынесите пострадавшего на свежий воздух.'}
 3. {'text': 'Звонок 112.'}
 4. {'text': 'Расстегните одежду. Если в сознании — кислород, тёплое сладкое питьё.'}
 5. {'text': 'Если без сознания, не дышит — СЛР.'}
 6. {'text': '"Обязательная госпитализация даже при кажущемся улучшении: возможна 'отсроченная' энцефалопатия через несколько дней.'"}
-

☐ Алкогольное отравление

☐ Экстренный: 112

Сильное опьянение, рвота, спутанность

1. {'text': 'Положите на бок (восстановительное положение). Это критично — пьяный может захлебнуться рвотой.'}
 2. {'text': 'Расстегните одежду. Тепло (одеяло).'} - 3. {'text': 'Если в сознании — небольшие глотки воды. Не давайте кофе, не лейте холодную воду.'}
 - 4. {'text': 'Звонок 112 если: не реагирует, дыхание < 8 в минуту, синюшность, судороги, гипотермия, рвота с кровью, подозрение на смесь алкоголя с лекарствами/наркотиками.'}
 - 5. {'text': 'Не оставляйте одного. Контроль дыхания каждые несколько минут.'}
-

☠ Отравление (лекарства, бытовая химия)

☐ Экстренный: 112

Принял лекарства/химию, рвота, спутанность

1. {'text': 'Звонок 112. Соберите упаковку/название вещества — это важно для врачей.'}
 2. {'text': 'НЕ вызывайте рвоту, если: проглотил кислоту/щёлочь/нефтепродукт/острое; человек без сознания; беременная; ребёнок < 1 года.'}
 3. {'text': 'В остальных случаях — 1 стакан воды, рвоту НЕ вызывать без указания врача.'}
 4. {'text': 'Активированный уголь — 1 таб. на 10 кг, если в сознании и нет противопоказаний (не при отравлении кислотой/щёлочью/нефтепродуктами).'} - 5. {'text': 'На бок, контроль дыхания. Сохраните остатки вещества и рвоту в пакете для врачей.'}
-

□ Перелом конечности

□ Экстренный: 112

Деформация, сильная боль, неподвижность

1. {'text': 'НЕ вправляйте. НЕ заставляйте ходить, не поднимайте.'}
 2. {'text': 'Иммобилизация: захватываем 2 ближайших сустава. Подойдут доска, палка, картон, рулон газет, привязать к здоровой ноге.'}
 3. {'text': 'Если кость наружу (открытый перелом) — НЕ вправляйте. Накройте чистой тканью.'}
 4. {'text': 'Холод (лёд через ткань) на 15 мин — снимает отёк.'}
 5. {'text': 'Обезболивающее (парацетамол / ибупрофен) — можно.'}
 6. {'text': 'Звонок 112. Самостоятельная транспортировка в травмпункт — только при иммобилизации и стабильном состоянии.'}
-

□ Травма головы

□ Экстренный: 112

Удар по голове, спутанность, рвота, амнезия

1. {'text': 'Не двигайте без необходимости — есть риск травмы шейного отдела.'}
 2. {'text': 'Если в сознании — лёгкое возвышение головы (15°). Без сознания — на бок, фиксируя голову и шею.'}
 3. {'text': 'Холод на место удара через ткань 15 мин.'}
 4. {'text': 'Не давайте есть и пить.'}
 5. {'text': 'Звонок 112 при: потере сознания (любой длительности), рвоте, амнезии, неравных зрачках, судорогах, прозрачной жидкости из уха/носа, удар у ребёнка/пожилого/принимающего антикоагулянты.'}
 6. {'text': 'Наблюдение 24 часа — даже если кажется норм. Симптомы могут проявиться позже.'}
-

□ Подозрение на травму позвоночника

□ Экстренный: 112

Падение с высоты, ДТП, ныряние — боль в спине, онемение

1. {'text': 'НЕ ДВИГАЙТЕ человека без необходимости.'}
 2. {'text': 'Звонок 112.'}
 3. {'text': 'Стабилизируйте голову руками в нейтральном положении (как лежал).'}
{'text': 'Если нужно перевернуть (рвота, нет дыхания) — поворот 'единым блоком': минимум 3 человека, голова-шея-плечи-таз одной осью.'}
 5. {'text': 'Под голову — валик из одежды, чтобы не двигалась. Держите до приезда СМП.'}
-

❑ Проникающее ранение груди

❑ Экстренный: 112

Открытая рана груди, шипящий звук

1. {'text': 'Звонок 112.'}
 2. {'text': 'Если в ране ОСТАЛСЯ предмет — НЕ ВЫНИМАЙТЕ. Зафиксируйте.'}
 3. {'text': 'На рану — 'клапанная' повязка: пакет/плёнка, приклеенный пластырем С ТРЁХ СТОРОН. Это даёт воздуху выходить, но не входить.'}
 4. {'text': 'Усадите наклонив на повреждённый бок (если в сознании).'} - 5. {'text': 'Контроль дыхания и сознания.'}
-

❑ Проникающее ранение живота

❑ Экстренный: 112

Рана живота, видны внутренности

1. {'text': 'Звонок 112.'}
 2. {'text': 'Если выпали внутренние органы — НЕ ВПРАВЛЯЙТЕ. Накройте чистой влажной тканью.'}
 3. {'text': 'Уложите на спину с согнутыми коленями — расслабляет мышцы живота.'}
 4. {'text': 'НЕ давайте есть, пить, лекарства внутрь.'}
 5. {'text': 'Согрейте, успокойте.'}
-

❑ Носовое кровотечение

❑ Экстренный: 103

Кровь из носа

1. {'text': 'Сядьте, наклонитесь ВПЕРЕД (не запрокидывайте голову — кровь стечёт в желудок).'} - 2. {'text': 'Зажмите крылья носа на 10–15 минут. Дышите ртом.'}
 - 3. {'text': 'Холод на переносицу через ткань.'}
 - 4. {'text': 'Если через 20 минут не остановилось — звонок 103.'}
 - 5. {'text': 'Если кровь из носа после удара головой / прозрачная жидкость с кровью — это признак травмы черепа, звонок 112.'}
-

☐ Паническая атака

☐ Экстренный: 103

Внезапный страх, одышка, сердцебиение, ощущение смерти

1. {'text': "Останьтесь рядом. Спокойный голос: 'Это паническая атака. Это не опасно. Я с тобой.'"} }
 2. {'text': 'Дыхание квадратом: вдох 4 сек, задержка 4 сек, выдох 4 сек, пауза 4 сек. Повторять 5 минут.'} }
 3. {'text': 'Метод 5-4-3-2-1: назвать 5 предметов, что видишь; 4 — что слышишь; 3 — что чувствуешь телом; 2 — что нюхаешь; 1 — что пробуешь на вкус.'} }
 4. {'text': 'Прохладная вода на лицо или попить.'} }
 5. {'text': "Не говорите 'успокойся' и 'возьми себя в руки'. Это бесполезно и обижает."} }
 6. {'text': 'Если впервые в жизни, или есть боль в груди / онемение лица / нарушение речи — звонок 103, чтобы исключить инфаркт/инсульт.'} }
-

☐ Приступ бронхиальной астмы

☐ Экстренный: 112

Свист при выдохе, одышка у астматика

1. {'text': "Усадите, опираясь руками на колени или стол (поза 'кучера')."} }
 2. {'text': 'Расстегните одежду на груди.'} }
 3. {'text': 'Если есть ингалятор (сальбутамол / Вентолин) — 2 вдоха через спейсер если есть. Через 5 мин — повторить ещё 2 вдоха.'} }
 4. {'text': 'Открыть окно. Спокойствие.'} }
 5. {'text': 'Если не помогает 10 минут, или речь обрывистая, синюшность губ, ЧСС > 120 — звонок 112.'} }
-

* Обморожение

☐ Экстренный: 112

Бледная, твёрдая, нечувствительная кожа

1. {'text': 'В тепло. Снимите тесную обувь, кольца до отёка.'} }
 2. {'text': 'НЕ растирайте снегом, спиртом, маслом.'} }
 3. {'text': 'Постепенное согревание: тёплая вода 37–39°C 20–40 минут (до восстановления чувствительности).'} }
 4. {'text': 'Сухая стерильная повязка между пальцами.'} }
 5. {'text': 'Тёплое питьё.'} }
 6. {'text': 'Звонок 112, если белая/чёрная кожа, пузыри, обширно или у ребёнка.'} }
-

□ Укус змеи

□ Экстренный: 112

Двойной прокол, отёк, боль

1. {'text': 'Уйдите от змеи. Запомните её внешний вид.'}
 2. {'text': 'Звонок 112.'}
 3. {'text': 'НЕ отсасывайте яд. НЕ режьте рану. НЕ накладывайте жгут.'}
 4. {'text': 'Иммобилизуйте конечность как при переломе. Снимите кольца, часы.'}
 5. {'text': 'Поите водой. Не давайте алкоголь и кофе.'}
 6. {'text': 'Транспортируйте в больницу как можно быстрее.'}
-

Дисклеймер

Этот документ — справочный. В реальной чрезвычайной ситуации сначала оцени безопасность места, потом звони 112 (или 103). Если не уверен в шаге — НЕ ВЫПОЛНЯЙ его. Лучше дать диспетчеру довести тебя по телефону.