

EINFÜHRUNG IN DIE GEOMETRIE UND TOPOLOGIE

BLATT 1

Jendrik Stelzner

18. April 2014

Aufgabe 1.1:

Da in der Aufgabenstellung nicht angegeben ist, bezüglich welcher Topologien die Räume betrachtet werden sollen, gehen wir davon aus, dass die durch die euklidische Norm $\|\cdot\|$ induzierte Topologie gemeint ist.

Wir definieren

$$f : \text{inn}(D^2) \rightarrow \text{inn}(D^2), x \mapsto \begin{pmatrix} \cos \frac{1}{1-\|x\|} & -\sin \frac{1}{1-\|x\|} \\ \sin \frac{1}{1-\|x\|} & \cos \frac{1}{1-\|x\|} \end{pmatrix} \cdot x.$$

f ist wohldefiniert, denn

$$\text{inn}(D^2) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| < 1\}.$$

und $\|f(x)\| = \|x\|$ für alle $x \in \text{inn}(D^2)$, da Rotationsmatrizen orthogonal sind.

Wir behaupten, dass f ein Homöomorphismus von $\text{inn}(D^2)$ ist.

Zum Nachweis der Bijektivität definieren wir

$$g : \text{inn}(D^2) \rightarrow \text{inn}(D^2), x \mapsto \begin{pmatrix} \cos \frac{1}{1-\|x\|} & \sin \frac{1}{1-\|x\|} \\ -\sin \frac{1}{1-\|x\|} & \cos \frac{1}{1-\|x\|} \end{pmatrix} \cdot x.$$

Die Wohldefiniertheit von g ergibt sich analog zu der von f . Da $\|f(x)\| = \|x\|$ für alle $x \in \text{inn}(D^2)$ sieht man, dass $(fg)(x) = x$ und $(gf)(x) = x$ für alle $x \in \text{inn}(D^2)$, also $fg = gf = \text{id}_{\text{inn}(D^2)}$. Das zeigt, dass f bijektiv ist mit $g = f^{-1}$.

Die Stetigkeit von f und g ergibt sich direkt daraus, dass sie Verknüpfung stetiger Funktionen sind. Das zeigt, dass f ein Homöomorphismus ist.

Wir behaupten weiter, dass sich f nicht zu einer stetigen Abbildung $D^2 \rightarrow D^2$ fortsetzen lässt. Angenommen, es gebe eine solche stetige Fortsetzung F von f . Wir betrachten die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ auf D^2 mit

$$a_n = \begin{pmatrix} 1 - \frac{1}{n\pi} \\ 0 \end{pmatrix} \text{ für alle } n \geq 1.$$

Offenbar gilt $a_n \rightarrow e_1 = (1, 0)^T$ für $n \rightarrow \infty$ in D^2 . Aufgrund der Folgenstetigkeit von F (in metrischen Räumen ist Folgenstetigkeit äquivalent zu Stetigkeit) ist daher auch $F(a_n) \rightarrow F(e_1)$ für $n \rightarrow \infty$ in D^2 . Da $a_n \in \text{inn}(D^2)$ für alle $n \geq 1$ ist jedoch

$$F(a_n) = f(a_n) = \begin{pmatrix} \cos(n\pi) & -\sin(n\pi) \\ \sin(n\pi) & \cos(n\pi) \end{pmatrix} a_n = (-1)^n a_n \text{ für alle } n \geq 1,$$

und die Folge $((-1)^n a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert in D^2 offensichtlich nicht. Dieser Widerspruch zeigt, dass f keine stetige Fortsetzung $D^2 \rightarrow D^2$ besitzt.

Aufgabe 1.4:

(a)

Für alle $x, y \in X$ ist

$$d'(x, y) = 0 \Leftrightarrow \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1} = 0 \Leftrightarrow d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

und

$$d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1} = \frac{d(y, x)}{d(y, x) + 1} = d'(y, x),$$

da d eine Metrik auf X ist. Die Dreiecksungleichung für d' ergibt sich aus der Dreiecksungleichung für d durch

$$\begin{aligned} d'(x, z) &= \frac{d(x, z)}{d(x, z) + 1} = 1 - \frac{1}{d(x, z) + 1} \leq 1 - \frac{1}{d(x, y) + d(y, z) + 1} \\ &= \frac{d(x, y) + d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \\ &\leq \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} = d'(x, y) + d'(y, z) \end{aligned}$$

für alle $x, y, z \in X$. Das zeigt, dass d'' eine Metrik auf X ist.

(b)

Für alle $x, y \in X$ ist

$$d''(x, y) = 0 \Leftrightarrow \min\{d(x, y), 1\} = 0 \Leftrightarrow d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

und

$$d''(x, y) = \min\{d(x, y), 1\} = \min\{d(y, x), 1\} = d''(y, x),$$

da d eine Metrik auf X ist. Die Dreiecksungleichung für d'' ergibt sich aus der Dreiecksungleichung für d durch

$$\begin{aligned} d''(x, z) &= \min\{d(x, z), 1\} \leq \min\{d(x, y) + d(y, z), 1\} \\ &\leq \min\{d(x, y), 1\} + \min\{d(y, z), 1\} = d''(x, y) + d''(y, z) \end{aligned}$$

für alle $x, y, z \in X$. Dabei haben wir genutzt, dass

$$\min\{a + b, c\} \leq \min\{a + b, a + c, c + b, 2c\} = \min\{a, c\} + \min\{b, c\}$$

für alle $a, b, c \geq 0$.

(c)

Es ist klar, dass d und d'' die gleich Topologie induzieren, denn für eine Teilmenge $U \subseteq X$ und einen Punkt $x \in U$ gibt es genau dann ein $\varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subseteq U$, wenn es ein $0 < \varepsilon' \leq 1$ mit $B_{\varepsilon'}(x) \subseteq U$ gibt. (Existiert ein solches ε' , so kann man $\varepsilon = \varepsilon'$ wählen; existiert ein solches ε , so kann man $\varepsilon' = \min\{\varepsilon, 1\}$ wählen.)

d' und d'' induzieren die gleiche Topologie auf X , da

$$d'(x, y) \leq d''(x, y) \leq 2d'(x, y) \text{ für alle } x, y \in X,$$

was sich aus

$$\frac{a}{a+1} \leq \min\{a, 1\} \leq \frac{2a}{a+1} \text{ für alle } a \geq 0.$$

ergibt.

Der erste Teil der Ungleichung folgt daraus, dass für alle $a \geq 0$

$$\frac{a}{a+1} \leq a \text{ und } \frac{a}{a+1} \leq 1$$

und damit

$$\frac{a}{a+1} \leq \min\{a, 1\}.$$

Der zweite Teil der Ungleichung ergibt sich wegen

$$\min\{a, 1\} \leq \frac{2a}{a+1} \Leftrightarrow (a+1) \min\{a, 1\} \leq 2a \text{ für alle } a \geq 0$$

durch eine einfache Fallunterscheidung: Für $0 \leq a < 1$ ist

$$(a+1)a \leq 2a \Leftrightarrow a(1-a) \geq 0,$$

was offenbar gilt, und für $a \geq 1$ ist

$$a+1 \leq 2a \Leftrightarrow a \geq 1.$$

Das zeigt, dass auch d' und d'' die gleiche Topologie induzieren.