

EINFÜHRUNG IN DIE GEOMETRIE UND TOPOLOGIE

BLATT 7

Jendrik Stelzner

16. Juni 2014

Aufgabe 7.3:

(a)

Die Multiplikation ist assoziativ, da für alle $(n, m), (n', m'), (n'', m'') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$$\begin{aligned} & ((n, m) \cdot (n', m')) \cdot (n'', m'') \\ &= (n + (-1)^m n', m + m') \cdot (n'', m'') \\ &= (n + (-1)^m n' + (-1)^{m+m'} n'', m + m' + m'') \\ &= (n + (-1)^m (n' + (-1)^{m'} n''), m + m' + m'') \\ &= (n, m) \cdot (n' + (-1)^{m'} n'', m' + m'') \\ &= (n, m) \cdot ((n', m') \cdot (n'', m'')). \end{aligned}$$

Das Element $(0, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ist bezüglich der Multiplikation rechtsneutral, da für alle $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$$(n, m) \cdot (0, 0) = (n + (-1)^0 \cdot 0, m + 0) = (n, m).$$

Das Element $(n, m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ hat das Rechtsinverse $((-1)^{m+1} n, -m) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, da

$$(n, m) \cdot ((-1)^{m+1} n, -m) = (n + (-1)^m (-1)^{m+1} n, m - m) = (0, 0).$$

Das zeigt, dass $\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}$ eine Gruppe ist. Sie ist nicht abelsch, da etwa

$$(1, 0) \cdot (1, 1) = (2, 1) \neq (0, 1) = (1, 1) \cdot (1, 0).$$