

ANALYSIS III

3. AUFGABENBLATT

Jendrik Stelzner

1. November 2013

Lemma 1: Sei $(A_n)_{n \in I}$ eine Familie von Mengen über einer Indexmenge $I \subseteq \mathbb{N}$ und $A_n = \bigcup_{m \in I_n} B_m^n$ für eine Familie von Mengen $(B_m^n)_{m \in I_n}$ über einer Indexmenge $I_n \subseteq \mathbb{N}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\prod_{n \in I} A_n = \prod_{n \in I} \bigcup_{m \in I_n} B_m^n = \bigcup_{(b_n) \in \prod_{n \in I} I_n} \prod_{n \in I} B_{b_n}^n.$$

(Die Indexmengen werden auf Teilmengen von \mathbb{N} eingeschränkt, und nicht etwa beliebig gewählt, um das Auswahlaxiom nicht nutzen zu müssen.)

Beweis des Lemmas: Sei $(a_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} A_n$. Da $a_n \in A_n$ für alle $n \in I$, gibt es für alle $n \in I$ ein $b_n \in I_n$ mit $a_n \in B_{b_n}^n$. Daher ist

$$(a_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} B_{b_n}^n \subseteq \bigcup_{(b_n) \in \prod_{n \in I} I_n} \prod_{n \in I} B_{b_n}^n,$$

also $\prod_{n \in I} A_n \subseteq \bigcup_{(b_n) \in \prod_{n \in I} I_n} \prod_{n \in I} B_{b_n}^n$.

Ist $(a_n)_{n \in I} \in \bigcup_{(b_n) \in \prod_{n \in I} I_n} \prod_{n \in I} B_{b_n}^n$, so gibt es $(b_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} I_n$ so dass $a_n \in B_{b_n}^n \subseteq A_n$ für alle $n \in I$, und somit $(a_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} A_n$. Also ist $\prod_{n \in I} A_n \supseteq \bigcup_{(b_n) \in \prod_{n \in I} I_n} \prod_{n \in I} B_{b_n}^n$.

Die Disjunktheit der Vereinigung ergibt sich aus der paarweisen Disjunktheit der B_m^n , $m \in I_n$, für alle $n \in I$: Sind $(b_n)_{n \in I}, (b'_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} I_n$ so dass ein $(a_n)_{n \in I} \in \prod_{n \in I} B_{b_n}^n \cap \prod_{n \in I} B_{b'_n}^n$ existiert, so muss $a_n \in B_{b_n}^n$ und $a_n \in B_{b'_n}^n$, für alle $n \in I$. Also muss $B_{b_n}^n \cap B_{b'_n}^n \neq \emptyset$, und damit $b_n = b'_n$ für alle $n \in I$. \square

Aufgabe 1. (Volumen auf Quadern)

a)

Seien $q, Q \in \mathcal{Q}$ mit $q \subseteq Q$ beliebig aber fest. Es ist $Q = \prod_{i=1}^n [A_i, B_i)$ mit $A_i \leq B_i$ für $i = 1, \dots, n$ und $q = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i)$ mit $A_i \leq a_i \leq b_i \leq B_i$ für $i = 1, \dots, n$. Dass $[a_i, b_i) \subseteq [A_i, B_i)$ folgt daher, dass sich wegen $q \subseteq Q$ mithilfe der Projektion $\pi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$ ergibt, dass $[a_i, b_i) = \pi_i(q) \subseteq \pi_i(Q) = [A_i, B_i)$ für

je $i = 1, \dots, n$. Mit Lemma (1) ergibt sich nun, dass

$$\begin{aligned} Q &= \prod_{i=1}^n [A_i, B_i] = \prod_{i=1}^n \left(\underbrace{[A_i, a_i]}_{:=C_1^i} \dot{\cup} \underbrace{[a_i, b_i]}_{:=C_2^i} \dot{\cup} \underbrace{[b_i, B_i]}_{:=C_3^i} \right) \\ &= \bigcup_{(c_1, \dots, c_n) \in \{1, 2, 3\}^n} \prod_{i=1}^n C_{c_i}^i \end{aligned}$$

die disjunkte Vereinigung von 3^n Quadern q_1, \dots, q_{3^n} aus \mathcal{Q} ist, wobei $q = \prod_{i=1}^n C_2^i$ einer von diesen ist. Aufgrund der Additivität von μ ist daher

$$\mu(Q) = \mu\left(\bigcup_{i=1}^{3^n} q_i\right) = \sum_{i=1}^{3^n} \mu(q_i) \geq \mu(q),$$

weshalb μ monoton ist.

Aufgabe 2. (Nullmengen)

a)

Aus der Aufgabenstellung geht meiner Meinung nach nicht klar hervor, ob A als

$$\begin{aligned} \tilde{A}_1 &:= \{x \in X : x \in A_k \text{ für unendlich viele } k \in \mathbb{N}\} \text{ oder als} \\ \tilde{A}_2 &:= \{x \in X : x \in M \text{ für unendlich viele } M \in \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}\} \end{aligned}$$

definiert wird. Für den Beweis diesen Aufgabenteiles genügt es allerdings davon auszugehen, dass $A = \tilde{A}_1$, da $\tilde{A}_2 \subseteq \tilde{A}_1$: Ist $x \in \tilde{A}_2$, so gibt es unendlich viele $M \in \{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x \in M$; insbesondere gibt es daher unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $x \in A_n$. Man bemerke jedoch, dass im Allgemeinen $\tilde{A}_1 \subsetneq \tilde{A}_2$: Ist etwa $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konstant mit $A_1 \neq \emptyset$, so ist $\tilde{A}_1 = A_1 \neq \emptyset$, aber $\tilde{A}_2 = \emptyset$.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig aber fest. Da $\mu(A_k) \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ ist die Folge der Partialsummen $(\sum_{k=1}^n \mu(A_k))_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend. Da sie nach Annahme nach oben beschränkt ist, ist sie konvergent. Es gibt daher ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\sum_{k=N}^{\infty} \mu(A_k) < \varepsilon$. Da μ ein Maß ist folgt daraus, dass

$$\mu\left(\bigcup_{k=N}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=N}^{\infty} \mu(A_k) < \varepsilon.$$

Da $A = \tilde{A}_1$ gibt es für alle $x \in A$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n > N$ und $x \in A_n$. Insbesondere ist daher $A \subseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_k$. Aufgrund der Monotonie von μ folgt, dass

$$0 \leq \mu(A) \leq \mu\left(\bigcup_{k=N}^{\infty} A_k\right) < \varepsilon.$$

Aus der Beliebigkeit von ε folgt damit, dass $\mu(A) = 0$.

b)

Es sei $(X, \mathcal{A}) := (\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ und μ das Zählmaß auf $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, sowie $A_k := \{1, \dots, k\}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Es ist dann $\{1\} \subseteq A$, unabhängig davon ob $A = \tilde{A}_1$ oder $A = \tilde{A}_2$. Wegen der Monotonie des Maßes ist daher $\mu(A) \geq \mu(\{1\}) = 1$, also $\mu(A) \neq 0$. (Ist $A = \tilde{A}_1$, so ist sogar $A = \mathbb{N}$ und somit $\mu(A) = \infty$.)

Aufgabe 3. (Vom äußeren Maß zum Maß)

Aufgabe 4. (Verschiedene äußere Maße)