

ANALYSIS III

11. AUFGABENBLATT

Jendrik Stelzner

13. Januar 2014

Aufgabe 2. (Die Hölder-Ungleichung)

a)

Ist $r = \infty$, so ist auch $p = q = \infty$. Für $f, g \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ ist dann

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \text{ für } \mu\text{-fast alle } x \in \Omega.$$

Das zeigt, dass $fg \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ und die geforderte Ungleichung gilt.

Ist $r \in [1, \infty)$, so folgt aus $f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$, dass $|f|^r \in \mathcal{L}^{p/r}(\Omega)$ mit $\||f|^r\|_{p/r} = \|f\|_p^r$, und aus $g \in \mathcal{L}^q(\Omega)$, dass $|g|^r \in \mathcal{L}^{q/r}(\Omega)$ mit $\||g|^r\|_{q/r} = \|g\|_q^r$. Da

$$\frac{r}{p} + \frac{r}{q} = r \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = r \frac{1}{r} = 1$$

ist nach der Hölder-Ungleichung

$$\int_{\Omega} |fg|^r \, d\mu = \int_{\Omega} |f|^r |g|^r \, d\mu \leq \||f|^r\|_{p/r} \||g|^r\|_{q/r} = \|f\|_p^r \|g\|_q^r.$$

Dass die rechte Seite der Gleichung endlich ist, zeigt, dass $fg \in \mathcal{L}^r(\Omega)$. Außerdem folgt, dass

$$\|fg\|_r = \left(\int_{\Omega} |fg|^r \, d\mu \right)^{1/r} \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Aufgabe 3. (Die Dichtheit von einfachen Funktionen in L^p)

Bemerkung 1. Für $p \in [1, \infty)$ und $x, y \geq 0$ mit $x \leq y$ ist

$$(x + y)^p \geq x^p + y^p$$

und

$$(y - x)^p \leq y^p - x^p.$$

Beweis. Wir betrachten die Funktion $\psi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ mit

$$\psi(t) = (x + t)^p - x^p - t^p \text{ für alle } t \in [0, \infty).$$

Es ist $\psi \in C^1([0, \infty))$ mit

$$\psi'(t) = p(x+t)^{p-1} - pt^{p-1} = p((x+t)^{p-1} - t^{p-1}).$$

Es ist $\psi(0) = 0$ und $\psi'(t) \geq 0$ für alle $t \in (0, \infty)$. Also ist $\psi(t) \geq 0$ für alle $t \in [0, \infty)$. Insbesondere ist

$$(x+y)^p - x^p - y^p = \psi(y) \geq 0,$$

was die erste Gleichung zeigt. Da $y - x \geq 0$ ist

$$y^p = (y - x + x)^p \geq (y - x)^p + x^p,$$

was die zweite Gleichung zeigt. □

Wir betrachten die beiden Fälle $p \in [0, \infty)$ und $p = \infty$ getrennt. Zunächst betrachten wir den Fall $p \in [0, \infty)$.

Sei zunächst $f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ mit $f \geq 0$. Wie wir wissen gibt es eine Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ einfacher, messbarer Funktionen mit $f_n \geq 0$ und $f_n \leq f_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$, sowie $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ für alle $x \in \Omega$. Aufgrund von Monotonie ist $0 \leq f^p$, sowie $0 \leq f_n^p$ und $f_n^p \leq f_{n+1}^p$ für alle $n \in \mathbb{N}$, und aufgrund von Stetigkeit ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)^p = f(x)^p \text{ für alle } x \in \Omega.$$

Nach dem Satz über monotone Konvergenz ist daher

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n^p \, d\mu = \int_{\Omega} f^p \, d\mu.$$

Da $f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ und $f \geq 0$ ist die rechte Seite der Gleichung endlich, wegen der Monotonie von $(f_n^p)_{n \in \mathbb{N}}$ also auch die linke für alle $n \in \mathbb{N}$. Es ist daher $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge einfacher Funktionen auf $\mathcal{L}^p(\Omega)$ mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f^p - f_n^p \, d\mu = \int_{\Omega} f^p \, d\mu - \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n^p \, d\mu = 0.$$

Nach Bemerkung 1 ist daher

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (f - f_n)^p \, d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f^p - f_n^p \, d\mu = 0,$$

also

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (f - f_n)^p \, d\mu = 0$$

und damit $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_p = 0$.

Sei nun $f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ beliebig. Es ist auch $|f| \in \mathcal{L}^p(\Omega)$, und es gibt eine Folge einfacher Funktionen $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf $\mathcal{L}^p(\Omega)$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \| |f| - f'_n \|_p = 0$. Wir definieren die Folge einfacher Funktionen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf $\mathcal{L}^p(\Omega)$ als

$$f_n := \operatorname{sgn}(f) f'_n \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Dass $f_n \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ folgt direkt daraus, dass $|f'_n| = |f_n|$. Auch ist

$$|f(x) - f_n(x)| \geq ||f(x)| - f'_n(x)| \text{ für alle } x \in \Omega \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Es ist daher

$$\|f - f_n\|_p = \left(\int_{\Omega} |f - f_n|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{\Omega} ||f| - f'_n|^p \right)^{1/p} = \| |f| - f'_n \|_p$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Aus $\lim_{n \rightarrow \infty} \| |f| - f'_n \|_p = 0$ folgt daher, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_p = 0$. Sei nun $p = \infty$. Sei zunächst $f \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ mit $f \geq 0$. Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir die Folge einfacher Funktionen $(f_n)_{n \geq 1}$ auf $\mathcal{L}^\infty(\Omega)$ als

$$f_n(x) := \sup \left\{ \frac{k}{n} \leq f(x) : k \in \mathbb{N} \right\}.$$

Dass $n \in \mathbb{N}$ $f_n \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ und f_n einfach ist, folgt für alle $n \in \mathbb{N}$ direkt daraus, dass $f \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$. Es ist auch klar, dass

$$\sup_{x \in \Omega} |f(x) - f_n(x)| < \frac{1}{n} \text{ für alle } n \geq 1.$$

Es ist daher $\|f - f_n\|_\infty \leq 1/n$ für alle $n \geq 1$, also $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_\infty = 0$.

Sei nun $f \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ beliebig. Offenbar ist auch $|f| \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$, und wir finden eine Folge einfacher Funktionen $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ auf $\mathcal{L}^\infty(\Omega)$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \| |f| - f'_n \|_\infty = 0$. Wir definieren die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ einfacher Funktionen auf $\mathcal{L}^\infty(\Omega)$ als

$$f_n := \text{sgn}(f) f'_n.$$

Dass $f_n \in \mathcal{L}^\infty(\Omega)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ folgt direkt daraus, dass $|f_n| = |f'_n|$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Da

$$|f(x) - f_n(x)| \leq ||f(x)| - f'_n(x)| \text{ für alle } x \in \Omega \text{ für alle } n \in \mathbb{N}$$

ist $\|f - f_n\|_\infty \leq \| |f| - f'_n \|_\infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Aus $\lim_{n \rightarrow \infty} \| |f| - f'_n \|_\infty = 0$ folgt daher, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_\infty = 0$.

Aufgabe 4. (Schwache Konvergenz)

a)

Sei $g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega)$ beliebig aber fest. Da $f, f_k \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ für alle $k \in \mathbb{N}$ ist nach der Hölder-Ungleichung $fg, f_k g \in \mathcal{L}^1(\Omega)$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Es ist daher

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k g d\mu = \int_{\Omega} f g d\mu$$

genau dann, wenn

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k g d\mu - \int_{\Omega} f g d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (f_k - f) g d\mu.$$

Da auch $f_k - f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$ folgt mithilfe der Hölder-Ungleichung, dass für alle $k \in \mathbb{N}$

$$\left| \int_{\Omega} (f_k - f) g \right| \leq \int_{\Omega} |f_k - f| |g| d\mu \leq \|f_k - f\|_p \|g\|_{p'} = \|f_k - f\|_p \|g\|_{p'}.$$

Da $f_k \rightarrow f$ in $L^p(\Omega)$ ist $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0$, also auch

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (f_k - f) g d\mu = 0.$$

b)

Aus der Eindeutigkeit des Grenzwertes auf \mathbb{R} folgt aus $f_k \rightharpoonup f$ und $f_k \rightharpoonup h$, dass für alle $g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega)$

$$\int_{\Omega} f g \, d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k g \, d\mu = \int_{\Omega} h g \, d\mu.$$

Da nach der Hölder-Ungleichung beide Seiten der Gleichung endlich sind, folgt, dass

$$\int_{\Omega} (f - h) g \, d\mu = 0 \text{ für alle } g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega).$$

Daher ergibt sich aus **Aufgabe 1** wegen der σ -Endlichkeit des Maßraumes, und da $f - h \in L^p(\Omega)$, dass

$$\|f - h\|_p = \sup \left\{ \int_{\Omega} (f - h) g \, d\mu : g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega) \text{ mit } \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} = 0.$$

Also ist $f = h$ in $L^p(\Omega)$, da $\|\cdot\|_p$ eine Norm auf L^p ist.

c)

Bemerkung 2. Sei I eine Indexmenge und für alle $i \in I$ sei $(a_n^i)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge auf \mathbb{R} . Dann ist

$$\sup_{i \in I} \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^i \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_{i \in I} a_n^i.$$

Beweis. Für alle $j \in I$ und $n \in \mathbb{N}$ ist

$$a_n^j \leq \sup_{i \in I} a_n^i.$$

Also ist für alle $j \in I$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^j \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_{i \in I} a_n^i$$

und deshalb auch

$$\sup_{j \in I} \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n^j \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sup_{i \in I} a_n^i.$$

□

Zusammenfügen von **Aufgabe 1** und **Bemerkung 2** ergibt, dass

$$\begin{aligned} \|f\|_p &= \sup \left\{ \int_{\Omega} f g \, d\mu : g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega), \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k g \, d\mu : g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega), \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \sup \left\{ \int_{\Omega} f_k g \, d\mu : g \in \mathcal{L}^{p'}(\Omega), \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} = \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_p. \end{aligned}$$