

ANALYSIS III

7. AUFGABENBLATT

Jendrik Stelzner

4. Dezember 2013

Aufgabe 1. (Eine Integralformel)

Aufgabe 2. (Funktionen mit verschwindendem Integral auf Anfangsstücken)

a)

Wir zeigen, dass $\int_U f \, d\lambda = 0$ für alle offenen Mengen $U \subseteq (a, b)$. Zunächst bemerken wir, dass für alle $x \in (a, b)$

$$0 = \int_{(a,b)} f \, d\lambda = \int_{(a,x)} f \, d\lambda + \int_{(x,b)} f \, d\lambda = \int_{(x,b)} f \, d\lambda,$$

also für alle $x, y \in (a, b)$ mit $x < y$

$$0 = \int_{(a,b)} f \, d\lambda = \int_{(a,x)} f \, d\lambda + \int_{(x,y)} f \, d\lambda + \int_{(y,b)} f \, d\lambda = \int_{(x,y)} f \, d\lambda.$$

Sei nun $U \subseteq (a, b)$ offen. Wie bereits letzte Woche gezeigt können wir U schreiben als $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$, wobei $U_n = \emptyset$ oder U_n ein offenes Intervall ist für alle $n \in \mathbb{N}$. Für $g_n = \sum_{k=1}^n f \chi_{U_k}$ und $g = f \chi_U$ ist $g_n \rightarrow g$ punktweise auf ganz (a, b) . Da f integrierbar ist, ist es auch $|f|$, und wegen $|g_n| \leq |f|$ für alle $n \in \mathbb{N}$ nach dem Satz über dominierte Konvergenz daher

$$\begin{aligned} \int_U f \, d\lambda &= \int_{(a,b)} f \chi_U \, d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(a,b)} \sum_{k=0}^n f \chi_{U_k} \, d\lambda \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{(a,b)} f \chi_{U_k} \, d\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{U_k} f \, d\lambda = 0. \end{aligned}$$

Es sei nun $E_+ := \{x \in (a, b) : f(x) > 0\}$ mit $\lambda(E_+) \leq b - a < \infty$. Wegen der Regularität des Lebesgue-Maßes und da $\lambda(E_+) < \infty$ finden wir eine Folge $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ offener Mengen mit $E_+ \subseteq U_n$ und $\lambda(U_n \setminus E_+) \leq \frac{1}{n}$ für alle n . Wir können o.B.d.A. davon ausgehen, dass die Folge $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ fallend ist, da wir sonst die Folge $(\bigcap_{k=1}^n U_k)_{n \in \mathbb{N}}$ betrachten. Es sei $U := \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

Es ist $\int_U f \, d\lambda$: Es ist $f \chi_{U_n} \rightarrow f \chi_U$ punktweise auf ganz (a, b) und $|f \chi_{U_n}| \leq |f|$ für alle $n \in \mathbb{N}$, nach dem Satz über dominierte Konvergenz also

$$\int_U f \, d\lambda = \int_{(a,b)} f \chi_U \, d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(a,b)} f \chi_{U_n} \, d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{U_n} f \, d\lambda = 0.$$

Es ist $E_+ \subseteq U$ und, da $\mu(U_0) < \infty$ und die Folge $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ fallend ist,

$$\begin{aligned}\mu(U \setminus E_+) &= \mu\left(\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n\right) \setminus E_+\right) = \mu\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (U_n \setminus E_+)\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(U_n \setminus E_+) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.\end{aligned}$$

Es ist also $\int_{E_+} f \, d\lambda = \int_U f \, d\lambda = 0$. Da $f|_{E_+} > 0$ ist daher, wie aus der Vorlesung bekannt, $f(x) = 0$ für λ -fast alle $x \in E_+$. Nach der Definition von E_+ muss daher $\lambda(E_+) = 0$. Analog ergibt sich für $E_- := \{x \in (a, b) : f(x) < 0\}$, dass auch $\lambda(E_-) = 0$. Also ist

$$\lambda(\{x \in (a, b) : f(x) \neq 0\}) = \lambda(E_- \cup E_+) = \lambda(E_-) + \lambda(E_+) = 0.$$

Aufgabe 3. (Ein Konvergenzresultat)

Aufgabe 4. (Gegenbeispiele)