

Anmerkungen und Lösungen zu
Einführung in die Algebra
Blatt 5

Jendrik Stelzner

Letzte Änderung: 16. Dezember 2017

Aufgabe 4

(a)

Für alle $(a, s) \in R \times S$ gilt $(a, s) \sim (a, s)$, denn für $1 \in S$ gilt

$$1 \cdot (as - as) = 0.$$

Also ist \sim reflexiv. Für $(a, s), (a', s') \in R \times S$ mit $(a, 0s) \sim (a', s')$ gibt es $t \in S$ mit

$$t \cdot (as' - a's) = 0.$$

Dann gilt

$$t \cdot (a's - as') = -t \cdot (as' - a's) = 0,$$

und somit auch $(a', s') \sim (a, s)$. Das zeigt, dass \sim symmetrisch ist.

Für alle $(a, s), (a', s'), (a'', s'') \in R \times S$ mit $(a, s) \sim (a', s')$ und $(a', s') \sim (a'', s'')$ gibt es $t, u \in S$ mit

$$t \cdot (as' - a's) = 0 \quad \text{und} \quad u \cdot (a's'' - a''s') = 0,$$

also mit

$$t \cdot as' = t \cdot a's \quad \text{und} \quad u \cdot a's'' = u \cdot a''s'.$$

Diese Gleichungen lassen sich so lesen, dass sich in Anwesenheit des Elements t die Ersetzung $as' \rightarrow a's$ durchführen lässt, und in Anwesenheit des Elements u die Ersetzung $a's'' \rightarrow a''s'$. In Anwesenheit des Elementes $s'tu$ lässt sich dann auch die Ersetzung $as'' \rightarrow a''s$ durchführen, denn es gilt

$$s'tu \cdot a''s = st \cdot u \cdot a''s' = st \cdot u \cdot a's'' = s''u \cdot t \cdot a's = s''u \cdot t \cdot as' = s'tu \cdot as''.$$

Das zeigt die Transitivität von \sim .

Ingesamt zeigt dies, dass \sim eine Äquivalenzrelation ist. Anstelle von $[a, s]$ schreiben wir im Folgenden

$$\frac{a}{s}$$

oder a/s für die Äquivalenzklasse von $(a, s) \in R \times S$.

(b)

Es seien $(a, s), (a', s'), (b, t), (b', t') \in R \times S$ mit $(a, s) \sim (a', s')$ und $(b, t) \sim (b', t')$. Dann gibt es $u_1, u_2 \in S$ mit

$$u_1 \cdot (as' - a's) = 0 \quad \text{und} \quad u_2 \cdot (bt' - b't) = 0,$$

also mit

$$u_1 \cdot as' = u_1 \cdot a's \quad \text{und} \quad u_2 \cdot bt' = u_2 \cdot b't.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} u_1 u_2 \cdot (at + bs)s't' &= (u_1 u_2 \cdot ats't') + (u_1 u_2 \cdot bss't') \\ &= (u_2 tt' \cdot u_1 \cdot as') + (u_1 ss' \cdot u_2 \cdot bt') \\ &= (u_2 tt' \cdot u_1 \cdot a's) + (u_1 ss' \cdot u_2 \cdot b't) \\ &= (u_1 u_2 \cdot a'stt') + (u_1 u_2 \cdot b'ss't) = u_1 u_2 \cdot (a't' + b's')st \end{aligned}$$

und somit

$$u_1 u_2 \cdot ((at + bs)s't' - (a't' + b's')st) = 0,$$

also

$$\frac{at + bs}{st} = \frac{a't' + b's'}{s't'}.$$

Das zeigt, dass die Addition

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} := \frac{at + bs}{st}$$

auf $S^{-1}R$ wohldefiniert ist.

Außerdem gilt

$$u_1 u_2 \cdot abs't' = (u_1 \cdot as')(u_2 \cdot bt') = (u_1 \cdot a's)(u_2 \cdot b't) = u_1 u_2 \cdot a'b'st$$

und somit

$$u_1 u_2 \cdot (abs't' - a'b'st) = 0,$$

also

$$\frac{ab}{st} = \frac{a'b'}{s't'}.$$

Das zeigt, dass die Multiplikation

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} := \frac{ab}{st}$$

auf $S^{-1}R$ wohldefiniert ist.

Das folgende Lemma erweist sich zum Rechnen in $S^{-1}R$ als sehr nützlich:

Lemma 1 (Kürzen von Brüchen). *Für alle $a/s \in S^{-1}R$ und $t \in S$ gilt*

$$\frac{a}{s} = \frac{at}{st}.$$

Beweis. Für $1 \in S$ gilt $1 \cdot (ast - ats) = 0$, also gilt $(a, s) \sim (at, st)$. □

Aus Lemma 1 ergibt sich insbesondere, dass $0/1 = 0/s$ für alle $s \in S$ gilt, denn

$$\frac{0}{s} = \frac{0 \cdot s}{1 \cdot s} = \frac{0}{1}.$$

Die Assoziativität und Kommutativität der Addition und Multiplikation, sowie die Distributivität folgen durch direktes Nachrechnen. Das Einselement in $S^{-1}R$ ist $1/1$, denn für alle $a/s \in S^{-1}R$ gilt

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}.$$

Das Nullelement ist $0/1$, denn für alle $a/s \in S^{-1}R$ gilt

$$\frac{a}{s} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + 0 \cdot s}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}.$$

Das additiv Inverse Element zu $a/s \in S^{-1}R$ ist $(-a)/s$, denn es gilt

$$\frac{a}{s} + \frac{-a}{s} = \frac{as - as}{s^2} = \frac{0}{s^2} = \frac{0}{1}.$$

Insgesamt zeigt dies, dass $S^{-1}R$ mit der gegebenen Addition und Multiplikation einen kommutativen Ring bildet.

Bemerkung 2. Ist R ein kommutativer Ring und $S \subseteq R$ eine multiplikative Teilmenge, so ist die Abbildung $f: R \rightarrow R_S, r \mapsto r/1$ ein Ringhomomorphismus. (Dies lässt sich durch direktes Nachrechnen überprüfen.)

Für jedes $s \in S$ ist das Element $f(s) = s/1 \in S^{-1}R$ eine Einheit, da

$$\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s}{s} = \frac{1}{1} = 1_{S^{-1}R}$$

gilt. In dem Ring $S^{-1}R$ werden die Elemente aus S also zu Einheiten.

Der Ring $S^{-1}R$ zusammen mit dem Homomorphismus f ist möglichst allgemein (d.h. *universell*) mit dieser Eigenschaft: Ist T ein Ring und $g: R \rightarrow T$ ein Ringhomomorphismus, so dass $g(s)$ für jedes $s \in S$ eine Einheit in T ist, so gibt es einen

eindeutigen Ringhomomorphismus $\bar{g}: S^{-1}R \rightarrow T$, der das folgende Diagramm zum Kommutieren bringt:

$$\begin{array}{ccc} S^{-1}R & \xrightarrow{\bar{g}} & T \\ f \uparrow & \nearrow g & \\ R & & \end{array}$$

Der Homomorphismus \bar{g} ist gegeben durch

$$\bar{g}\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{g(a)}{g(s)} = g(a)g(s)^{-1} \quad \text{für alle } \frac{a}{s} \in S^{-1}R.$$

Man bezeichnet dies als die *universelle Eigenschaft der Lokalisierung*.

Bemerkung 3. Man beachte aber, dass der Ringhomomorphismus $f: R \rightarrow S^{-1}R$, $r \mapsto r/1$ im Allgemeinen nicht injektiv ist: Für alle $r \in R$ gilt

$$r \in \ker f \iff \frac{r}{1} = \frac{0}{1} \iff \exists s \in S : rs = 0.$$

Somit ist f genau dann injektiv, wenn für alle $s \in S$ und $r \in R$ mit $rs = 0$ bereits $r = 0$ folgt, d.h. wenn S keine Nullteiler enthält.

Ist insbesondere R ein Integritätsbereich, so ist im Fall $0 \notin S$ der Ringhomomorphismus $f: R \rightarrow S^{-1}R$ stets injektiv. Dann lässt sich R als ein Unterring von $S^{-1}R$ auffassen.

(c)

Da R ein Integritätsbereich ist, gilt $1 \neq 0$, und somit $1 \in S$. Für alle $s, t \in S$ gilt $s, t \neq 0$, wegen der Nullteilerfreiheit von R also auch $st \neq 0$, und somit $st \in S$. Das zeigt, dass S eine multiplikative Menge ist.

Bevor wir zeigen, dass $\text{Quot}(R)$ ein Körper ist, wollen wir anmerken, dass sich die Gleichheitsregel für Brüche in der gegebenen Situation vereinfachen lässt: Für zwei Brüche $a/s, b/t \in \text{Quot}(R)$ gilt

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff \exists u \in S : u \cdot (at - bs) = 0.$$

Dabei gilt $u \neq 0$ (da $S = R \setminus \{0\}$), weshalb wegen der Nullteilerfreiheit von R bereits

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff at = bs \tag{1}$$

gilt. Wir können Brüche in $\text{Quot}(R)$ also auf die „naive“ Art und Weise vergleichen.

Bemerkung 4. Ist allgemeiner R ein Integritätsbereich und $S \subseteq R$ eine multiplikative Teilmenge mit $0 \notin S$, so gilt für $a/s, b/t \in \text{Quot}(R)$ genau dann $a/s = b/t$, wenn $at = bs$ gilt. Dies ergibt sich ohne Änderungen aus der obigen Rechnung. Für nicht-triviale (d.h. vom Nullring verschiedene) Lokalisierungen von Integritätsbereichen gilt also die „naive“ Gleichheitsregel für Brüche.

Es gilt $0_R \neq 1_R$, da R ein Integritätsbereich ist. Damit gilt auch $0_{\text{Quot}(R)} \neq 1_{\text{Quot}(R)}$, denn es gilt

$$\frac{0}{1} = \frac{1}{1} \iff 0 \cdot 1 = 1 \cdot 1 \iff 0 = 1.$$

Es sei nun $a/s \in S^{-1}R$ mit $(a/s) \neq 0$. Dann gilt insbesondere $a \neq 0$, weshalb der Bruch $s/a \in \text{Quot}(R)$ wohldefiniert ist. Es gilt

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{s}{a} = \frac{as}{sa} = \frac{1}{1} = 1_{S^{-1}R},$$

was zeigt, dass a/s eine Einheit in $\text{Quot}(R)$ ist.

Das zeigt, dass der kommutative Ring $\text{Quot}(R)$ bereits ein Körper ist.

Bemerkung 5. Nach Bemerkung 3 ist der Ringhomomorphismus $R \rightarrow \text{Quot}(R)$, $r \mapsto r/1$ injektiv, wodurch sich R als einen Unterring von $\text{Quot}(R)$ auffassen lässt. Da jeder Unterring eines Körpers auch ein Integritätsbereich ist, erhalten wir damit eine neue Charakterisierung von Integritätsbereichen:

Integritätsbereiche sind genau die Unterringe von Körpern.

Dies liefert auch eine mögliche Erklärung, warum der Nullring bei der Definition eines Integritätsbereiches ausgeschlossen wird: Es handelt sich nicht um den Unterring eines Körpers.

Bemerkung 6. Ist allgemeiner R ein kommutativer Ring und $P \trianglelefteq R$ ein Primideal, so ist $S_P := R \setminus P$ eine multiplikative Teilmenge: Es gilt $1 \notin P$ da $P \neq R$ gilt, und somit $1 \in S_P$. Für alle $x, y \in S_P$ gilt $x, y \notin P$, und somit auch $xy \notin P$ (da P prim ist), und deshalb $xy \in S_P$.

Man bezeichnet den Ring $R_P := S_P^{-1}R$ als die *Lokalisierung von R an P* . Bei R_P handelt es sich um einen sogenannten *lokalen Ring*, d.h. R_P besitzt genau ein maximales Ideal (nämlich $S_P^{-1}P$). Diese Konstruktion spielt eine wichtige Rolle in der kommutativen Algebra und algebraischen Geometrie.

Ist dabei R ein Integritätsbereich, so ist $0 \trianglelefteq R$ ein Primideal, und es folgt, dass $S = S_0 = R \setminus \{0\}$ eine multiplikative Teilmenge ist. Zudem ist dann $S_0^{-1}0 = S^{-1}0 = 0$ das eindeutige maximale Ideal von $S^{-1}R$. Insbesondere ist das Nullideal in $S^{-1}R$ maximal, und $S^{-1}R$ somit ein Körper.

(d)

Die Abbildung $i: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $n \mapsto n/1$ ist injektiv. Für $S := \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gilt deshalb

$$i(S) = i(\mathbb{Z} \setminus \{0\}) = \mathbb{Z} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{Q} \setminus \{0\} = \mathbb{Q}^\times.$$

Nach der universellen Eigenschaft der Lokalisierung (siehe Bemerkung 2) induziert i deshalb einen Ringhomomorphismus

$$\bar{i}: \text{Quot}(\mathbb{Z}) = S^{-1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \frac{p}{q} \mapsto \frac{i(p)}{i(q)} = \frac{p}{q}.$$

Der Ringhomomorphismus \bar{i} ist surjektiv, und als Körperhomomorphismus auch injektiv. Die Injektivität von \bar{i} lässt sich auch von Hand nachrechnen, denn für alle $p/q \in \text{Quot}(\mathbb{Z})$ gilt

$$\bar{i}\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \implies \frac{p}{q} = 0 \text{ in } \mathbb{Q} \implies p = 0 \text{ in } \mathbb{Z} \implies \frac{p}{q} = 0 \text{ in } \text{Quot}(\mathbb{Z}).$$

Also ist \bar{i} ein Isomorphismus.

Bemerkung 7. Sofern die universelle Eigenschaft der Lokalisierung noch nicht zur Verfügung steht, so muss von Hand begründet werden, warum φ ein wohldefinierter Ringhomomorphismus ist:

1. Für alle $p_1, p_2 \in \mathbb{Z}$ und $q_1, q_2 \in S$ mit $p_1/q_1 = p_2/q_2$ in $\text{Quot}(\mathbb{Z})$ gilt $p_1 q_2 = p_2 q_1$ (siehe (1)) und somit auch $p_1/q_1 = p_2/q_2$ in \mathbb{Q} . Somit ist φ wohldefiniert.
2. Dass φ ein Ringhomomorphismus ist, ergibt sich durch direktes Nachrechnen.

Bemerkung 8. Ist R ein beliebiger Integritätsbereich und K ein Körper, so erhalten wir analog zur obigen Rechnung, dass jeder injektive Ringhomomorphismus $i: R \rightarrow K$ einen eindeutigen Körperhomomorphismus $\bar{i}: \text{Quot}(R) \rightarrow K$ induziert, der für die Inklusion $j: R \rightarrow \text{Quot}(R)$, $r \mapsto r/1$ das folgende Diagramm zum Kommutieren bringt:

$$\begin{array}{ccc} \text{Quot}(R) & \xrightarrow{\bar{i}} & K \\ j \uparrow & \nearrow i & \\ R & & \end{array}$$

Man bemerke, dass dabei \bar{i} als Körperhomomorphismus injektiv ist, also $\text{Quot}(R)$ durch \bar{i} mit einem Unterkörper von K identifiziert wird. Anschaulich bedeutet dies:

Es ist $\text{Quot}(R)$ ist der kleinste Körper, der R enthält.

Jeder Körper K , der R enthält, muss auch schon $\text{Quot}(R)$ enthalten.

Im Falle von $R = \mathbb{Z}$ und $K = \mathbb{Q}$ wird K als Körper bereits von R erzeugt, weshalb $\text{Quot}(R)$ bereits ganz \mathbb{Q} sein muss.

(e)

Wir gehen wie im vorherigen Aufgabenteil vor: Für die Inklusion $i: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $a \mapsto a$ gilt

$$\varphi(S) = S \subseteq \mathbb{Q} \setminus \{0\} = \mathbb{Q}^\times.$$

Deshalb induziert i nach der universellen Eigenschaft der Lokalisierung einen Ringhomomorphismus

$$\bar{i}: S^{-1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \frac{a}{p^k} \mapsto \frac{i(a)}{i(p^k)} = \frac{a}{p^k}.$$

Insbesondere ist

$$\operatorname{im} \bar{i} = \left\{ \frac{a}{p^k} \mid a, k \in \mathbb{Z}, k \geq 0 \right\}$$

ein Unterring von \mathbb{Q} . Die Injektivität von \bar{i} ergibt sich wie im vorherigen Aufgabenteil. Damit ergibt sich dann, dass \bar{i} eine Isomorphismus $S^{-1}\mathbb{Z} \rightarrow \operatorname{im} \bar{i}$ induziert.