


15.1.1.

$\because x_n$ 收敛于 x $\therefore \forall \varepsilon = 1, \exists N, n > N$ 时, $\|x_n - x\| < 1$.

又 $\{x_1, \dots, x_N\}$ 有界,

$$\therefore \forall n, \|x_n\| \leq \max \left\{ \sup_{1 \leq k \leq N} \|x_k\|, 1 + \|x\| \right\}.$$

$\therefore \{x_n\}$ 有界.

15.1.2. 证内积连续

$$\begin{aligned} |x_n \cdot y_n - a \cdot b| &= |(x_n - a) \cdot y_n + a \cdot y_n - a \cdot b| \\ &= |(x_n - a) \cdot y_n + a \cdot (y_n - b)| \\ &\leq \|x_n - a\| \|y_n\| + \|a\| \|y_n - b\| \end{aligned}$$

又 $x_n \rightarrow a, \|y_n\|$ 有界, $y_n \rightarrow b$.

\therefore 上式收敛于 0.

15.2.2

15.2.2 $x \in R^m$, 指出下列点集是否开区域或闭区域? 是有界域还是无界域? (对 R^m 来说.)

(1) $a < |x| < b (b > a > 0)$;

(2) $(a_1 x \cdot e_1)^2 + \dots + (a_m x \cdot e_m)^2 \leq 1$;

(3) $x_m = 5, x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{m-1}^2 < 1$.

(1) 有界开区域

(2) 若 a_1, \dots, a_m 全不为 0, 则为有界闭区域

若 $\exists i, a_i = 0$, 但不全为 0, 则为无界闭区域

若 a_i 全为 0, 为 R^m , 无界, 又开又闭.

(3) 有界, 非开非闭.

15.2.3

15.2.3 设 $z \in R^m$ 是常向量, c 为常数. 证明:

(1) 半空间 $\{x \in R^m, x \cdot z < c\}$ 是开集.

(2) $\{x \in R^m, x \cdot z \geq c\}$ 是闭集.

(1) 设 $\exists x_0, x_0 \cdot z = c - \varepsilon < c$.

由内积连续, $\exists \delta, \forall x \in B(x_0, \delta), x \cdot z < c$.

$\therefore x_0$ 为内点, 开.

(2) 仍由内积连续, $\overset{\text{设}}{x_n \rightarrow x_0}, x_n \cdot z \geq c$, 则 $x_0 \cdot z \geq c$.

\therefore 闭.

Or 开集取补得闭集

15.5.4 求下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x + e^y}{\cos x - \sin y};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

(1)

$$e^x + e^y \rightarrow 2, \cos x - \sin y \rightarrow 1,$$

\therefore 极限为 2.

(2)

$$= \sqrt{y} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}. \quad \text{又} \quad \left| \frac{x^4 + y^2}{x^2 y} \right| \geq 2 \text{ (基本不等式)}$$

\therefore 上式趋于 0.

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2);$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)};$$

$$(6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2};$$

$$(7) \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2};$$

$$(8) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{y}{x+y}}.$$

$$(3) \quad \frac{\sin xy}{xy} \cdot y, \quad xy \rightarrow 0. \quad \therefore \frac{\sin xy}{xy} \rightarrow 1, \quad y \rightarrow 2. \quad \therefore \text{上式} \rightarrow 2.$$

$$(4) \quad x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)$$

$$x, y \text{ 充分小时, } | \ln y^2 | < | \ln(x^2 + y^2) | < 0.$$

$$| \ln y^2 | > | \ln(x^2 + y^2) |,$$

$$\therefore | x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) | < | x^2 | | y^2 \ln y^2 |.$$

$$\text{又} \quad u \ln u \rightarrow 0, \text{ when } u \rightarrow 0.$$

\therefore 极限为 0.

$$(5) \quad \frac{(x^2 + y^2)}{e^{(x+y)}}$$

$$= \frac{x^2}{e^x e^x} + \frac{y^2}{e^x e^y}$$

$$\leq \frac{x^2}{e^x} + \frac{y^2}{e^y} \rightarrow 0.$$

\therefore 极限为 0.

$$6. \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^2+y^2}$$

$$= \frac{\sin(x^3+y^3)}{x^3+y^3} \cdot \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}; \text{考虑 } \left| \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} \right| \leq \left| \frac{x^3}{x^2+y^2} \right| + \left| \frac{y^3}{x^2+y^2} \right|$$

$$\leq \left| \frac{x^3}{x^2} \right| + \left| \frac{y^3}{y^2} \right| \leq |x| + |y|$$

∴ 极限为 0.

$$7. \left(\frac{xy}{x^2+y^2} \right)^{x^2} \quad x, y \rightarrow \infty.$$

$$\left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2}, \quad \text{又 } x^2 \rightarrow \infty, \quad \therefore \text{极限为 } 0.$$

8.

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}} \quad x, y \rightarrow \infty.$$

取 $y = x \rightarrow \infty$.

取 $y = x^2 \rightarrow \infty$.

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{2}x} \rightarrow \sqrt{e}.$$

$$\left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+x^2}} \rightarrow (1+0)^1 = 1.$$

∴ 极限不存在.

15.5.5 对下列函数 $f(x, y)$, 证明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在:

(1) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2};$

(2) $f(x, y) = \frac{x^4 + 3x^2y^2 + 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2};$

齐次. 取 $y = x \rightarrow 0$,

取 $y = 2x \rightarrow 0$.

$$\frac{y^4 + 3y^4 + 2y^4}{4y^4} \rightarrow \frac{3}{2}$$

$$\frac{x^4 + 12x^4 + 16x^4}{25x^4} \rightarrow \frac{39}{25}$$

极限不存在.

(3) $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$

(4) $f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3};$

(5) $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}.$

(4). 取 $x = y$, $\frac{y^8}{y^6(1+y^2)^3} \rightarrow 0.$

取 $x = y^2$, $\frac{y^{12}}{(2y^4)^3} \rightarrow \frac{1}{2^3} \neq 0.$

(5). 取 $x = y$, $\frac{y^4}{2y^3} \rightarrow 0.$

取 $x = y(y-1)$, $x^3 = y^3(y-1)^3$, $x^2 + y^3 = y^3(y-1)^2 + 1$
 $= y^4(y^2 - 3y + 3)$

但 $x^2 y^2 = y^4(y-1)^2$, $y \rightarrow 0$, $x = y(y-1) \rightarrow 0$. 但

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^3} = \frac{(y-1)^2}{y^2 - 3y + 3} \not\rightarrow 0.$$

(15.6.4) 设 $u=f(x,y)$ 在 $M_0(x_0, y_0)$ 连续, $f(x_0, y_0) > 0$. 证

明: 存在 M_0 的一个邻域 $U(M_0)$ 使 $f(x,y)$ 在 $U(M_0)$ 取正值.

证明: 设 $f(x_0, y_0) = A > 0$. 取 $\varepsilon = \frac{A}{2}$.

则 $\exists \delta, (x,y) \in B[(x_0, y_0), \delta]$ 时, 有 $|f(x,y) - f(x_0, y_0)| \leq \frac{A}{2}$.

$\Rightarrow f(x,y) \geq \frac{A}{2} > 0$. 取 $U(M_0) = B[(x_0, y_0), \delta]$ 即可.

15.6.12 设二元数值函数 $f(x,y)$ 在全平面连续, $\lim_{r \rightarrow +\infty} f(x,y)$

$= A$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. 求证:

(1) $f(x,y)$ 在全平面有界;

(2) $f(x,y)$ 在全平面一致连续.

(1). 取 $\varepsilon = 1$. $\exists R > 0$, $r > R$ 时, $|f(x,y) - A| \leq 1$

即 $A-1 \leq f(x,y) \leq A+1$

又, $r \leq R$ 时, $|f(x,y)| \leq M$ (有界闭集上连续函数取最值)

$\therefore |f(x,y)| \leq \max\{M, |A+1|, |A-1|\}$

(2). $\forall \varepsilon > 0$. 取 $R > 0$. $r > R$ 时, $|f(x,y) - A| < \frac{\varepsilon}{4}$. (记 $x = (x,y)$)

$\Rightarrow |f(x_2) - f(x_1)| < |f(x_2) - A| + |f(x_1) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又, 于 $r \leq 1+R$ 时, 由一致连续性, $\exists \delta > 0$. $|x_2 - x_1| < \delta$. $|f(x_2) - f(x_1)| < \frac{\varepsilon}{4}$.

($|x_2| \leq 1+R, |x_1| \leq 1+R$). 取 $\delta' = \min(\delta, \frac{\varepsilon}{4})$

(转下一页)

则 $\forall x$, 至少有一成立:

$$\begin{cases} \|x\| + \delta \leq R+1 & \textcircled{1} \quad \text{取 } |y-x| < \delta' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \|x\| + \delta > R+1 & \textcircled{2} \quad x - \delta' < |y| < x + \delta' \end{cases}$$

对于 $\textcircled{1}$. $\|y-x\| < \delta$, 则 $\|y\| \leq R+1 - \delta + \delta = R+1$.

$$\Rightarrow |f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4} \quad (\text{因为 } \|x\|, \|y\| \leq R+1).$$

对于 $\textcircled{2}$. $\|y-x\| < \delta$, 则 $\|y\| > R+1 - \delta - \delta > R$.

$$\Rightarrow |f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\text{因为 } |x|, |y| > R).$$

□.

取 λ 取 λ .

15.6.15

设 $f(x)$ 在 R^m 连续, 对 $x \neq \theta$, $f(x) > 0$, 对任意 x 和 $c > 0$ 有 $f(cx) = cf(x)$. 求证: 存在 $a > 0$ 和 $b > 0$ 使得

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x| \quad (x \in R^m).$$

取 R^m 中单位球 E , 由 E 紧, f 于 E 上取最值.

$$\text{记 } b = \max_{x \in E} \{f(x)\} \quad a = \min_{x \in E} \{f(x)\}. \quad b \geq a > 0.$$

(若 $a = 0$, 则 $\exists x_0 \in E, f(x_0) = 0$ 矛盾).

$$\Rightarrow \forall x \in R^n, \quad a \leq f\left(\frac{x}{|x|}\right) \leq b. \quad \text{由 } f \text{ 正齐次性,}$$

$$a|x| \leq f(x) \leq b|x|$$

□.

15.6.16 A 是 $m \times m$ 矩阵, $\det A (A \text{ 的行列式}) \neq 0$. 求证: 存在正常数 α , 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^m$ 有

$$|Ax| \geq \alpha |x|.$$

由 $\det A \neq 0$, 知 A 非奇异. 将 A 看作 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的映射.

显然 A 连续, ($A(x_2 - x_1) \leq \|A\| \|x_2 - x_1\|$)

则 Ax 于 \mathbb{R}^n 单位球取最值, 且最值不取异号)

否则由介值性, $\exists x_0, |x_0|=1, Ax_0=0$, 与 A 非奇异矛盾.

不妨设 $\max_{|x|=1} Ax > \min_{|x|=1} Ax > 0$ ($\min_{|x|=1} Ax \neq 0$, 否则 $\exists x_0, Ax_0=0, |x_0|=1$).

$$\Rightarrow A \frac{x}{|x|} > \alpha. \quad Ax > \alpha |x|, \quad (|x| \neq 0).$$