

¿Qué agarre es mejor para la artritis?

De los métodos convencionales a nuestro método.



Molinillo: girar con las dos manos

Girar duele en la base del pulgar (AAOS, s. f.), que carga 12 veces la fuerza aplicada (Cooney y Chao, 1977).



Salero tradicional: sacudir

Mueve brazo y hombro una y otra vez, y no controla la dosis.



Dispensador de bomba: empujar con la palma

Carga la muñeca doblada hacia atrás.



Dosis 5: apretar con 4 dedos


Reparte la fuerza: solo pide un 2–3 % de la fuerza de la mano (Mathiowetz et al., 1985).

Conclusión: Dosis 5 se agarra con la muñeca recta y un ancho de 5 a 6 cm, la posición en la que la mano tiene más fuerza (Fransson y Winkel, 1991; O'Driscoll et al., 1992). Por eso cuesta menos y duele menos.

Usuario ideal: una pareja recién casada que recibe a la familia



- En 2024 se casaron **568.395 parejas** en Turquía, con 26 a 28 años de media (TÜİK, 2025).
- La familia se ve seguido: el **56,7 %** de los mayores de 60 recibe a sus hijos varias veces por semana (TÜİK, 2022).



Los padres: sin dolor

Casi la mitad de las personas con artritis tiene más de 65 años (Fallon et al., 2023).

→ **Se aprieta con 4 dedos, sin girar.**



Los niños: higiene

Los gérmenes pasan de las superficies a los dedos (Winther et al., 2007).

→ **Hermético: nadie toca la sal.**

14,8 g

al día en Turquía

5 g

máximo OMS

Todos: la dosis

En Turquía se comen 14,8 g de sal al día y el 41 % se añade en casa (Erdem et al., 2017). La OMS pide menos de 5 g (WHO, 2012).

→ **0,5 g por presión: 10 presiones = máximo del día.**