


¿Qué agarre es mejor para la artritis?

Comparamos 5 formas de usar un salero.



Girar

8/20


Girar y pellizcar es lo que más duele (AAOS, s. f.).



Sacudir

9/20


La muñeca se mueve una y otra vez y no controlas la dosis.



Pinza con el pulgar

11/20

La base del pulgar carga 12 veces la fuerza (Cooney y Chao, 1977).



Empujar con la palma

14/20

Mejor, pero carga la muñeca doblada.




Apretar con 4 dedos

19/20 **Mejor opción**

Reparte la fuerza y solo pide un 2–3 % de la fuerza de la mano (Mathiowetz et al., 1985).

Conclusión: apretar con 4 dedos sosteniendo el salero es lo que menos duele. Por eso Dosis 5 funciona así.

Usuario ideal: una pareja recién casada que recibe a la familia




Ellos compran el salero; lo usan también sus padres y sus sobrinos. Si funciona para el que más le cuesta, funciona para todos (Microsoft, 2016).



Los padres: fácil de usar

Casi la mitad de quienes tienen artritis tienen más de 65 años (Fallon et al., 2023).

→ **Se aprieta con 4 dedos, sin girar.**



Los niños: higiene

Los gérmenes pasan de las superficies a los dedos (Winther et al., 2007).

→ **Hermético: nadie toca la sal.**



Todos: la dosis

La OMS recomienda menos de 5 g de sal al día (WHO, 2012).

→ **0,5 g por presión: 10 presiones = el máximo del día.**