

Epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM 6 april 2021, 10:00

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van SARS-CoV-2 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van een SARS-CoV-2 infectie.

Niet van alle positief geteste personen die gemeld worden aan de GGD is bekend of ze zijn opgenomen in het ziekenhuis of zijn overleden. Dit komt doordat er geen meldingsplicht is voor ziekenhuisopnames of overlijden bij personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. De hier gepresenteerde door de GGD'en gemelde opname- en sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs (in tabellen) of in lichtere kleuren (in grafieken). De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal patiënten met COVID-19 dat opgenomen is in het ziekenhuis en het aantal daarvan dat is opgenomen op de intensive care. Deze aantallen zijn meer compleet en worden ook weergegeven in deze rapportage. De stichting NICE registreert niet of iemand vanwege COVID-19 ziekte is opgenomen of om een andere reden.

Open data

De volgende bestanden met data over SARS-CoV-2 en COVID-19 zijn openbaar beschikbaar:

- Cumulatieve aantallen per gemeente per dag, van het aantal personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden patiënten positief voor SARS-CoV-2 gemeld bij de GGD ten tijde van publicatie.
- Aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente per dag, volgens NICE registratie.
- Karakteristieken van elke voor SARS-CoV-2 positief geteste persoon in Nederland.
- Aantallen GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen naar veiligheidsregio, per datum.
- Aantallen GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in personen van 70 jaar en ouder woonachtig buiten een instelling naar veiligheidsregio, per datum.
- Aantallen GGD-meldingen van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen naar veiligheidsregio, per datum.
- Aantallen GGD-meldingen van SARS-CoV-2 per gemeente, per publicatiedatum.
- Het reproductiegetal van SARS-CoV-2.
- Aantal besmettelijke personen per dag.
- De Nationale SARS-CoV-2 afvalwatersurveillance.

Weergave van grafieken

In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de voorgaande week in aantallen aan het RIVM gemelde personen met een positieve uitslag voor SARS-CoV-2. Soms worden meldingen van de GGD aan het RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de persoon met een positieve uitslag voor SARS-CoV-2 aan de GGD wordt gemeld.

In figuur 1 t/m 10 en 13 t/m 15 worden de SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en weergegeven vanaf 1 februari 2021. In hoofdstuk 12 zijn figuur 34 t/m 53 opgenomen, die de gehele periode vanaf 27 februari 2020 weergeven.

Inhoudsopgave

| | \mathbf{Pag} | gina |
|----|--|----------------------|
| 1 | Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD'en vanaf 27 februari 2020 | 4 |
| 2 | Verloop over de tijd van SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021 2.1 Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV-2 2.2 COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE 2.3 Meldingen aan de GGD'en per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio 2.4 Aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio | 5 6 8 12 |
| 3 | Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en 3.1 Aantal SARS-CoV-2 meldingen per veiligheidsregio in de afgelopen week 3.2 Kaarten met SARS-CoV-2 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken . | 16 16 17 |
| 4 | Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en positief op SARS-CoV-2 geteste personen | 19 |
| 5 | Reishistorie van bij de GGD'en positief op SARS-CoV-2 geteste personen vanaf 1 februari 2021 en in de afgelopen week | 22 |
| 6 | 8 | 24 |
| | 6.1 Brononderzoek: Setting van mogelijke besmetting van personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 6.2 Contactonderzoek bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 | 24 26 |
| 7 | | 29 |
| 8 | Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder vanaf 1 februari 2021 8.1 Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder | 33 |
| 9 | SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD'en vanaf 1 februari 2021 | 34 |
| | O Schattingen en berekeningen 10.1 Schatting van het aantal besmettelijke personen gebaseerd op gegevens t/m 5 april 2021 | 44 46 |
| 11 | 1 SARS-CoV-2 gegevens uit overige bronnen 11.1 SARS-CoV-2 laboratoriumtests op basis van de virologische weekstaten 11.2 Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties 11.3 Infectieradar: Monitoring van klachten passend bij SARS-CoV-2 | 48 48 52 54 |

| 11.4 Totale sterfte in Nederland t/m 24 maart 2021 | 55 |
|--|---------------|
| 12 SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari 2020 | 56 |
| 12.1 SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020 | 56 |
| 12.2 COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gera | apporteerd |
| door de Stichting NICE vanaf 27 februari 2020 | 65 |
| 12.3 Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari | 2020 66 |
| 12.4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van personen positief voor | SARS-CoV-2 69 |
| 12.5 Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap bij overleden person | nen positief |
| voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar vanaf 27 februari 2020 | 72 |
| 12.6 Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra | 73 |
| 12.7 Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen | 75 |
| 12.8 Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van | 70 jaar en |
| ouder | 77 |
| 12.9 Surveillance van SARS-CoV-2 onder zorgmedewerkers | 78 |
| 12.10 Surveillance van SARS-CoV-2 onder onderwijs- | |
| en kinderopvangmedewerkers | 79 |

1 Samenvatting COVID-19 meldingen van de GGD'en vanaf 27 februari 2020

In Nederland zijn er sinds 27 februari 2020 in totaal 1313007 personen met SARS-CoV-2 gemeld door de GGD. COVID-19 is een meldingsplichtige infectie, echter geldt er geen meldingsplicht voor ziekenhuisopname of overlijden bij personen met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. De hier gepresenteerde opname- en sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

Tabel 1: Aantal door de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten gemeld door de GGD'en en aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 gemeld door de GGD'en^{1,2}

| Gezondheidsstatus | Totaal | % | Meldingen afgelopen week ³ | $Gecorrigeerd^4$ | Verschil met vorige week ⁵ |
|-------------------|---------|-----|--|------------------|--|
| Totaal gemeld | 1313007 | | 48186 | -162 | 48024 |
| Ziekenhuisopname | 26777 | 2.0 | 541 | -4 | 537 |
| Overleden | 16649 | 1.3 | 142 | -2 | 140 |

¹ Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor ziekenhuisopname voor of overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde opname- en sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

 $^{^{2}}$ Voor 412 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de directe oorzaak van overlijden is.


³ Meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM zijn gedaan. Dit betreft het aantal meldingen, opnames en overlijdens die in de afgelopen week nieuw aan het RIVM zijn gerapporteerd. Datum van melding aan de GGD, ziekenhuisopname of overlijden kan echter in een andere week vallen. Bij de meeste overige tabellen en figuren in dit rapport wordt de datum van melding, ziekenhuisopname of overlijden gebruikt. Deze cijfers zijn dus niet hetzelfde.

⁴ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00. Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per week kunnen daardoor variëren.

 $^{^{5}}$ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 6 april 10:00 ten opzichte van 30 maart 10:00.

2 Verloop over de tijd van SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021

2.1 Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV-2



Figuur 1: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021¹. (A) Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar meldingsdatum. (B) Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 34.

{\frac{1}{1}} Meldingen aan het RIVM van 1 februari t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni 2020 kan iedereen zich met klachten laten testen. Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren. Voor een overzicht van de totale sterfte in Nederland, zie Figuur 33. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is. Van 1 patiënt is de datum van overlijden niet bekend. Deze patiënt kan daarom niet worden weergegeven in deze figuren. }

2.2 COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE


De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal COVID-19 patiënten dat opgenomen is in het ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames is inclusief opnames op de intensive care. Er is mogelijk een vertraging van 2 tot 3 dagen in de data-aanlevering. Gegevens rechts van de stippellijn worden momenteel nog aangevuld door de ziekenhuizen. Voor het aantal COVID-19 patiënten op de intensive care (bedbezetting per dag), zie de Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.


Tabel 2: Aantal nieuwe ziekenhuisopnames en intensive care (IC) opnames van patiënten met COVID-19 per kalenderweek¹ van ziekenhuisopname².

| Datum van - tot | Ziekenhuis- of IC opname | Waarvan IC opnames |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 01-02-2021 - 07-02-2021 | 1205 | 174 |
| 08-02-2021 - 14-02-2021 | 1219 | 192 |
| 15-02-2021 - 21-02-2021 | 1221 | 240 |
| 22-02-2021 - 28-02-2021 | 1213 | 229 |
| 01-03-2021 - 07-03-2021 | 1236 | 280 |
| 08-03-2021 - 14-03-2021 | 1350 | 276 |
| 15-03-2021 - 21-03-2021 | 1518 | 318 |
| 22-03-2021 - 28-03-2021 | 1633 | 317 |
| 29-03-2021 - 04-04-2021 | 1588 | 376 |
| 05-04-2021 - 11-04-2021 | 64 | 33 |

¹ Een kalenderweek is gedefinieerd van maandag t/m zondag.

² De gegevens van de meest recente kalenderweek zijn nog niet volledig.






Figuur 2: (A) Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag in Nederlandse¹ ziekenhuizen, waarvan (B) Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse¹ intensive care (IC) afdelingen.


Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie – NICE. Gegevens bijgewerkt op 6 april, 15:18 uur. Voor uitgebreidere en nog actuelere informatie zie Stichting NICE.

[{]¹ Inclusief opnames op Duitse IC's ten tijde van overbezetting op de Nederlandse IC's.}


2.3 Meldingen aan de GGD'en per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio




Figuur 3: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per leeftijdsgroep (in jaren). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 35.



Figuur 4: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 1). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 37.




Figuur 5: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 2). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 38.




Figuur 6: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 3). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 39.


2.4 Aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per leeftijdsgroep (in jaren) en per veiligheidsregio




Figuur 7: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per leeftijdsgroep (in jaren). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 36.



Figuur 8: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 1). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 40. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.



Figuur 9: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 2). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 41. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.



Figuur 10: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021, per veiligheidsregio (deel 3). Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari 2020, zie Figuur 42. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.

3 Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en

3.1 Aantal SARS-CoV-2 meldingen per veiligheidsregio in de afgelopen week

Tabel 3: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio in de afgelopen week, totaal en per 100.000 inwoners^{1,2}.


| Veiligheidsregio ³ | Totaal gemeld | /100.000 | Overleden | /100.000 |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
| Totaal gemeld | 47464 | 272.7 | 88 | 0.5 |
| Groningen | 998 | 170.3 | 5 | 0.9 |
| Fryslân | 1488 | 228.9 | 5 | 0.8 |
| Drenthe | 945 | 191.4 | 2 | 0.4 |
| IJsselland | 1232 | 231.9 | 1 | 0.2 |
| Twente | 1225 | 194.1 | 0 | 0.0 |
| Noord- en Oost-Gelderland | 2242 | 270.9 | 1 | 0.1 |
| Gelderland-Midden | 1432 | 205.6 | 4 | 0.6 |
| Gelderland-Zuid | 1772 | 315.5 | 3 | 0.5 |
| Utrecht | 3533 | 260.8 | 6 | 0.4 |
| Noord-Holland-Noord | 1689 | 254.8 | 5 | 0.8 |
| Zaanstreek-Waterland | 1183 | 348.8 | 3 | 0.9 |
| Kennemerland | 1637 | 297.7 | 3 | 0.5 |
| Amsterdam-Amstelland | 2681 | 250.4 | 9 | 0.8 |
| Gooi en Vechtstreek | 498 | 193.7 | 1 | 0.4 |
| Haaglanden | 3297 | 295.2 | 1 | 0.1 |
| Hollands-Midden | 2676 | 330.8 | 2 | 0.2 |
| Rotterdam-Rijnmond | 3853 | 291.1 | 12 | 0.9 |
| Zuid-Holland-Zuid | 1873 | 407.7 | 3 | 0.7 |
| Zeeland | 1025 | 267.3 | 0 | 0.0 |
| Midden- en West-Brabant | 3252 | 288.7 | 1 | 0.1 |
| Brabant-Noord | 2328 | 354.9 | 4 | 0.6 |
| Brabant-Zuidoost | 2329 | 298.4 | 5 | 0.6 |
| Limburg-Noord | 1957 | 376.3 | 9 | 1.7 |
| Limburg-Zuid | 1489 | 249.3 | 2 | 0.3 |
| Flevoland | 830 | 196.2 | 1 | 0.2 |

Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 30 maart 10:01 t/m 6 april 10:00 uur.

² Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


³ Van de meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM gedaan zijn, is van 22 mensen de veiligheidsregio niet bekend.

3.2 Kaarten met SARS-CoV-2 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken



Figuur 11: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente met GGD meldingsdatum van 23 maart t/m 6 april 10:00 uur. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer. De lichtgrijze lijnen geven de gemeentegrenzen weer.

Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 12: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente met overlijdensdatum van 23 maart t/m 6 april 10:00 uur. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer. De lichtgrijze lijnen geven gemeentegrenzen weer.

Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.

4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en positief op SARS-CoV-2 geteste personen

Tabel 4: Leeftijdsverdeling van aan de GGD'en gemelde en overleden personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 in de afgelopen week^{1,2}, in totaal, percentage en per 100.000 personen.

| | Tota | Totaal gemeld | | C | verleder | n |
|----------------|--------|---------------|--------------|--------|----------|----------|
| Leeftijdsgroep | Aantal | $\%^3$ | $/100.000^4$ | Aantal | $\%^5$ | /100.000 |
| Totaal gemeld | 47486 | | 273 | 88 | | 0.5 |
| 0-4 | 918 | 1.9 | 107 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5-9 | 2715 | 5.7 | 298 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10-14 | 3224 | 6.8 | 338 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15-19 | 3789 | 8.0 | 361 | 0 | 0.0 | 0 |
| 20-24 | 4458 | 9.4 | 407 | 0 | 0.0 | 0 |
| 25-29 | 3639 | 7.7 | 320 | 0 | 0.0 | 0 |
| 30-34 | 3475 | 7.3 | 315 | 1 | 1.1 | 0.1 |
| 35-39 | 3421 | 7.2 | 327 | 0 | 0.0 | 0 |
| 40-44 | 3477 | 7.3 | 340 | 1 | 1.1 | 0.1 |
| 45-49 | 3627 | 7.6 | 306 | 1 | 1.1 | 0.1 |
| 50-54 | 3803 | 8.0 | 297 | 1 | 1.1 | 0.1 |
| 55-59 | 3607 | 7.6 | 288 | 4 | 4.5 | 0.3 |
| 60-64 | 2486 | 5.2 | 222 | 5 | 5.7 | 0.4 |
| 65-69 | 1731 | 3.6 | 174 | 7 | 8.0 | 0.7 |
| 70-74 | 1452 | 3.1 | 154 | 13 | 14.8 | 1.4 |
| 75-79 | 900 | 1.9 | 142 | 15 | 17.0 | 2.4 |
| 80-84 | 433 | 0.9 | 99 | 20 | 22.7 | 4.6 |
| 85-89 | 222 | 0.5 | 87 | 12 | 13.6 | 4.7 |
| 90-94 | 79 | 0.2 | 77 | 7 | 8.0 | 6.8 |
| 95+ | 30 | 0.1 | 112 | 1 | 1.1 | 3.7 |
| Niet vermeld | 0 | 0.0 | | 0 | 0.0 | |

¹ Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 30 maart 10:01 t/m 6 april 10:00 uur.

² Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

³ Percentage van totaal aantal meldingen in de afgelopen week per leeftijdsgroep (in jaren).

⁴ Per 100.000 personen binnen deze leeftijdsgroep (in jaren).

⁵ Percentage van totaal aantal overlijdens in de afgelopen week per leeftijdsgroep (in jaren).

Tabel 5: Man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 en van overleden personen positief voor SARS-CoV-2 in de afgelopen week^{1,2}.

| | Tot | Totaal gemeld | | | Overleden | | |
|---------------|--------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|--|
| Geslacht | Aantal | $\%^3$ | $/100.000^4$ | Aantal | $\%^5$ | /100.000 | |
| Totaal gemeld | 47486 | | 272.8 | 88 | | 0.5 | |
| Man | 23929 | 50.4 | 276.7 | 60 | 68.2 | 0.7 | |
| Vrouw | 23557 | 49.6 | 268.9 | 28 | 31.8 | 0.3 | |


 $^{^{1}\,}$ Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 of overleden aan COVID-19 met een datum van melding aan de GGD of een datum van overlijden in de periode van 30 maart 10:01 t/m 6 april 10:00 uur.

² Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Man-vrouwverdeling van het percentage van totaal aantal meldingen in de afgelopen week.

⁴ Per 100.000 personen per geslacht.

⁵ Man-vrouwverdeling van het totaal aantal overlijdens in de afgelopen week.



Figuur 13: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021. (A) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2. (B) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren.

5 Reishistorie van bij de GGD'en positief op SARS-CoV-2 geteste personen vanaf 1 februari 2021 en in de afgelopen week

Tabel 6: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest¹.

| | Vanaf 1 fe | bruari | Afgelopen week 2 | |
|-------------------|------------|--------|---------------------|------|
| | Aantal | % | Aantal | % |
| Totaal gemeld | 335125 | | 48186 | |
| Reishistorie | 3922 | 1.2 | 552 | 1.1 |
| Geen reishistorie | 298086 | 88.9 | 39439 | 81.8 |
| Niet vermeld | 33117 | 9.9 | 8195 | 17.0 |

¹ Of een persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 wel of geen reishistorie heeft, wordt vanaf 31 augustus 2020 bepaald door de volgende criteria: a) De persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 heeft bij de GGD aangegeven een reishistorie te hebben en b) er zit maximaal 14 dagen tussen de terugkomstdag en de eerste ziektedag van de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2.

² Meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM zijn gedaan.

Tabel 7: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats.

| | Vanaf 1 februari | | Afgelopen week ¹ | |
|------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|------|
| Land van verblijf | Aantal | % | Aantal | % |
| Duitsland | 964 | 24.6 | 160 | 29.0 |
| België | 946 | 24.1 | 120 | 21.7 |
| Polen | 401 | 10.2 | 62 | 11.2 |
| Curação | 138 | 3.5 | 36 | 6.5 |
| Turkije | 163 | 4.2 | 27 | 4.9 |
| Frankrijk | 229 | 5.8 | 25 | 4.5 |
| Spanje | 85 | 2.2 | 13 | 2.4 |
| Italië | 81 | 2.1 | 12 | 2.2 |
| India | 51 | 1.3 | 10 | 1.8 |
| Verenigde Staten | 54 | 1.4 | 10 | 1.8 |
| Zwitserland | 53 | 1.4 | 10 | 1.8 |
| Roemenië | 57 | 1.5 | 7 | 1.3 |
| Egypte | 37 | 0.9 | 6 | 1.1 |
| Hongarije | 39 | 1.0 | 6 | 1.1 |
| Kenia | 22 | 0.6 | 6 | 1.1 |
| Pakistan | 22 | 0.6 | 6 | 1.1 |
| Denemarken | 30 | 0.8 | 5 | 0.9 |
| Aruba | 21 | 0.5 | 4 | 0.7 |
| Bonaire | 27 | 0.7 | 4 | 0.7 |
| Griekenland | 13 | 0.3 | 4 | 0.7 |
| Oostenrijk | 46 | 1.2 | 4 | 0.7 |
| Ver. Arab. Emiraten | 54 | 1.4 | 4 | 0.7 |
| Overig | 858 | 21.9 | 62 | 11.2 |
| Gereisd, maar land is niet vermeld | 32 | 0.8 | 5 | 0.9 |

 $^{^{1}\,}$ Meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM zijn gedaan.

6 Bron- en contactonderzoek van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en

Wanneer iemand besmet is met SARS-CoV-2 start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een landelijk protocol, met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

6.1 Brononderzoek: Setting van mogelijke besmetting van personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2

In het brononderzoek, dat door de GGD wordt uitgevoerd bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, wordt nagegaan of er gerelateerde ziektegevallen zijn die de bron kunnen zijn. Als dit het geval is wordt vermeld in welke setting de besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. Voor de gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en waarvan de setting bekend is, wordt in Tabel 9 vermeld om welke setting het gaat.

Tabel 8: Aantal aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 naar aanwezigheid van gerelateerde ziektegevallen¹.

| | Vanaf 1 fe | Vanaf 1 februari | | Afgelopen week 2 | |
|--------------------------------------|------------|------------------|--------|---------------------|--|
| Gerelateerde ziektegevallen aanwezig | Aantal | % | Aantal | % | |
| Totaal gemeld | 335125 | | 48186 | | |
| Ja, setting vermeld | 214619 | 64.0 | 27850 | 57.8 | |
| Ja, setting niet vermeld | 1329 | 0.4 | 140 | 0.3 | |
| Ja, setting onbekend | 339 | 0.1 | 34 | 0.1 | |
| Nee | 86852 | 25.9 | 11971 | 24.8 | |
| Niet vermeld | 31986 | 9.5 | 8191 | 17.0 | |

¹ Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle personen positief voor SARS-CoV-2 getest worden. De werkelijke aantallen zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

 $^{^2\,}$ Meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM zijn gedaan.

Tabel 9: Vermelde mogelijke settings van besmetting van aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen^{1,2}.

| | Vanaf 1 fe | ebruari | Afgelopen week ³ | |
|---|------------|---------|-----------------------------|------|
| Setting | Aantal | % | Aantal | % |
| Thuissituatie (huisgenoten inclusief niet-samenwonende partner) | 121734 | 56.7 | 16381 | 58.8 |
| Bezoek in de thuissituatie (van of bij familie, vrienden, enz.) | 42433 | 19.8 | 5572 | 20.0 |
| Werksituatie | 33827 | 15.8 | 3907 | 14.0 |
| School en kinderopvang | 14756 | 6.9 | 2442 | 8.8 |
| Vrijetijdsbesteding, zoals sportclub | 955 | 0.4 | 186 | 0.7 |
| Feest (feest, verjaardag, borrel, bruiloft, enz.) | 856 | 0.4 | 145 | 0.5 |
| 2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis | 1856 | 0.9 | 141 | 0.5 |
| Overige gezondheidszorg | 1542 | 0.7 | 128 | 0.5 |
| Verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen ⁴ | 5190 | 2.4 | 103 | 0.4 |
| Overige woonvoorziening | 1048 | 0.5 | 83 | 0.3 |
| Medereiziger / reis / vakantie | 314 | 0.1 | 46 | 0.2 |
| Studentenvereniging/-activiteiten | 345 | 0.2 | 44 | 0.2 |
| Religieuze bijeenkomsten | 362 | 0.2 | 58 | 0.2 |
| 1e lijn gezondheidszorg / huisarts | 593 | 0.3 | 51 | 0.2 |
| Woonvoorziening voor mensen met een beperking | 1782 | 0.8 | 45 | 0.2 |
| Uitvaart | 693 | 0.3 | 64 | 0.2 |
| Vlucht | 104 | 0.0 | 23 | 0.1 |
| Horeca | 207 | 0.1 | 32 | 0.1 |
| Dagopvang voor ouderen en mensen met een | 643 | 0.3 | 29 | 0.1 |
| beperking | | | | |
| Overige dagopvang | 261 | 0.1 | 33 | 0.1 |
| Koor | 25 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Hospice | 53 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Overig | 3425 | 1.6 | 379 | 1.4 |

¹ Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle personen positief voor SARS-CoV-2 getest worden. De werkelijke aantallen zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per positief op SARS-CoV-2 getest persoon kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 9 worden berekend ten opzichte van het aantal personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 waarbij sprake is van gerelateerde gevallen en tenminste één setting is vermeld (Tabel 8).

³ Meldingen die tussen 30 maart 10:01 en 6 april 10:00 aan het RIVM zijn gedaan.

⁴ Vanaf 22 oktober 2020 wordt de setting 'verpleeghuis' niet meer automatisch toegewezen aan verpleeghuisbewoners woonachtig in een besmette locatie. Hierdoor is het percentage meldingen met de setting 'verpleeghuis' lager, maar wel representatiever.

6.2 Contactonderzoek bij personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2

Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest, en besmet zou kunnen hebben. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was, óf mensen die minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact hadden met de besmette persoon.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en bespreekt leefregels waaronder het thuis in quarantaine blijven. De andere (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Nauwe contacten krijgen sinds 3 februari 2021 het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen en op dag 5 na de blootstelling een (tweede) test te doen om uit quarantaine te mogen. Het advies aan niet nauwe contacten is om zich bij klachten zo snel mogelijk te laten testen, en anders op of rond dag 5 na de blootstelling. De GGD registreert het aantal nauwe en niet nauwe contacten van de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 (Tabel 11). Alleen de nauwe contacten worden op individuele basis geregistreerd; indien nauwe contacten gelinkt zijn aan meerdere besmette personen worden ze niet dubbel geregistreerd.

In periodes met een groot aantal besmettingen kan de uitvoering en registratie van het BCO door de GGD'en tijdelijk worden aangepast. Deze GGD'en vragen besmette personen dan zelf hun contacten te waarschuwen met behulp van informatie van de GGD. Als volgens een arts van de GGD sprake is van een risicogroep of risicovolle situatie wordt het BCO wel volgens de landelijke werkwijze uitgevoerd.

Tabel 10: Aantallen aan de GGD'en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzoek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd¹, per kalenderweek.

| | | Gevonden via BCO ² | | Contactinvents uitgevoer | |
|------------|------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|------|
| Start week | Nieuwe meldingen | Aantal | % | Aantal | % |
| 01-02-2021 | 26465 | 10623 | 40.1 | 24028 | 90.8 |
| 08-02-2021 | 23898 | 9423 | 39.4 | 21839 | 91.4 |
| 15-02-2021 | 28756 | 11478 | 39.9 | 26619 | 92.6 |
| 22-02-2021 | 31389 | 12680 | 40.4 | 29455 | 93.8 |
| 01-03-2021 | 31635 | 12866 | 40.7 | 29646 | 93.7 |
| 08-03-2021 | 38483 | 15700 | 40.8 | 36251 | 94.2 |
| 15-03-2021 | 45134 | 18051 | 40.0 | 42389 | 93.9 |
| 22-03-2021 | 51361 | 21097 | 41.1 | 47945 | 93.3 |
| 29-03-2021 | 48072 | 19307 | 40.2 | 43903 | 91.3 |

¹ Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe SARS-CoV-2 melding in kaart brengt welke contacten deze persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

Tabel 11: Totaal en gemiddeld aantal contacten van gemelde personen per kalenderweek per categorie contact 1 .

| | Huisgenoten | | Overig nauwe contacten | | Niet nauwe contacten | |
|------------|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Start week | Totaal | Gemiddeld aantal | Totaal | Gemiddeld aantal | Totaal | Gemiddeld aantal |
| 01-02-2021 | 41210 | 1.8 | 22430 | 1.0 | 65345 | 2.8 |
| 08-02-2021 | 37447 | 1.7 | 21986 | 1.0 | 59497 | 2.8 |
| 15-02-2021 | 45564 | 1.7 | 32993 | 1.3 | 76591 | 3.0 |
| 22-02-2021 | 50060 | 1.7 | 34500 | 1.2 | 73612 | 2.6 |
| 01-03-2021 | 49999 | 1.7 | 40834 | 1.4 | 86669 | 3.0 |
| 08-03-2021 | 59126 | 1.7 | 58223 | 1.6 | 121772 | 3.5 |
| 15-03-2021 | 66388 | 1.6 | 67239 | 1.6 | 150977 | 3.7 |
| 22-03-2021 | 73906 | 1.6 | 74023 | 1.6 | 172507 | 3.7 |
| 29-03-2021 | 66046 | 1.5 | 64520 | 1.5 | 163375 | 3.8 |

¹ Hierbij worden alleen de nieuwe SARS-CoV-2 meldingen meegenomen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd.

² Meldingen waarbij de persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 in het kader van BCO door de GGD of door een andere persoon met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 is gewaarschuwd.

Tabel 12: Aantal nauwe contacten dat opgevolgd wordt door de GGD en aantal en percentage met een SARS-CoV-2 infectie, per categorie nauw contact, per kalenderweek^{1,2}.

| | Huisgenoten | | | Overig nauwe contacten | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|-----------------|------------|
| Start week ³ | Aantal | Aantal positief | % Positief | Aantal | Aantal positief | % Positief |
| 01-02-2021 | 20458 | 5997 | 29.3 | 11973 | 1290 | 10.8 |
| 08-02-2021 | 18401 | 5221 | 28.4 | 11677 | 1159 | 9.9 |
| 15-02-2021 | 23025 | 6726 | 29.2 | 18294 | 1613 | 8.8 |
| 22-02-2021 | 26516 | 7062 | 26.6 | 18771 | 1531 | 8.2 |
| 01-03-2021 | 26356 | 7080 | 26.9 | 22508 | 1674 | 7.4 |
| 08-03-2021 | 34611 | 8907 | 25.7 | 27323 | 1890 | 6.9 |
| 15-03-2021 | 31080 | 7677 | 24.7 | 20714 | 1447 | 7.0 |
| 22-03-2021 | 22325 | 5206 | 23.3 | 13901 | 975 | 7.0 |
| 29-03-2021 | 17823 | 2712 | 15.2 | 9599 | 509 | 5.3 |

¹ Het betreft alleen nauwe contacten die op individuele basis geregistreerd zijn door de GGD. Niet nauwe contacten worden pas individueel geregistreerd als ze zich bij de GGD melden met klachten en worden daarom hier niet getoond.


² In verband met de monitorperiode van 10 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente periode.

³ Het aantal positieve en percentage positieve contacten in de grijze weken zijn onderschattingen van de werkelijke aantallen en percentages in verband met een afgeschaald BCO.

7 Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen, woonzorgcentra en gehandicaptenzorginstellingen vanaf 1 februari 2021


7.1 Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Vanaf 1 juli 2020 vraagt de GGD voor alle personen positief voor SARS-CoV-2 systematisch na of zij bewoner zijn van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen en niet werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, maar de postcode (bijv. 1234AB) komt wel overeen met de vestiging van een woonzorgcentrum of verpleeghuis en de persoon is 70 jaar of ouder, wordt de persoon toch ingedeeld als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum.



Figuur 14: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD'en vanaf 1 februari 2021¹. (A) Aantal gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}




Figuur 15: Aantal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties met SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021¹. Aantal nieuwe verpleeghuis- en woonzorgcentrumlocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een verpleeghuis of woonzorgcentrum wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 zijn gemeld.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. $\}$


7.2 Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen

Vanaf 1 juli wordt gestructureerd nagevraagd of een persoon in een gehandicaptenzorginstelling woont.



Figuur 16: Aantal aan de GGD'en gemelde gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021¹. (A) Aantal gemelde gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden gehandicaptenzorginstellingbewoners met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}




Figuur 17: Aantal nieuwe gehandicaptenzorginstellinglocaties met SARS-CoV-2 vanaf 1 februari 2021^1 . Aantal nieuwe gehandicaptenzorginstellinglocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een gehandicaptenzorginstellinglocatie wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 zijn gemeld.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. $\}$

8 Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder vanaf 1 februari 2021

8.1 Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder



Figuur 18: Aantal zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD'en vanaf 1 februari 2021¹. (A) Aantal gemelde zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 2021 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}

9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD'en vanaf 1 februari 2021


Vanaf 1 juni 2020 kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie zich laten testen door de GGD. Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij in contact zijn geweest met een persoon die positief is getest op SARS-CoV-2 infectie. Vanaf 1 juni wordt in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT gebruikt. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 februari 2021, geëxporteerd op 5 april 2021.

Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortejaar beschikbaar is om de leeftijd van personen getest op SARS-CoV-2 infectie te bepalen, is het jaar van testafname minus het geboortejaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat een deel van de personen getest op SARS-CoV-2 een jaar te oud is ingeschat.

Tabel 13: Aantal testen uitgevoerd door de GGD'en, met bekende uitslag.

| Datum van - tot ¹ | Aantal testen met uitslag | Aantal positief | Percentage positief |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 01-02-2021 - 07-02-2021 | 195166 | 20871 | 10.7 |
| 08-02-2021 - 14-02-2021 | 190192 | 21369 | 11.2 |
| 15-02-2021 - 21-02-2021 | 263505 | 25587 | 9.7 |
| 22-02-2021 - 28-02-2021 | 317211 | 27971 | 8.8 |
| 01-03-2021 - 07-03-2021 | 361470 | 28847 | 8.0 |
| 08-03-2021 - 14-03-2021 | 461101 | 35274 | 7.6 |
| 15-03-2021 - 21-03-2021 | 517608 | 41496 | 8.0 |
| 22-03-2021 - 28-03-2021 | 550316 | 46575 | 8.5 |
| 29-03-2021 - 04-04-2021 | 496742 | 44042 | 8.9 |
| Totaal | 3353311 | 292032 | 8.7 |

¹ De gegevens van de meest recente week zijn nog niet volledig.



Figuur 19: Aantal testen¹ per kalenderweek en percentage positieve testen per kalenderweek vanaf 1 februari 2021.

 $^{\{^1}$ De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het absolute aantal afgenomen tests weer (y-as rechterzijde). $\}$

Tabel 14: Aantal testen uitgevoerd door de GGD'en, met bekende testuitslag vanaf 1 februari 2021 per leeftijdsgroep.


| | Vai | naf 1 februar | i | Afgelop | en kalenderv | veek ¹ |
|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Leeftijdsgroep | Aantal getest met uitslag | Aantal positief | Percentage positief | Aantal getest | Aantal positief | Percentage positief |
| 0 - 3 | 39627 | 2470 | 6.2 | 8728 | 438 | 5.0 |
| 4 - 12 | 514299 | 29696 | 5.8 | 85412 | 4962 | 5.8 |
| 13 - 17 | 170554 | 17780 | 10.4 | 29875 | 2835 | 9.5 |
| 18 - 24 | 359999 | 38231 | 10.6 | 56023 | 5965 | 10.6 |
| 25 - 29 | 263865 | 22559 | 8.5 | 39374 | 3375 | 8.6 |
| 30 - 39 | 617955 | 42996 | 7.0 | 87995 | 6461 | 7.3 |
| 40 - 49 | 483084 | 41553 | 8.6 | 69091 | 6355 | 9.2 |
| 50 - 59 | 412139 | 47050 | 11.4 | 56110 | 6865 | 12.2 |
| 60 - 69 | 306196 | 29274 | 9.6 | 40975 | 4016 | 9.8 |
| 70 - 79 | 143844 | 14734 | 10.2 | 19084 | 2194 | 11.5 |
| 80+ | 39570 | 5403 | 13.7 | 3759 | 524 | 13.9 |
| Niet vermeld | 2179 | 286 | 13.1 | 316 | 52 | 16.5 |

 $^{^{1}}$ Van 29 maart tot en met 4 april.

Tabel 15: Aantal testen uitgevoerd door de GGD'en, met bekende testuitslag vanaf 1 februari 2021 per geslacht.

| | Va | naf 1 febuari | | Afgelop | en kalenderw | veek ¹ |
|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Geslacht | Aantal getest met uitslag | Aantal positief | Percentage positief | Aantal getest met uitslag | Aantal positief | Percentage positief |
| Man | 1529192 | 144427 | 9.4 | 230187 | 22181 | 9.6 |
| Vrouw | 1813230 | 146476 | 8.1 | 265443 | 21745 | 8.2 |
| Niet vermeld | 10889 | 1129 | 10.4 | 1112 | 116 | 10.4 |

 $^{^{1}}$ Van 29 maart tot en met 4 april.



Figuur 20: Aantal testen¹ en percentage positieve testen per kalenderweek en per leeftijdsgroep vanaf 1 februari 2021².

 $^{\{^1}$ De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het aantal afgenomen tests per 100.000 inwoners weer (y-as rechterzijde). $\{\}\{^2$ Met het openen van de scholen op 8 februari is het testbeleid voor kleine kinderen (0-4) en kinderen die op de basisschool zitten veranderd. $\}$

Tabel 16: Aantal testen en percentage positief per doelgroep uitgevoerd door de GGD'en.


| | Vai | naf 1 febru | ari | Afgelopen kalenderweek ¹ | | |
|--|---------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|
| Groep | Aantal | Aantal | Percentage | Aantal | Aantal | Percentage |
| | getest | positief | positief | getest | positief | positief |
| Zorgmedewerkers ziekenhuizen | 22923 | 1410 | 6.2 | 3497 | 199 | 5.7 |
| Zorgmedewerkers verpleeg- of | 42813 | 3080 | 7.2 | 5210 | 317 | 6.1 |
| verzorgingshuizen | | | | | | |
| Zorgmedewerkers elders | 118048 | 7472 | 6.3 | 15194 | 902 | 5.9 |
| Kinderopvang medewerkers | 32613 | 1869 | 5.7 | 4287 | 248 | 5.8 |
| Basisschool- en BSO personeel | 108103 | 4853 | 4.5 | 16465 | 846 | 5.1 |
| Middelbaar onderwijspersoneel | 37226 | 2188 | 5.9 | 6739 | 422 | 6.3 |
| Hoger onderwijspersoneel | 47150 | 2524 | 5.4 | 9548 | 564 | 5.9 |
| Horeca | 18820 | 1550 | 8.2 | 2915 | 254 | 8.7 |
| OV medewerkers | 4860 | 454 | 9.3 | 712 | 84 | 11.8 |
| $\mathrm{Handhaving}^2$ | 21158 | 1564 | 7.4 | 2908 | 192 | 6.6 |
| Kappers, manicures, pedicures en | 5588 | 514 | 9.2 | 1174 | 125 | 10.6 |
| schoonheidsspecialisten | | | | | | |
| Overige contactberoepen | 253734 | 22264 | 8.8 | 37167 | 3488 | 9.4 |
| Mantelzorgers | 4441 | 303 | 6.8 | 549 | 51 | 9.3 |
| Overige niet-contact beroepen | 426315 | 33710 | 7.9 | 58604 | 5061 | 8.6 |
| Getest ihkv BCO $(0-3 \text{ jaar})^{3,4}$ | 12254 | 1451 | 11.8 | 2348 | 240 | 10.2 |
| Getest ihkv BCO $(4-12 \text{ jaar})^{3,4}$ | 136282 | 15188 | 11.1 | 26614 | 2456 | 9.2 |
| Getest ihkv BCO $(13-17 \text{ jaar})^{3,4}$ | 48862 | 8014 | 16.4 | 8928 | 1228 | 13.8 |
| Getest ihkv BCO $(18+)^{3,4}$ | 405500 | 64336 | 15.9 | 59067 | 8713 | 14.8 |
| Onbekend | 1606621 | 119288 | 7.4 | 234816 | 18652 | 7.9 |

¹ Van 29 maart tot en met 4 april.

² Onder handhaving vallen medewerkers bij politie, BOA, marechaussee, brandweer en Dienst Justitiële Inrichtingen.

³ Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.

⁴ Vanaf 22 december 2020 wordt op een nieuwe manier bepaald of iemand in het kader van BCO is getest.




Figuur 21: Aantal testen¹ en percentage positieve testen per kalenderweek en per doelgroep vanaf 1 februari 2021.

^{{\}begin{subarray}{l} De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het absolute aantal afgenomen tests weer (y-as rechterzijde).}




Figuur 22: Aantal testen¹ en percentage positieve testen per kalenderweek en per doelgroep vanaf 1 februari 2021².

[{]¹ De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het absolute aantal afgenomen tests weer (y-as rechterzijde).} {}{² Vanaf 22 december 2020 wordt op een nieuwe manier bepaald of iemand in het kader van BCO is getest. Om deze reden zijn er geen waarden weergegeven in de periode tot 22 december 2020.}



Figuur 23: Aantal testen¹ per week en percentage positieve testen per kalenderweek per veiligheidsregio vanaf 1 februari 2021 (deel 1).


 $^{\{^1}$ De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het aantal afgenomen tests per 100.000 inwoners weer (y-as rechterzijde). $\}$




Week van afname

Figuur 24: Aantal testen¹ per week en percentage positieve testen per kalenderweek per veiligheidsregio vanaf 1 februari 2021 (deel 2).

 $^{\{^1}$ De doorlopende paarse lijn geeft het percentage positief weer (y-as linkerzijde). De grijze balkjes geven het aantal afgenomen tests per 100.000 inwoners weer (y-as rechterzijde). $\}$



Figuur 25: Aantal geteste personen voor SARS-CoV-2 waarvan de testuitslag bekend is per 100.000 inwoners per veiligheidsregio op basis van woonplaats van de geteste personen in de afgelopen kalenderweek (van 29 maart tot en met 4 april). De grijze lijnen geven de grenzen van de veiligheidsregio's weer.



Figuur 26: Percentage positieve testen per veiligheidsregio waar op basis van woonplaats van de persoon met een testuitslag voor SARS-CoV-2 in de afgelopen kalenderweek (van 29 maart tot en met 4 april). De grijze lijnen geven de grenzen van de veiligheidsregio's weer.


10 Schattingen en berekeningen

10.1 Schatting van het aantal besmettelijke personen gebaseerd op gegevens t/m 5 april 2021

Als iemand het coronavirus oploopt, is diegene een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen het coronavirus opgelopen hebben in een bepaalde periode, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in de algemene bevolking. Deze schatting gaat gepaard met onzekerheid: het exacte aantal is onbekend, maar we kunnen door berekeningen aangeven tussen welke waarden het zich waarschijnlijk bevindt. Op 29 maart lag het geschatte aantal besmettelijken waarschijnlijk tussen 112534 en 194511 personen.

De methode om het aantal besmettelijken te schatten is voortdurend in ontwikkeling. Het aantal besmettelijken wordt nu geschat op basis van serologische gegevens en ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep. De seroprevalentie (het aantal mensen dat aantoonbare antistoffen heeft tegen SARS-CoV-2) per leeftijdsgroep geeft een goed beeld van hoeveel mensen er tot aan het moment van meting besmet zijn geraakt. Hierbij gaan we ervan uit dat iemand die een antilichaamrespons tegen SARS-CoV-2 heeft ook ooit besmettelijk is geweest. Gecombineerd met het totaal aantal ziekenhuisopnames tot aan datzelfde moment wordt het aantal besmette personen per ziekenhuisopname geschat; dit aantal verschilt per leeftijdsgroep. Op deze manier kunnen recente ziekenhuisopnames omgerekend worden naar recente besmettingen. Voor het berekenen van het aantal besmettelijke personen per dag in Nederland wordt ook de duur van besmettelijkheid gebruikt. Op basis van informatie over de incubatietijd en de gerapporteerde tijd tussen de eerste ziektedagen van geïnfecteerde en besmetter, kunnen we veronderstellen dat een besmet persoon van twee dagen vóór de eerste symptomen tot vier tot acht dagen na de eerste symptomen besmettelijk is.


Vanaf 8 oktober gebruiken we serologische gegevens uit de tweede Pienter-Coronastudie van het RIVM. De belangrijkste resultaten van deze studie staan hier. In deze studie zijn begin juni antistoffen bepaald in een willekeurige steekproef van de Nederlandse bevolking. Vóór 8 oktober gebruikten we de gegevens uit de eerste Pienter-Coronastudie, van begin april. Tussen 12 juni en 8 oktober werd het aantal besmettelijken ook gebaseerd op het aantal meldingen omdat de ziekenhuisopnames erg laag waren; deze stap wordt nu achterwege gelaten.



Figuur 27: Het geschatte aantal besmettelijke personen voor Nederland. De figuur geeft het aantal besmettelijke personen op basis van het aantal ziekenhuisopnames gerapporteerd door stichting NICE, met de meest aannemelijke waarde (lijn) en het 95% betrouwbaarheidsinterval. Door de tijdsduur tussen eerste ziektedag en rapportagevertraging, kunnen we betrouwbare schattingen maken van het aantal besmettelijken langer dan 7 dagen geleden. Voor schattingen in de afgelopen 7 dagen is de betrouwbaarheid niet groot, en voor deze periode wordt de meest aannemelijke waarde weggelaten.

10.2 Het reproductiegetal R gebaseerd op gegevens t/m 5 april 2021

Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door een persoon met SARS-CoV-2. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde SARS-CoV-2 gevallen per dag in Nederland. Omdat een SARS-CoV-2 geval met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we het aantal gevallen voor deze vertraging¹. Voor een groot deel van de gemelde gevallen is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de overige gevallen te schatten. Door het aantal SARS-CoV-2 gevallen per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een SARS-CoV-2 geval en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007². Tot 12 juni werd het reproductiegetal berekend op basis van COVID-19 ziekenhuisopnames.



Figuur 28: Het effectieve reproductiegetal R voor Nederland.

 $^{^1}$ van de Kassteele J, Eilers PHC, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. Epidemiology. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.00000000000001050.


 $^{^2}$ Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. Proc Biol Sci. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3754.

Figuur 28 geeft in blauw het aantal SARS-CoV-2 gevallen in Nederland naar meldingsdatum, zoals gemeld aan de GGD'en. In grijs is het verwachte extra aantal gevallen weergegeven, op basis van correctie voor rapportagevertraging. Het aantal gevallen per datum van eerste ziektedag is weergegeven in groen. Bij gevallen waar de eerste ziektedag niet bekend is, is deze geschat. Op basis van deze eerste ziektedag wordt het reproductiegetal berekend. De meest aannemelijke waarde van het reproductiegetal is weergegeven als paarse lijn in de onderste figuur. Wanneer de groene lijn in de bovenste figuur een stijgende trend heeft is het reproductiegetal groter dan 1, wanneer de groene lijn een dalende trend heeft is het reproductiegetal kleiner dan 1. De onzekerheidsmarge van een reproductiegetal is groter als er weinig gevallen zijn (paars, het 95% betrouwbaarheidsinterval). Bij lage aantallen gevallen wordt de onzekerheid van het reproductiegetal groter en kan deze meer schommelen. Als de schatting boven de waarde 1 komt, moet eerst naar de bandbreedte worden gekeken voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De rapportagevertragingen en de tijdsduur tussen opeenvolgende infecties betekenen in Nederland dat we betrouwbare schattingen kunnen maken van de waarde van het reproductiegetal R langer dan 14 dagen geleden. Schattingen van het reproductiegetal R recenter dan 14 dagen geleden kunnen een indicator zijn voor de uiteindelijke waarde, maar zijn niet betrouwbaar als voorspeller. De betrouwbaarheid van de schatting wordt kleiner voor recentere dagen, omdat de meldingen voor recente dagen nog niet volledig gerapporteerd zijn en de aantallen meldingen voor toekomstige dagen nog niet bekend kunnen zijn. Daarom wordt over de meest recente 14 dagen geen puntschatting van R gegeven, maar wel de bovenen ondergrens. Op 22 maart was het reproductiegetal R gemiddeld 1.01 (0.99 – 1.03, 95\% betrouwbaarheidsinterval).

11 SARS-CoV-2 gegevens uit overige bronnen

11.1 SARS-CoV-2 laboratoriumtests op basis van de virologische weekstaten

Om zicht te houden op het aantal geteste personen en het aantal positief geteste personen op het SARS-CoV-2 virus in Nederland, is alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS-CoV-2 uitvoeren gevraagd om deze data wekelijks te melden. De laboratoria rapporteren op maandag voor 12 uur over de voorgaande kalenderweek. Sinds september 2020 is er sprake van een onderrapportage van het aantal labuitslagen, doordat (nog) niet alle laboratoria (kunnen) melden in de virologische dagstaten en er achterstanden zijn bij het melden van laboratoriumuitslagen.



Figuur 29: Percentage van personen die getest zijn op SARS-CoV-2 waarbij de testuitslag positief was, per kalenderweek, gemeld door de virologische laboratoria.

Tabel 17: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste personen in Nederland, gemeld door laboratoria, per kalenderweek. De gegevens vanaf 30 november 2020 zijn weergegeven per week. De gegevens van de periode daarvoor, vanaf 9 maart 2020, zijn samengevoegd.

| Datum van - tot | Aantal labs | Aantal geteste personen | Aantal personen met positieve uitslag | % positief |
|-------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 00.02.0000 20.11.0000 | | | | 7.0 |
| 09-03-2020 - 30-11-2020 | 58 | 4239214 | 334717 | 7.9 |
| 30-11-2020 - 06-12-2020 | 55 | 189333 | 20478 | 10.8 |
| 07-12-2020 - 13-12-2020 | 54 | 249620 | 29583 | 11.9 |
| 14-12-2020 - 20-12-2020 | 54 | 270343 | 35682 | 13.2 |
| 21-12-2020 - 27-12-2020 | 56 | 234755 | 31037 | 13.2 |
| 28-12-2020 - 03-01-2021 | 56 | 206423 | 27585 | 13.4 |
| 04-01-2021 - 10-01-2021 | 57 | 207125 | 25078 | 12.1 |
| 11-01-2021 - 17-01-2021 | 57 | 187934 | 21197 | 11.3 |
| 18-01-2021 - 24-01-2021 | 57 | 176080 | 19229 | 10.9 |
| 25-01-2021 - 31-01-2021 | 57 | 153708 | 16488 | 10.7 |
| 01-02-2021 - 07-02-2021 | 58 | 151128 | 15644 | 10.4 |
| 08-02-2021 - 14-02-2021 | 58 | 142429 | 14672 | 10.3 |
| 15-02-2021 - 21-02-2021 | 58 | 188263 | 17629 | 9.4 |
| 22-02-2021 - 28-02-2021 | 58 | 202696 | 17142 | 8.5 |
| 01-03-2021 - 07-03-2021 | 57 | 218683 | 16157 | 7.4 |
| 08-03-2021 - 14-03-2021 | 56 | 259449 | 19330 | 7.5 |
| 15-03-2021 - 21-03-2021 | 57 | 288631 | 21518 | 7.5 |
| 22-03-2021 - 28-03-2021 | 55 | 271208 | 21718 | 8.0 |
| 29-03-2021 - 04-04-2021 | 36 | 154268 | 13165 | 8.5 |

Tabel 18: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste personen in Nederland, gemeld door virologische laboratoria, uitgesplitst naar aanvrager¹. De gegevens van de laatste vier kalenderweken (van 8 maart t/m 4 april) zijn weergegeven per week. De gegevens van de periode daarvoor, vanaf 15 juni 2021, zijn samengevoegd.

| Aanvrager | Datum van - tot | Aantal labs | Aantal geteste personen | Aantal personen met positieve uitslag | Percentage positief |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------|
| Ziekenhuis | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 490955 | 38728 | 7.9 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 18429 | 1036 | 5.6 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 19847 | 1039 | 5.2 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 17608 | 1090 | 6.2 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 8730 | 676 | 7.7 |
| Verpleeghuis | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 204594 | 26464 | 12.9 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 3565 | 225 | 6.3 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 3878 | 217 | 5.6 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 2836 | 118 | 4.2 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 1477 | 55 | 3.7 |
| GGD | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 2841057 | 273461 | 9.6 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 104659 | 7971 | 7.6 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 118713 | 9415 | 7.9 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 111684 | 9958 | 8.9 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 51784 | 4940 | 9.5 |
| Overig | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 489838 | 32885 | 6.7 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 14893 | 732 | 4.9 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 19438 | 744 | 3.8 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 18664 | 773 | 4.1 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 3664 | 204 | 5.6 |

¹ In bovenstaande cijfers zijn alleen gegevens meegenomen van laboratoria die deze hebben uitgesplitst naar aanvrager, dit betreft een deel van de laboratoria.


Tabel 19: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste ziekenhuismedewerkers en -personen in Nederland, gemeld door virologische laboratoria¹. De gegevens van de laatste vier kalenderweken (van 8 maart t/m 4 april) zijn weergegeven per week. De gegevens van de periode daarvoor, vanaf 15 juni, zijn samengevoegd.

| Aanvrager | Datum van - tot | Aantal labs | Aantal geteste personen | Aantal personen met positieve uitslag | Percentage positief |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|---|---------------------|
| Medewerkers | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 223007 | 17051 | 7.6 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 8301 | 344 | 4.1 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 8137 | 338 | 4.2 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 7774 | 340 | 4.4 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 4122 | 252 | 6.1 |
| Patiënten | 15-06-2020 - 07-03-2021 | 43 | 236503 | 19354 | 8.2 |
| | 08-03-2021 - 14-03-2021 | 36 | 9781 | 667 | 6.8 |
| | 15-03-2021 - 21-03-2021 | 37 | 10121 | 638 | 6.3 |
| | 22-03-2021 - 28-03-2021 | 36 | 8869 | 719 | 8.1 |
| | 29-03-2021 - 04-04-2021 | 23 | 4608 | 424 | 9.2 |

¹ In bovenstaande cijfers zijn alleen gegevens meegenomen van laboratoria die deze hebben uitgesplitst naar doelgroep, dit betreft een deel van de laboratoria.

11.2 Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties.


Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties, worden monsters afgenomen voor de landelijke respiratoire surveillance. Dit wordt gedaan door ongeveer 40 huisartsenpraktijken die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De aantallen mensen met SARS-CoV-2 in de steekproef van de Peilstations kunnen niet vergeleken worden met de resultaten van de GGD'en. Momenteel worden de meeste mensen met griepachtige klachten getest door de GGD'en. De resultaten van de Peilstations zijn gebaseerd op mensen die op consult komen bij de huisarts.



Figuur 30: Aantal patiënten met griepachtige klachten of een acute respiratoire infectie dat positief getest is op influenzavirus, RSV, rhinovirus, enterovirus of SARS-CoV-2 of dat negatief getest is op deze virussen, per kalenderweek. Gegevens van de afgelopen week (rechts van de stippellijn) zijn incompleet omdat nog niet alle testresultaten bekend zijn.

Aanwezigheid van andere virussen in de groep negatief geteste personen is niet uit te sluiten, omdat er slechts op een beperkt aantal virussen getest wordt. Dubbelinfecties kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen het aantal positieve testen hoger zijn dan het aantal positieve monsters¹.

[{]¹ Omdat de influenza-laboratorium uitslagen op woensdag definitief gemaakt worden, worden de influenza-positieve uitslagen van de monsters die voorgaande week zijn afgenomen op woensdag gerapporteerd op de} RIVM griep website.




Figuur 31: Percentage patiënten met griepachtige klachten of een acute respiratoire infectie dat positief getest is op influenzavirus¹, RSV, rhinovirus, enterovirus of SARS-CoV-2. De stippen geven het aantal per week aan; de lijn een 5-weeks lopend gemiddelde.

[{]¹ Omdat de influenza-laboratorium uitslagen op woensdag definitief gemaakt worden, worden de influenza-positieve uitslagen van de monsters die voorgaande week zijn afgenomen op woensdag gerapporteerd op de} RIVM griep website.

11.3 Infectieradar: Monitoring van klachten passend bij SARS-CoV-2


Infectierader is een onderzoek van het RIVM met als doel om in kaart te brengen hoeveel mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met SARS-CoV-2 (koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reuk of verlies van smaak). Iedereen in Nederland kan aan dit onderzoek meedoen door het invullen van een wekelijkse online vragenlijst. Omdat niet iedereen met klachten zich (direct) laat testen, kan het bijhouden van klachten extra inzicht geven in de verspreiding van SARS-CoV-2. Meer informatie over Infectieradar is te vinden op de website (https://www.infectieradar.nl).



Figuur 32: Percentage van het totaal aantal deelnemers dat klachten heeft gemeld in de afgelopen week, die passen bij COVID-19 of bij een infectie met SARS-CoV-2. De lijn geeft het 5-daags gemiddelde weer, de stippen geven de percentages per dag weer.

11.4 Totale sterfte in Nederland t/m 24 maart 2021

Sinds de grieppandemie van 2009 gebruikt het RIVM gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om het totaal aantal overleden mensen wekelijks te bewaken. Hierdoor wordt de impact van koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën op sterfte in beeld gebracht. Niet bij alle mensen die overlijden aan SARS-CoV-2 is een laboratoriumtest gedaan, waardoor ze niet in de SARS-CoV-2 meldingsgegevens worden opgenomen. De totale sterfte in 2020 die in beeld gebracht wordt door deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door SARS-CoV-2. Deze grafiek geeft de totale sterfte weer t/m 24 maart.




Figuur 33: Totale sterfte per week in Nederland t/m 24 maart 2021. De waargenomen sterfte wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. In de week van 18 maart 2021 tot en met 24 maart 2021 waren in totaal 2986 sterfgevallen gemeld. Gewoonlijk wordt in deze tijd van het jaar tussen de 2776 en 3102 sterfgevallen verwacht (het gele lint). Binnen 2 weken zijn circa 97% van alle sterfgevallen bekend bij het CBS.

Voor gedetailleerde informatie zie: RIVM - Monitoring Sterftecijfers en CBS. De sterftecijfers op de pagina van het RIVM worden iedere donderdag met nieuwe data geüpdatet. Zie EuroMOMO voor een Europees overzicht.


12 SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari 2020

12.1 SARS-CoV-2 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020




Figuur 34: Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 27 februari 2020. (A) Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, naar meldingsdatum. (B) Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden. Van enkele overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is de datum van overlijden (nog) niet gemeld.


Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni 2020 kan iedereen zich met klachten laten testen. Vanaf 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.




Figuur 35: Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, per leeftijdsgroep (in jaren).




Figuur 36: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per leeftijdsgroep (in jaren). Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.




Figuur 37: Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 1).




Figuur 38: Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 2).




Figuur 39: Aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 3).



Figuur 40: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 1). Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.




Figuur 41: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 2). Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.



Figuur 42: Aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2, per veiligheidsregio (deel 3). Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd en weergegeven in lichtere kleuren.


12.2 COVID-19 ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care gerapporteerd door de Stichting NICE vanaf 27 februari 2020

De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal COVID-19 patiënten dat opgenomen is in het ziekenhuis. Van deze in het ziekenhuis opgenomen patiënten wordt ook gerapporteerd welk aantal opgenomen is op de intensive care. Gegevens rechts van de stippellijn worden momenteel nog aangevuld door ziekenhuizen.



Figuur 43: Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag in Nederlandse¹ ziekenhuizen.

{¹ Inclusief opnames op de intensive care.}



Figuur 44: Aantal nieuwe COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse¹ intensive care afdelingen.

Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie – NICE. Gegevens bijgewerkt op 6 april, 15:20 uur. Voor uitgebreider en nog actuelere informatie zie Stichting NICE.

12.3 Regionale overzichten van SARS-CoV-2 meldingen vanaf 27 februari 2020

12.3.1 Aantallen SARS-CoV-2 meldingen per veiligheidsregio vanaf 27 februari 2020

Tabel 20: Aantal personen positief voor SARS-CoV-2 aan de GGD'en gemeld en overleden per veiligheidsregio, totaal aantal personen positief voor SARS-CoV-2 en aantal personen positief voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners^{1,2}.


| Veiligheidsregio ³ | Totaal gemeld | /100.000 | Overleden | /100.000 |
|-------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|
| Totaal gemeld | 1312661 | 7540.7 | 16646 | 95.6 |
| Groningen | 30260 | 5165.0 | 225 | 38.4 |
| Fryslân | 34152 | 5254.5 | 451 | 69.4 |
| Drenthe | 27586 | 5587.8 | 327 | 66.2 |
| IJsselland | 33595 | 6322.7 | 415 | 78.1 |
| Twente | 53981 | 8554.0 | 662 | 104.9 |
| Noord- en Oost-Gelderland | 53271 | 6435.8 | 715 | 86.4 |
| Gelderland-Midden | 48944 | 7025.9 | 550 | 79.0 |
| Gelderland-Zuid | 43539 | 7752.7 | 642 | 114.3 |
| Utrecht | 102416 | 7559.3 | 1205 | 88.9 |
| Noord-Holland-Noord | 54189 | 8176.4 | 460 | 69.4 |
| Zaanstreek-Waterland | 28938 | 8531.7 | 328 | 96.7 |
| Kennemerland | 39587 | 7198.3 | 533 | 96.9 |
| Amsterdam-Amstelland | 86936 | 8120.5 | 889 | 83.0 |
| Gooi en Vechtstreek | 17862 | 6948.2 | 229 | 89.1 |
| Haaglanden | 85933 | 7693.0 | 994 | 89.0 |
| Hollands-Midden | 65102 | 8048.6 | 719 | 88.9 |
| Rotterdam-Rijnmond | 119146 | 9002.8 | 1784 | 134.8 |
| Zuid-Holland-Zuid | 42257 | 9198.9 | 536 | 116.7 |
| Zeeland | 21754 | 5672.7 | 223 | 58.2 |
| Midden- en West-Brabant | 86897 | 7714.4 | 1095 | 97.2 |
| Brabant-Noord | 54694 | 8338.5 | 972 | 148.2 |
| Brabant-Zuidoost | 65543 | 8396.4 | 939 | 120.3 |
| Limburg-Noord | 47547 | 9143.4 | 664 | 127.7 |
| Limburg-Zuid | 38593 | 6462.5 | 863 | 144.5 |
| Flevoland | 29939 | 7077.4 | 226 | 53.4 |

¹ Betreft het aantal personen positief voor SARS-CoV-2 met een datum van melding aan de GGD of datum van overlijden in de periode van 27 februari 2020 t/m 6 april 10:00 uur.

² Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is


 $^{^3}$ Van alle meldingen die aan het RIVM gedaan zijn, zijn van 346 mensen de veiligheidsregio niet bekend.

12.3.2 Kaarten met SARS-CoV-2 meldingen per gemeente vanaf 27 februari 2020



Figuur 45: Totaal aantal aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente t/m 6 april 10:00 uur. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer. De lichtgrijze lijnen geven de gemeentegrenzen weer.

Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 46: Totaal aantal aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 per 100.000 inwoners per gemeente t/m 6 april 10:00 uur. Overlijden aan COVID-19 is niet meldingsplichtig en is daarom ondergerapporteerd. De donkergrijze lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer. De lichtgrijze lijnen geven de gemeentegrenzen weer.

Iedere dinsdag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.

12.4 Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van personen positief voor SARS-CoV-2

Tabel 21: Leeftijdsverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 en van overleden personen positief voor SARS-CoV-2¹.

| Leeftijdsgroep | Totaal gemeld | % | Overleden | % |
|----------------|---------------|-----|-----------|------|
| Totaal gemeld | 1313007 | | 16649 | |
| 0-4 | 8152 | 0.6 | 1 | 0.0 |
| 5-9 | 26844 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 10-14 | 60515 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| 15-19 | 107245 | 8.2 | 2 | 0.0 |
| 20-24 | 122500 | 9.3 | 2 | 0.0 |
| 25-29 | 105820 | 8.1 | 6 | 0.0 |
| 30-34 | 95770 | 7.3 | 10 | 0.1 |
| 35-39 | 88781 | 6.8 | 19 | 0.1 |
| 40-44 | 90220 | 6.9 | 23 | 0.1 |
| 45-49 | 104368 | 7.9 | 60 | 0.4 |
| 50-54 | 117691 | 9.0 | 124 | 0.7 |
| 55-59 | 106192 | 8.1 | 216 | 1.3 |
| 60-64 | 80000 | 6.1 | 399 | 2.4 |
| 65-69 | 51857 | 3.9 | 785 | 4.7 |
| 70-74 | 44877 | 3.4 | 1566 | 9.4 |
| 75-79 | 33369 | 2.5 | 2539 | 15.3 |
| 80-84 | 28372 | 2.2 | 3487 | 20.9 |
| 85-89 | 23110 | 1.8 | 3879 | 23.3 |
| 90-94 | 13002 | 1.0 | 2577 | 15.5 |
| 95+ | 4269 | 0.3 | 954 | 5.7 |
| Niet vermeld | 53 | 0.0 | 0 | 0.0 |

¹ Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 22: Man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 en van overleden personen positief voor SARS-CoV-2¹.


| Geslacht | Totaal gemeld ² | % | Overleden ³ | % |
|---------------|----------------------------|------|------------------------|------|
| Totaal gemeld | 1313007 | | 16649 | |
| Man | 618591 | 47.1 | 9038 | 54.3 |
| Vrouw | 694325 | 52.9 | 7611 | 45.7 |

Sinds 1 december 2020 kunnen naast mensen met klachten ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Toch is het aannemelijk dat niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen daadwerkelijk getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

² Van 91 personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 is het geslacht niet vermeld.

 $^{^3\,}$ Van 0 overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is het geslacht niet vermeld.

Niet vermeld



Figuur 47: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 vanaf 27 februari 2020. (A) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde personen positief voor SARS-CoV-2. (B) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD'en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2. Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage en zijn in figuur B weergegeven in lichtere kleuren.

12.5 Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap bij overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar vanaf 27 februari 2020

Tabel 23: Aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar met onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap¹.

| | Overleden | % |
|---|-----------|------|
| Totaal gemeld | 1647 | |
| Onderliggende aandoening en/of zwangerschap | 1050 | 63.8 |
| Geen onderliggende aandoening | 170 | 10.3 |
| Niet vermeld | 427 | 25.9 |

¹ Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance omdat er geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19 geldt. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs.

Tabel 24: Gerapporteerde onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap van overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar^{1,2}.

| | Overleden | % |
|--|-----------|------|
| Zwangerschap | 0 | 0.0 |
| Postpartum | 0 | 0.0 |
| Cardio-vasculaire aandoeningen en hypertensie | 431 | 41.0 |
| Diabetes | 281 | 26.8 |
| Leveraandoening | 39 | 3.7 |
| Chronische neurologische of neuromusculaire aandoeningen | 148 | 14.1 |
| Immuundeficiëntie | 31 | 3.0 |
| Nieraandoening | 108 | 10.3 |
| Chronische longaandoeningen | 263 | 25.0 |
| Maligniteit | 177 | 16.9 |
| $Obesitas^3$ | 79 | 7.5 |
| Dementie/Alzheimer ³ | 76 | 7.2 |
| Parkinson ³ | 14 | 1.3 |
| Overig | 244 | 23.2 |


¹ Het werkelijke aantal overleden personen positief voor SARS-CoV-2 jonger dan 70 jaar is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance omdat er geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19 geldt. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in grijs.

² Per patiënt kunnen meerdere onderliggende aandoeningen gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 24 worden berekend vanuit het aantal overleden patiënten jonger dan 70 jaar voor wie tenminste één onderliggende aandoening is vermeld (Tabel 23).

 $^{^3}$ Vanaf 11 april zijn deze onderliggende aandoeningen gestructureerd nagevraagd.


12.6 Surveillance van SARS-CoV-2 in verpleeghuizen en woonzorgcentra

Vanaf 1 juli 2020 vraagt de GGD voor alle personen positief voor SARS-CoV-2 structureel na of zij bewoner zijn van een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen en niet werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Indien onbekend is of een persoon in een verpleeghuis of woonzorgcentrum woont, maar de postcode (bijv. 1234AB) komt wel overeen met de vestiging van een woonzorgcentrum of verpleeghuis en de persoon is 70 jaar of ouder, wordt de persoon toch ingedeeld als bewoner van een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Voor 1 juli 2020 werd dit afgeleid uit een combinatie van woonlocatie en leeftijd (ouder dan 70) of doordat de GGD aangaf dat de besmetting in een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen had plaats gevonden. Grafieken over de gehandicaptenzorg ontbreken hier, omdat in de eerste periode van de pandemie deze data nog niet verzameld zijn.



Figuur 48: Aantal verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD vanaf 27 februari 2020¹. (A) Aantal gemelde verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners, naar datum van overlijden.

 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}




Figuur 49: Aantal nieuwe verpleeghuislocaties met SARS-CoV-2 vanaf 27 februari 2020¹. Aantal nieuwe verpleeghuislocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een verpleeghuis wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen positief voor SARS-CoV-2 zijn gemeld.

 $^{\{}$ ¹ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. $\}$


12.7 Surveillance van SARS-CoV-2 in gehandicaptenzorginstellingen

Vanaf 1 juli wordt structureel nagevraagd of een persoon in een gehandicaptenzorginstelling woont.



Figuur 50: Aantal bewoners van gehandicaptenzorginstellingen met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD vanaf 1 juli 2020¹. (A) Aantal gemelde bewoners van gehandicaptenzorginstellingen, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden bewoners van gehandicaptenzorginstellingen, naar datum van overlijden.


 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}



Figuur 51: Aantal nieuwe gehandicaptenzorginstellingenlocaties met SARS-CoV-2 vanaf 27 februari 2020¹. Aantal nieuwe gehandicaptenzorginstellingenlocaties waar sprake is van tenminste één SARS-CoV-2 besmetting op basis van een positieve test. Een gehandicaptenzorginstelling wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test geen nieuwe personen positief voor SARS-CoV-2 zijn gemeld.

 $^{^{1}}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel.

12.8 Surveillance van SARS-CoV-2 bij zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder



Figuur 52: Aantal zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met SARS-CoV-2 gemeld aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020¹. (A) Aantal gemelde zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar GGD meldingsdatum. (B) Aantal overleden zelfstandig wonende personen van 70 jaar en ouder met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2, naar datum van overlijden.


 $^{\{^1}$ Meldingen aan het RIVM t/m 30 maart 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 30 maart 10:01 uur t/m 6 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Er geldt geen meldingsplicht voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage, en zijn weergegeven in lichtere kleuren.}

12.9 Surveillance van SARS-CoV-2 onder zorgmedewerkers

Tot en met 6 april 10.00 uur zijn 153653 zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. Het is niet bekend en ook niet te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Van hen zijn 936 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis, dit is 0.6% van het totaal aantal positief op SARS-CoV-2 geteste zorgmedewerkers. Van 30 zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden. Zij hadden een leeftijd tussen de 40 en 69 jaar.

De leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van zorgmedewerkers zijn anders dan die van de overige personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld jonger en vaker vrouw, vergeleken met alle gemelde positief geteste personen, zoals te zien in Figuur 48.

Tot 1 juni 2020 was het testbeleid voornamelijk gericht op mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte of personen opgenomen in het ziekenhuis. Ook werden tot 1 juni zorgmedewerkers laagdrempelig getest bij (milde) klachten, daarom vormden zorgmedewerkers een relatief groot deel van het totaal aantal gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2. Sinds 1 december 2020 kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen als zij risico hebben gelopen op een besmetting. Van alle 1011304 meldingen van bevestigde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 tussen de 18 en 69 jaar is 15.2% (153653) zorgmedewerker. Van alle met COVID-19 gemelde in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijd 18 t/m 69 jaar (13123) is 7.1% zorgmedewerker. Van alle 1645 gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.8% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo'n 11% als zorgmedewerker (Bron: CBS statline).




Figuur 53: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 met een leeftijd van 18-69 jaar die werkzaam zijn als zorgmedewerker.

12.10 Surveillance van SARS-CoV-2 onder onderwijsen kinderopvangmedewerkers

Tot en met 6 april 2021 10.00 uur zijn 60618 onderwijs- en kinderopvangmedewerkers in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 gemeld. Dit betreft medewerkers werkzaam in de kinderopvang, basisschool personeel en medewerkers werkzaam in het voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs. Het is niet bekend en ook niet te achterhalen of de onderwijs- en kinderopvangmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Van hen zijn 304 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis, dit is 0.5% van het totaal aantal positief op SARS-CoV-2 geteste onderwijs- en kinderopvangmedewerkers. Van 9 onderwijs- en/of kinderopvangmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden. Zij hadden een leeftijd tussen de 50 en 69 jaar.

Van alle 1011304 meldingen van bevestigde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 tussen de 18 en 69 jaar is 6% (60618) onderwijs- of kinderopvangmedewerker. Van alle met COVID-19 gemelde als in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijd 18 t/m 69 jaar (13123) is 2.3% onderwijs- of kinderopvangmedewerker. Van alle 1645 gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2 in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 0.5% een onderwijs- of kinderopvangmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo'n 3.4% als onderwijs- of kinderopvangmedewerker (Bron: CBS statline).



Figuur 54: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde personen positief voor SARS-CoV-2 met een leeftijd van 18-69 jaar die werkzaam zijn als onderwijs- of kinderopvangmedewerker.