

CS477 Combinatorics: Homework 3

于峥 518030910437

2020 年 3 月 24 日

Problem 1. 对任意的 n , 定义 $D_k = \binom{n}{k+1} - \binom{n}{k}$ 。求 k^* 使得 D_{k^*} 在所有的 D_k 中取值最大。

Solution.

$$\begin{aligned} r(k) = \frac{D_k}{D_{k-1}} &= \frac{\binom{n}{k+1} - \binom{n}{k}}{\binom{n}{k} - \binom{n}{k-1}} \\ &= \frac{\frac{n-2k-1}{k+1} \binom{n}{k}}{\frac{n-2k+1}{k} \binom{n}{k-1}} \\ &= \frac{(n-2k-1)(n-k+1)}{(n-2k+1)(k+1)} \end{aligned}$$

为了 $D_k > 0$, 我们只关心 $0 < k \leq \frac{n}{2}$ 的情况。

在这个范围内, $\frac{n-2k-1}{n-2k+1}$ 和 $\frac{n-k+1}{k+1}$ 都是递减的所以在 k 在此范围内比值是递减的。

因此比值为 1 的时候, D_k 最大, $k = \frac{1}{2}(n - \sqrt{n+2})$, 因此特别的当 $n = 1$ 时, $k^* = 0$ 。

当 $n+2$ 是完全平方数的时候, $k^* = \frac{n-\sqrt{n+2}}{2}, \frac{n-\sqrt{n+2}}{2} - 1$ 否则

$$k^* = \left\lfloor \frac{n - \sqrt{n+2}}{2} \right\rfloor$$

时取到最大值。

□

Problem 2. 集合 $A_0 = \{0\}$, $A_1 = \{1\}$, $A_{n+2} = (A_1 + A_{n+1})\Delta A_n$ 。证明有无穷多个 n 使得 $|A_n| = 1$ 。

Solution. 我们可以证明当 n 为 $2^k - 1$ 的形式的时候, $|A_n| = 1$ 。

从另一个角度进行观察, 我们将集合看成多项式, 将集合操作转化成多项式操作, 让 $B_0(x) = 1, B_1(x) = x, B_{n+2}(x) = xB_{n+1}(x) + B_n(x)$ 。其中 $B_i(x)$ 是定义在 $GF(2)$ 上的多项式。

可以归纳证明 $B_i(x) = \sum_{u \in A_i} x^u$, 首先 $n = 0, 1$ 时容易验证满足, 并且若小于等于 $n + 1$ 时满足, $A_1 + A_{n+1}$ 相当于将 A_{n+1} 中所有元素加一, 而 $xB_n(x)$ 就是将每一项的幂次加一。而集合的对称差操作, 多项式相加后由于是定义在 $GF(2)$ 上, 共有的项会被消去。因此 $n + 2$ 时满足。

进而由于 A_n 必然包含 n , 所以当 $|A_n| = 1$ 时, $B_n(x) = x^n$, 进而证明 $B_i(x)$ 有如下性质, 令 $C_i(x) = B_{i-1}(x)$

$$\begin{aligned} C_{2n}(x) &= xC_n(x)^2 \\ C_{2n+1}(x) &= (C_n(x) + C_{n+1}(x))^2 \end{aligned}$$

同样进行归纳证明法, $n = 1, 2, 3, 4$ 可以验证是满足的, 若 $1 \sim 2n$ 都满足, 那么

$$\begin{aligned} C_{2n+1}(x) &= xC_{2n}(x) + C_{2n-1}(x) \\ &= x^2C_n(x) + (C_{n-1}(x) + C_n(x))^2 \\ &= C_n(x)^2 + (x^2C_n(x) + C_{n-1}(x))^2 \\ &= C_n(x)^2 + C_{n+1}(x)^2 \\ &= (C_n(x) + C_{n+1}(x))^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{2n+2}(x) &= xC_{2n+1}(x) + C_{2n}(x) \\ &= x(C_n(x) + C_{n+1}(x))^2 + xC_n(x)^2 \\ &= xC_{n+1}(x)^2 \end{aligned}$$

因此 $2n + 1, 2n + 2$ 也满足这一性质。不难发现 $C_{2n}(x)$ 的项数永远和 $C_n(x)$ 相同, 而 $C_1(x)$ 只有一项, 所以 $C_{2^k}(x)$ 项数为一, 进而 $B_{2^k-1}(x)$ 项数为 1, 所以当 n 为 $2^k - 1$ 的形式的时候, $|A_n| = 1$ 。

□

Problem 3. 给定正整数 n, r, s , 有多少个 $[2n]$ 的子集恰好包含 r 个奇数和 s 个偶数, 且没有任何两个相邻的元素?

Solution.

Lemma 1. 将 r 个元素放到 n 个位置中, 每个位置可以放任意个, 方案数为:

$$\binom{n+r-1}{n-1}$$

pf. 假设将元素放置好后, 在每个位置再额外放一个元素。这就相当于将 $n+r$ 个元素放到 n 个位置中, 每个位置至少放一个的方案。我们可以考虑将这些元素排成一列, 在其中插入 $n-1$ 个板, 分成 n 份的方案为 $\binom{n+r-1}{n-1}$ 。

我们可以这样构造集合, 首先可以将问题看成将 r 个 10, s 个 01, $n-r-s$ 个 00 拼成长度为 $2n$ 的 01 串。我们首先只考虑 10 和 00, 有 $\binom{n-r}{r}$ 种方法, 将他们拼起来。然后将 01 插入到其中, 由于每个 10 的前面不能放 01, 这相当于有 s 个元素, 放到 $n-s-r+1$ 个位置中, 每个位置可以放任意个, 根据 **Lemma 1**, 这有 $\binom{n-r}{n-s-r}$ 种方法。得到答案:

$$\binom{n-r}{s} \binom{n-s}{r}$$

□

Problem 4. 证明: 平面上存在 $13^3 = 2197$ 个不同的点, 使得它们之间至少有 12345 对的距离为 13。

Solution. 这个问题可以转化成考虑找到一个平面上 n 个点, m 条边的图, 使得每条边的长度都相同。本题要求 $n \leq 2197$, $m \geq 12345$ 。

我们可以考虑 Hypercube graph 是可能满足要求的, 因为 Hypercube graph 有 2^n 个点, $2^{n-1}n$ 条边, 边的密度比较高。并且在平面上画出 Hypercube graph, 并且让每条边的长度相同是容易 (我们让边的长度是单位长度)。因

为首先 Q_1 容易画出, 而要画出 Q_n 只需将 Q_{n-1} 平移单位距离再将对应的点连上即可。

然而 Hypercube 依然难以满足要求, 我们可以对 Hypercube 进行一些修改。令 G_1 为一个边长为单位长度的等边三角形, G_{n+1} 由 G_n 通过以下步骤构造出来:

- a) 将 G_n 向两个方向移动单位距离, 并且两个方向的夹角为 60 度。
- b) 把生成的三个图的对应点连起来, 可以发现对应点构成一个等边三角形。还需要说明的细节是, 一定存在这样的方向让平移后的点与之前的不重合。这是因为方向的选择有无限种, 然而平面上的点是有限的。

因此 G_n 的所有边长度相同, 而 G_n 的点数 $V_n = 3^n$, 边数满足 $E_n = 3E_{n-1} + V_n = n3^n$ 。注意到边和点的比值为 n , 比 Hypercube 更强。算出当 $n = 7$ 时, 有 2187 个点, 15309 条边, 满足题目要求。

这种构造的本质就是将等边三角形的图作笛卡尔积, 事实上我们也可以通过不同的图形作笛卡尔积来达到同样的目的。

关于 "The maximum number of occurrences of the same distance among n points in the plane" 似乎是个未解问题, 我查到的上界是 $cn^{4/3}$ 。用这题笛卡尔积的思路能做到的最好情况应该都是 kn 的。其中 k 是初始图形的点和边的比例。

□

Problem 5. 如果人和人之间的朋友关系是相互的。证明: 在任意 100 个人中, 有两个人使得他们的共同的朋友有偶数个。

Solution. 我们证明任意偶数个人中存在两个人的公共朋友数为偶数。

1) 若存在一个人 P 有奇数个朋友 Q_1, Q_2, \dots, Q_n , 设 PQ_i 为 P 与 Q_i 的公共朋友数。如 Q_i 之间没有朋友关系, 那么所有 PQ_i 为 0 是偶数。

Q_i 之间每增加一对朋友关系, 那么 $PQ_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 就有两个数的奇偶性改变。然而想要让 PQ_i 全部为奇数必须只能进行奇数次奇偶性改变。因此最后必然存在一个 Q_i 与 P 的公共朋友为偶数。

2) 若所有人的朋友都是偶数个, 假设 P 的朋友集合为 A , 其他人的集合为 B , 则 $|A|$ 是偶数, $|B|$ 是奇数。

$\forall Q \in B$, 如果 Q 在 A 中有偶数个朋友, 那么 PQ 有偶数个公共朋友。

否则 Q 在 A 中有奇数个朋友, 那么 Q 在 B 中也有奇数个朋友, 由于 Q 是

任选的, 那么把 B 看成一个奇数个点的子图, 每个点的度数都是奇数, 那么度数和也是奇数, 然而无向图的度数和必然为偶数, 产生矛盾。 \square

Problem 6. (*) 在一个 $n \times n$ 的方格表的每个格子里填上一个正整数, 使得每个数可以整除它上面的数 (如果有的话), 也可以整除它右边的数 (如果有的话), 并且整个表右上角格子里填的数是 T 。当 $T = 2$ 、 $T = 4$ 、 $T = 30$ 、 $T = 1000$ 时, 这样的填法各有多少种?

Solution. 我们可以这样考虑, 设 $f_n(T)$ 为该问题答案。将 T 进行质因数分解, 例如 $T = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$ 。可以发现不同质因子之间没有影响, 即 $f_n(T) = f_n(p_1^{k_1}) f_n(p_2^{k_2}) \dots f_n(p_n^{k_n})$ 。

进而我们只需要考虑 p^k 形式的 T , 由于当 k 相同时得到的答案相同, 所以我们将问题转化成在方格中填 0 到 k 让每行每列都递减, 为了去掉右上角必须填 k 的限制, 记 $h_n(k) = f_n(p^k)$, 可以考虑计算 $g_n(k) = \sum_{i=0}^k h_n(i)$, 即计算前缀和。

对于这 k 条路径, 我们考虑将第 i 条向上和向右都平移 $i-1$ 格, 那么这 k 条路径将严格不相交。题目转化成了从 $(0, 0), (-1, 1) \dots (1-k, k-1)$ 走到 $(n, n), (n-1, n+1), (n-2, n+2) \dots (n-k+1, n+k-1)$ 有多少种走法让路径不相交。使用 LGV 引理。

Lemma 2. 对于有向无环图, $e(u, v)$ 表示从 u 走到 v 所有路径的边权和。

$\omega(P)$ 表示 P 这条路径上所有边的边权之积。

起点集合 A , 是有向无环图点集的一个子集, 大小为 n 。

终点集合 B , 也是有向无环图点集的一个子集, 大小也为 n 。

一组 $A \rightarrow B$ 的不相交路径 S : S_i 是一条从 A_i 到 $B_{\sigma(S)_i}$ 的路径 ($\sigma(S)$ 是一个排列), 对于任何 $i \neq j$, S_i 和 S_j 没有公共顶点。

$N(\sigma)$ 表示排列 σ 的逆序对个数。

$$M = \begin{pmatrix} e(A_1, B_1) & e(A_1, B_2) & \dots & e(A_1, B_n) \\ e(A_2, B_1) & e(A_2, B_2) & \dots & e(A_2, B_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e(A_n, B_1) & e(A_n, B_2) & \dots & e(A_n, B_n) \end{pmatrix}$$

$$\det(M) = \sum_{S:A \rightarrow B} (-1)^{N(\sigma(S))} \prod_{i=1}^n \omega(S_i)$$

将边权设为 1, 由于对应关系是 $i \rightarrow i$, 所以答案就是 $g_n(k) = \det(M)$,
当 $k = 0$ 时,

$$g_n(0) = h_n(0) = 1$$

。

当 $k = 1$ 时,

$$g_n(1) = \binom{2n}{n}$$

$$h_n(1) = \binom{2n}{n} - 1$$

因为对于任意一条从左下到右上的路径的上方放 1, 下方放 0, 这对应了一种放置方法。而每种放置方法的边界也可以看成一条路径。

当 $k = 2$ 时,

$$M = \begin{bmatrix} \binom{2n}{n} & \binom{2n}{n-1} \\ \binom{2n}{n-1} & \binom{2n}{n} \end{bmatrix}$$

$$g_n(2) = \binom{2n}{n}^2 - \binom{2n}{n-1}^2$$

$$h_n(2) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \binom{2n}{n-1}$$

当 $k = 3$ 时,

$$M = \begin{bmatrix} \binom{2n}{n} & \binom{2n}{n-1} & \binom{2n}{n-2} \\ \binom{2n}{n-1} & \binom{2n}{n} & \binom{2n}{n-1} \\ \binom{2n}{n-2} & \binom{2n}{n-1} & \binom{2n}{n} \end{bmatrix}$$

$$g_n(3) = \frac{2}{(n+1)^2(n+2)} \binom{2n}{n} \binom{2n+1}{n} \binom{2n+2}{n}$$

$$h_n(3) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \binom{2n+1}{n} \left[\frac{2}{(n+1)(n+2)} \binom{2n+2}{n} - 1 \right]$$

对于任意的 k , 有

$$g_n(k) = \prod_{i=1}^k \prod_{j=1}^n \frac{n+i+j-1}{i+j-1}$$

因此 $T = 2$ 时, 答案为

$$h_n(1) = \binom{2n}{n} - 1$$

$T = 4$ 时, 答案为

$$h_n(2) = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \binom{2n}{n-1}$$

$T = 30 = 2 \times 3 \times 5$ 时, 答案为

$$h_n(1)^3 = \left(\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \binom{2n}{n-1} \right)^3$$

$T = 1000 = 2^3 \times 5^3$ 时, 答案为

$$h_n(3)^2 = \left(\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \binom{2n+1}{n} \left[\frac{2}{(n+1)(n+2)} \binom{2n+2}{n} - 1 \right] \right)^2$$

□