

Estatística Básica e Introdução ao R

Prof^a. Dra. Natalia Giordani

4. Análise de Regressão

- Análise de Regressão é uma metodologia estatística que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis a fim de que a variável resposta (ou variável dependente ou desfecho ou Y) possa ser predita a partir de outra, ou outras (preditora ou independente ou X).
- Exemplos
 - Vendas de um produto podem ser preditas utilizando a relação entre vendas e quantidade de investimento em publicidade
 - O desempenho de um colaborador em uma tarefa pode ser predita utilizando a relação entre desempenho e uma série de testes de aptidão
 - O tempo de internação de um paciente cirúrgico pode ser predito utilizando a relação entre o tempo e a gravidade da internação

4.1 Regressão Linear Simples


- O que é?
 - Uma única variável preditora (X) é utilizada para prever a variável resposta (ou desfecho ou Y) de interesse
- História...
 - Método desenvolvido por Francis Galton no fim do século 19
 - Em estudo da relação entre alturas de pais e filhos notou que a altura dos filhos tanto de pais altos quanto de pais baixos tendiam a regredir para a média do grupo
 - Desenvolveu uma descrição matemática dessa tendência de regressão – precursor dos modelos de regressão que usamos
 - Regressão: termo utilizado para descrever relações estatísticas entre variáveis

4.1 Regressão Linear Simples

- Conceitos Básicos
 - Um modelo de regressão é composto por dois ingredientes essenciais de uma relação estatística
 - Tendência da variável resposta Y variar de acordo com a variável preditora X de forma sistemática
 - Dispersão dos pontos em torno da curva da relação estatística
 - Esses dois ingredientes são incorporados em um modelo de regressão ao postular que
 - Há uma distribuição de probabilidades de Y para cada nível de X
 - As médias dessas distribuições de probabilidades variam de forma sistemática com X
 - Declaração formal do modelo
 - $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$


4.1 Regressão Linear Simples

■ Conceitos Básicos

- Um modelo de regressão é composto por dois ingredientes essenciais de uma relação estatística
 - Tendência da variável resposta Y variar de acordo com a variável preditora X de forma sistemática
 - Dispersão dos pontos em torno da curva da relação estatística
- Esses dois ingredientes são incorporados em um modelo de regressão ao postular que
 - Há uma distribuição de probabilidades de Y para cada nível de X
 - As médias dessas distribuições de probabilidades variam de forma sistemática com X
- Declaração formal do modelo
 - $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$  $E(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i$

4.1 Regressão Linear Simples

- Representação gráfica do modelo



- O valor esperado para a variável resposta, $E(y)$, muda de acordo com o valor da variável preditora, x .
- Independente do valor de x , a distribuição de probabilidade do erro e , consequentemente a distribuição de probabilidade de y , seguem uma distribuição normal com a mesma variância.
- O valor do erro em qualquer ponto pode ser positivo ou negativo – vai depender do valor observado de y ser maior ou menor que o valor esperado $E(y)$.

4.1 Regressão Linear Simples

- Conceitos Básicos

- Modelo de regressão **linear** simples

- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$

- E se...

- $Y_i = \beta_0 + \exp(\beta_1 X_i) + \varepsilon_i \longrightarrow$ Modelo **não linear**

- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \varepsilon_i \longrightarrow$ Modelo **linear** de regressão **polinomial**

4.1 Regressão Linear Simples

- Conceitos Básicos

- Estimação dos coeficientes: método de mínimos quadrados
- Modelo ajustado... necessário avaliar a qualidade do ajuste

1. Coeficiente de determinação (R^2)

- $$R^2 = 1 - \frac{SQRes}{SQTotal} = 1 - \frac{\sum(y - \hat{y})^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$$
- Mede o % da variação total dos valores da variável resposta (y) em relação à média que é explicada pelo modelo de regressão

4.1 Regressão Linear Simples

- Conceitos Básicos

- Modelo ajustado... necessário avaliar a qualidade do ajuste

- 2. Gráficos de resíduos e resíduos padronizados**

$$\text{Resíduo} = y - \hat{y} \sim \text{Normal}(0, \sigma^2)$$

- 3. Gráficos da distância de Cook**

- Mede a mudança nos valores preditos pelo modelo quando eliminamos uma das observações
- Destaca pontos (influentes ou alavanca) que podem afetar de forma relevante as estimativas dos parâmetros

- 4. Observações devem ser independentes**


4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.

Indivíduo	Idade (anos)	Distância (m)
1	18	170
2	20	197
3	22	187
4	23	170
5	23	153
...
30	82	120

4.1 Regressão Linear Simples


- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.



- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$
- $distância_i = \beta_0 + \beta_1 Idade_i + \varepsilon_i$

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.



- $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$
- $distância_i = \beta_0 + \beta_1 Idade_i + \varepsilon_i$
- $distância_i = \beta_0 + \beta_1 (Idade_i - 18) + \varepsilon_i$

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.

```
> dados <- dados %>%  
+   dplyr::mutate(idade_adj = idade - 18)  
> ajuste <- stats::lm(distancia ~ idade_adj, data = dados)  
> summary(ajuste)
```

```
Call:  
stats::lm(formula = distancia ~ idade_adj, data = dados)
```

```
Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max  
-26.077 -13.903   2.549  11.184  36.277
```

```
Coefficients:  
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 174.1863     5.5641  31.306 < 2e-16 ***  
idade_adj   -1.0023     0.1414  -7.086 1.04e-07 ***
```

```
---  
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 16.59 on 28 degrees of freedom  
Multiple R-squared:  0.642,    Adjusted R-squared:  0.6292  
F-statistic: 50.21 on 1 and 28 DF,  p-value: 1.041e-07
```

- $distância_i = 174,1863 - 1,0023 (Idade_i - 18) + \varepsilon_i$
- 174,1863 = distância esperada para que motorista de 18 anos consigam distinguir determinado objeto
- -1,0023 = redução da distância esperada para cada ano adicional na idade
- 64,2% da variação total da distância é explicada pelo modelo de regressão

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.

```
> ajuste2 <- stats::lm(distancia ~ idade, data = dados)
> summary(ajuste2)

Call:
stats::lm(formula = distancia ~ idade, data = dados)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-26.077 -13.903   2.549  11.184  36.277



Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 192.2273     7.8236  24.570  < 2e-16 ***
idade       -1.0023     0.1414  -7.086 1.04e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 16.59 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.642,    Adjusted R-squared:  0.6292
F-statistic: 50.21 on 1 and 28 DF,  p-value: 1.041e-07
```

- $distância_i = 192,2273 - 1,0023 Idade_i + \varepsilon_i$
- 192,2273 = distância esperada para que motorista de 0 anos consigam distinguir determinado objeto
- -1,0023 = redução da distância esperada para cada ano adicional na idade
- 64,2% da variação total da distância é explicada pelo modelo de regressão

4.1 Regressão Linear Simples


- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.



- Distribuídos sem padrão sistemático
- Variabilidade razoavelmente uniforme ao longo dos diferentes valores de x
 - Sugestivo de que suposição de homocedasticidade está atendida

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 1:** foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar como a distância com que os motoristas conseguem distinguir determinado objeto varia com a idade.



- Suposição de normalidade ✓

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 2:** dados de concentração atmosférica do poluente monóxido de carbono, CO, no dia (variável = tempo) i , na cidade de São Paulo, entre 01/jan e 30/abr de 1991.

Tempo	CO
1	6,6
...	...
120	7,0

```
> ajuste_ex2 <- stats::lm(CO ~ tempo, data = ex2)
> summary(ajuste_ex2)

Call:
stats::lm(formula = CO ~ tempo, data = ex2)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.7655 -0.9157 -0.1788  0.6613  4.5104

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  6.264608   0.254847   24.582  < 2e-16 ***
tempo        0.019827   0.003656    5.424 3.15e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1


Residual standard error: 1.387 on 118 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1996,    Adjusted R-squared:  0.1928
F-statistic: 29.42 on 1 and 118 DF,  p-value: 3.148e-07
```

Modelo RLS explica muito pouco
da variabilidade dos dados!

4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 2:** dados de concentração atmosférica dos poluentes ozônio O₃ e monóxido de carbono, além da temperatura média e umidade na cidade de São Paulo entre 01/jan e 30/abr de 1991.


Gráfico de dispersão



- Relação entre tempo e CO é representada por uma reta?

4.1 Regressão Linear Simples


- **Exemplo didático 2:** dados de concentração atmosférica dos poluentes ozônio O₃ e monóxido de carbono, além da temperatura média e umidade na cidade de São Paulo entre 01/jan e 30/abr de 1991.



- Padrão na distribuição dos resíduos!
- Dispersão varia com tempo!

4.1 Regressão Linear Simples



- **Exemplo didático 2:** dados de concentração atmosférica dos poluentes ozônio O₃ e monóxido de carbono, além da temperatura média e umidade na cidade de São Paulo entre 01/jan e 30/abr de 1991.



- Padrão na distribuição dos resíduos!
- Dispersão varia com tempo!
- O que isso significa?
 - Esse modelo não é adequado!



4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 3:** dados de mensuração da velocidade do vento no aeroporto da Philadelphia (EUA), sempre à 1h, no período de 01/12 a 15/12/74.



4.1 Regressão Linear Simples

- **Exemplo didático 3:** dados de mensuração da velocidade do vento no aeroporto da Philadelphia (EUA), sempre à 1h, no período de 01/12 a 15/12/74.



4.1 Regressão Linear Simples

Exemplo didático 4:

Observação	X	Y
1	4	4,26
2	5	5,68
3	6	7,24
4	7	4,82
5	8	6,95
6	9	8,81
7	10	8,04
8	11	8,33
9	12	10,84
10	13	7,58
11	14	9,96
12	18	6,31

Gráfico de dispersão






Gráfico de Resíduos padronizados



4.1 Regressão Linear Simples

▪ Exemplo didático 4:

Observação	X	Y
1	4	4,26
2	5	5,68
3	6	7,24
4	7	4,82
5	8	6,95
6	9	8,81
7	10	8,04
8	11	8,33
9	12	10,84
10	13	7,58
11	14	9,96
12	18	6,31



4.1 Regressão Linear Simples

Exemplo didático 4:

Sem excluir a observação 12:

```
> summary(ajuste_ex4)

Call:
lm(formula = y ~ x, data = ex4)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3.1149 -0.8969  0.2773  0.9475  2.8866

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   5.0106     1.3738   3.647  0.00448 **
x              0.2452     0.1307   1.876  0.09014 .
---

```

Intercepto: 5,01 (1,37)

Inclinação: 0,25 (0,13)

Excluindo a observação 12:

```
> summary(ajuste_ex4_adj)

Call:
lm(formula = y ~ x, data = ex4_adj)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.92127 -0.45577 -0.04136  0.70941  1.83882


Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   3.0001     1.1247   2.667  0.02573 *
x              0.5001     0.1179   4.241  0.00217 **
---

```

Intercepto: 3,00 (1,12)

Inclinação: 0,50 (0,12)

Gráfico de dispersão



4.2 Regressão Linear Múltipla

- O que é?
 - p variáveis preditoras (X) são utilizadas para prever a variável resposta (Y)
- Declaração formal do modelo
 - $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_p x_{ip} + e_i \longrightarrow i = 1, \dots, n$
 - $e_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, \sigma^2)$
 - Via estimadores de mínimos quadrados:
 - $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \hat{\beta}_2 x_{i2} + \dots + \hat{\beta}_p x_{ip}$
 - Resíduos
 - $e_i = y_i - \hat{y}_i$



4.2 Regressão Linear Múltipla

- Medidas de diagnóstico
 - Ver Regressão Linear Simples
- Observação relacionada ao coeficiente de determinação (R^2)
 - $R^2 = SQReg/SQTotal$
 - % da variabilidade de Y explicada pelo modelo
 - $SQReg$ aumenta com a inclusão de mais variáveis explicativas, por isso, para comparação de modelos com números diferentes de covariáveis, utilizar o R^2_{ajust}
- Cuidado em relação a multicolinearidade!

4.2 Regressão Linear Múltipla

- **Exemplo didático 5:** estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do IMC e da carga aplicada numa esteira ergométrica no consumo de oxigênio (VO_2) em determinada fase do exercício.

ID	VO2	IMC	Carga
1	14.1	24.32	71
2	16.3	27.68	91
3	9.9	23.93	37
4	9.5	17.50	32
...
28	31.0	24.24	151



4.2 Regressão Linear Múltipla

- **Exemplo didático 5:** estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do IMC e da carga aplicada numa esteira ergométrica no consumo de oxigênio (VO_2) em determinada fase do exercício.

```
> ajuste_ex5 <- stats::lm(VO2 ~ IMC + carga , data = ex5)
> summary(ajuste_ex5)

Call:
stats::lm(formula = VO2 ~ IMC + carga, data = ex5)




Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.1835 -2.0161 -0.2929  1.0642  9.0869

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  15.44597    4.45469   3.467  0.00192 **
IMC          -0.41311    0.17179  -2.405  0.02391 *
carga         0.12617    0.01465   8.614 5.95e-09 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 3.058 on 25 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.759,    Adjusted R-squared:  0.7397
F-statistic: 39.36 on 2 and 25 DF,  p-value: 1.889e-08
```

- $\widehat{VO2}_i = 15,45 - 0,41 IMC_i + 0,13carga_i$
- $\widehat{\beta}_1$: Valor esperado de VO_2 , mantendo fixa a carga da esteira, reduz em 0,41 unidades para cada aumento de uma unidade de IMC
- $\widehat{\beta}_2$: Valor esperado de VO_2 para indivíduos com o mesmo IMC aumenta em 0,13 unidades para cada aumento de uma unidade da carga na esteira
- 74% da variabilidade de VO_2 é explicada pelo modelo




4.2 Regressão Linear Múltipla



- Gráficos dos resíduos
 - Homocedasticidade





4.2 Regressão Linear Múltipla



- Gráficos dos resíduos
 - Homocedasticidade ✓

DECISÃO: REMOVER 3 PONTOS DE INFLUÊNCIA



- Gráfico da distância de Cook
 - 3 pontos atípicos
 - Resíduos associados a distâncias de Cook $> 4/n$
- QQPlot
 - 2 pontos deixam em dúvida suposição de normalidade dos resíduos

4.2 Regressão Linear Múltipla

- **Exemplo didático 5:** estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do IMC e da carga aplicada numa esteira ergométrica no consumo de oxigênio (VO_2) em determinada fase do exercício.

```
> ajuste_ex5_adj <- stats::lm(vo2 ~ IMC + carga , data = ex5_adj)
> summary(ajuste_ex5_adj)

Call:
stats::lm(formula = vo2 ~ IMC + carga, data = ex5_adj)




Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.1642 -0.8579 -0.1169  1.0763  3.4125

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  14.89386    3.47094   4.291 0.000296 ***
IMC          -0.35634    0.12606  -2.827 0.009822 **
carga         0.11304    0.01052  10.743 3.23e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1



Residual standard error: 1.987 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8581,    Adjusted R-squared:  0.8452
F-statistic: 66.5 on 2 and 22 DF,  p-value: 4.708e-10
```

- $\widehat{VO2}_i = 14,9 - 0,36 IMC_i + 0,11carga_i$
- $\widehat{\beta}_1$: Valor esperado de VO_2 , mantendo fixa a carga da esteira, reduz em 0,36 unidades para cada aumento de uma unidade de IMC
- $\widehat{\beta}_2$: Valor esperado de VO_2 para indivíduos com o mesmo IMC aumenta em 0,11 unidades para cada aumento de uma unidade da carga na esteira
- 84,5% da variabilidade de VO_2 é explicada pelo modelo

4.2 Regressão Linear Múltipla



- Gráficos dos resíduos
 - Homocedasticidade ✓



- QQPlot
 - Suposição de normalidade dos resíduos ✓

4.2 Regressão Linear Múltipla

- **Exemplo didático 5:** estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do IMC e da carga aplicada numa esteira ergométrica no consumo de oxigênio (VO_2) em determinada fase do exercício.
 - Qual seria o consumo de oxigênio esperado para um indivíduo com IMC de 25 submetido a uma carga na esteira de 100?
 - $\widehat{VO2}_i = 14,9 - 0,36 IMC_i + 0,11carga_i$
 - $\widehat{VO2}_i = 14,9 - (0,36 * 25) + (0,11 * 100) = 17,29$

```
> new.dat <- data.frame(IMC = 25, carga = 100)
> new.dat
  IMC carga
1  25   100
> predict(ajuste_ex5_adj, newdata = new.dat, interval = 'confidence')
      fit      lwr      upr
1 17.2897 16.45916 18.12023
```

Vamos praticar!

- **Objetivo inicial:** verificar como peso, potência e deslocamento impactam no consumo de combustível
 - Dados: mtcars
- Conceitos a desenvolver/discutir
 - Ajuste modelo
 - Avaliação ajuste
 - Interpretação
 - Predição
 - Critérios para comparação de modelos e métodos de seleção automáticos
 - Separação da amostra

Referências

- Morretin, PA; Singer JDM. Estatística e Ciência de Dados. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2022.
- Kutner, M; Wasserman, W; Neter J. Applied Linear Regression Models. McGraw-Hill/Irwin, 2004.