

앱 탑재용 다국어 의료 데이터 번역본

경영정보학과_2022103278_윤지현

- 증상 / Symptoms / 症状 / 症状
- 해결방안 / Solutions / 解决方案 / 解決策
- 상비약 / OTC Medicines / 常备药 / 常備藥
- 약국 방문 / Visit Pharmacy / 药房 / 薬局へ
- 동네 의원 / Local Clinic / 附近诊所 / 近所のクリニック
- 응급실 및 119 / ER & 119 / 急诊室及119 / 救急室および119

1) 감기 및 호흡기 증상 / Cold & Respiratory / 感冒与呼吸道症状 / 風邪および呼吸器症状

- 약국 방문

증상: 초기 가벼운 콧물, 기침, 미열(37.5도 내외), 경미한 목 통증

EN: Mild runny nose, cough, slight fever (around 37.5C), mild sore throat.

CN: 初期轻微流鼻涕、咳嗽、微热(约37.5度)、轻微喉咙痛。

JP: 初期の軽い鼻水、咳、微熱(37.5度前後)、軽い喉の痛み。

해결방안: 종합감기약, 소염진통제 복용 및 충분한 수분 섭취와 휴식 유도.

EN: Take general cold medicine and pain relievers. Rest and hydrate.

CN: 服用综合感冒药、消炎止痛药。多喝水并休息。

JP: 総合感冒薬、消炎鎮痛剤を服用。十分な水分補給と休息を取る。

- 동네 의원

증상: 3일 이상 지속되는 고열, 누런 가래, 침을 삼키기 힘들 정도의 심한 인후통

EN: High fever lasting over 3 days, yellow phlegm, severe sore throat making swallowing difficult.

CN: 持续3天以上的高烧、黄痰、吞咽困难的严重喉咙痛。

JP: 3日以上続く高熱、黄色い痰、唾を飲み込むのが困難なほどの激しい喉の痛み。

해결방안: 인근 이비인후과, 내과 안내. 항생제 등 전문의약품 처방 필요.

EN: Visit an ENT or internal medicine clinic. Prescription drugs like antibiotics needed.

CN: 前往附近的耳鼻喉科或内科。需要处方药(如抗生素)。

JP: 近所の耳鼻咽喉科, 内科へ。抗生物質などの処方薬が必要。

- 응급실 및 119

증상: 숨을 쉴 때 쌉쌉거림(천명음), 호흡 곤란, 입술이 파래지는 청색증, 극심한 흉통 동반

EN: Wheezing, difficulty breathing, blue lips (cyanosis), severe chest pain.

CN: 呼吸时有喘鸣音、呼吸困难、嘴唇发紫、伴随剧烈胸痛。

JP: 呼吸時のゼーゼーという音(喘鳴)、呼吸困難、唇が青くなるチアノーゼ、激しい胸痛。

해결방안: 즉시 119 신고 또는 대형병원 응급실 연계. (급성 천식 발작, 폐렴, 심부전 가능성)

EN: Call 119 immediately or visit an ER. (Possible severe asthma attack, pneumonia, or heart failure)

CN: 立即拨打119或前往大医院急诊室。(可能为急性哮喘、肺炎、心力衰竭)

JP: 直ちに119番通報または救急病院へ。(急性喘息発作、肺炎、心不全の可能性)

2) 복통 및 소화기 증상 / Stomachache & Digestive / 腹痛与消化道症状 / 腹痛および消化器症状

- 약국 방문

증상: 과식으로 인한 단순 소화불량, 가벼운 속쓰림, 탈수 없는 일시적 설사

EN: Simple indigestion from overeating, mild heartburn, temporary diarrhea without dehydration.

CN: 暴饮暴食引起的单纯消化不良、轻微胃灼热、无脱水的暂时性腹泻。

JP: 食べ過ぎによる単純な消化不良、軽い胸やけ、脱水を伴わない一時的な下痢。

해결방안: 소화제, 위장약, 지사제 복용 권장. 자극적인 음식을 피하고 미음 섭취 권장.

EN: Take digestive medicine, antacids, or antidiarrheals. Avoid spicy food and eat porridge.

CN: 建议服用消化药、胃药、止泻药。避免辛辣食物，建议喝粥。

JP: 消化剤、胃腸薬、下痢止めの服用を推奨。刺激物を避け、お粥を食べる。

- 동네 의원

증상: 지속적인 복통, 하루 3회 이상의 설사 및 구토 동반, 가벼운 배탈

EN: Persistent stomachache, diarrhea and vomiting more than 3 times a day, mild upset stomach.

CN: 持续腹痛、一天3次以上腹泻及呕吐、轻微肠胃不适。

JP: 持続する腹痛、1日3回以上の下痢と嘔吐を伴う軽い腹痛。

해결방안: 인근 내과 안내. 수액 치료 및 장염 약 처방 필요.

EN: Visit an internal medicine clinic. IV fluids and enteritis medication needed.

CN: 前往附近的内科。需要输液治疗和开具肠炎药物。

JP: 近所の内科へ。点滴治療および腸炎薬の処方が必要。

- 응급실 및 119

증상: 오른쪽 아랫배의 극심한 통증, 피가 섞인 토(토혈)나 검은색 변(혈변), 배가 딱딱해지며 손만 대도 아픈 경우

EN: Severe pain in the lower right abdomen, vomiting blood, black stool, stiff abdomen that hurts to touch.

CN: 右下腹剧痛、吐血或黑便、腹部僵硬且触痛。

JP: 右下腹部の激痛、吐血や黒い便(血便)、お腹が硬くなり触るだけで痛む場合。

해결방안: 즉시 응급실 이송. (급성 충수염, 장폐색, 복막염 등 응급 수술 필요 상황)

EN: Immediate transfer to ER. (Emergency surgery required for appendicitis, bowel obstruction, peritonitis, etc.)

CN: 立即送往急诊室。(可能需紧急手术, 如急性阑尾炎、肠梗阻、腹膜炎等)

JP: 直ちに救急室へ搬送。(急性虫垂炎、腸閉塞、腹膜炎など緊急手術が必要な状況)

3) 발열 증상 / Fever / 发热症状 / 発熱症状

- 약국 방문

증상: 성인의 가벼운 몸살을 동반한 38도 미만의 미열

EN: Mild fever under 38C with minor body aches in adults.

CN: 成人伴有轻微身体酸痛的38度以下低烧。

JP: 大人の軽い体調不良を伴う38度未満の微熱。

해결방안: 해열진통제(아세트아미노펜, 이부프로펜 등) 복용 및 미온수 마사지 안내.

EN: Take fever reducers (Acetaminophen, Ibuprofen) and use lukewarm sponge baths.

CN: 服用退烧止痛药(对乙酰氨基酚、布洛芬等)并温水擦拭。

JP: 解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)の服用と、ぬるま湯でのマッサージ。

- 동네 의원

증상: 해열제를 먹어도 2일 이상 내려가지 않는 38도 이상의 고열, 오한과 전신 근육통 동반

EN: High fever over 38C lasting more than 2 days despite medication, accompanied by chills and severe muscle aches.

CN: 吃退烧药2天以上仍未退的38度以上高烧, 伴有发冷和全身肌肉痛。

JP: 解熱剤を飲んでも2日以上下がらない38度以上の高熱、悪寒と全身の筋肉痛。

해결방안: 인근 내과, 가정의학과 안내. 독감, 코로나 등 감염병 검사 및 수액/해열 주사 처치 필요.

EN: Visit a local clinic. Flu/COVID-19 tests, IV fluids, or fever-reducing injections needed.

CN: 前往内科或家庭医学科。需进行流感或新冠检测, 及输液/退烧针治疗。

JP: 近所の内科, 家庭医学科へ。インフルエンザ, コロナなどの感染症検査、点滴, 解熱注射が必要。

- 응급실 및 119

증상: 생후 3개월 미만 영아의 38도 이상 고열, 성인의 39도 이상 고열과 함께 의식 저하 또는 경련 (열성경련) 발생 시

EN: Fever over 38C in infants under 3 months, or over 39C in adults with altered mental status or seizures.

CN: 3个月以下婴儿38度以上高烧, 成人39度以上高烧并伴有意识模糊或痉挛时。

JP: 生後3ヶ月未満の乳児の38度以上の高熱、大人の39度以上の高熱と共に意識低下や痙攣(熱性けいれん)が発生した場合。

해결방안: 즉시 119 신고 및 응급실 연계. 소아의 경우 경련 시 기도 유지를 최우선으로 하도록 안내 콘텐츠 제공.

EN: Call 119 immediately. For pediatric seizures, prioritize keeping the airway open.

CN: 立即拨打119或前往急诊室。若儿童出现痉挛, 优先保持呼吸道通畅。

JP: 直ちに119番通報および救急室へ。小児の痙攣時は、気道確保を最優先にするよう案内。

4) 외상 및 상해 / Trauma & Wound / 外伤与伤害 / 外傷および傷害

- 약국 방문

증상: 피부 표면만 살짝 벗겨진 찰과상, 얇게 베인 상처, 멍(경미한 타박상)

EN: Superficial scrapes, shallow cuts, bruises (mild contusions).

CN: 表面擦伤、浅划伤、淤青(轻微挫伤)。

JP: 皮膚表面の軽い擦り傷、浅い切り傷、あざ(軽い打撲)。

해결방안: 흐르는 물에 상처 세척 후 소독제(포비돈 등) 및 항생제 연고 도포, 일회용 밴드 부착 안내.

EN: Wash under running water, apply antiseptic (e.g., Povidone) and antibiotic ointment, then bandage.

CN: 用流水清洗伤口后, 涂抹消毒剂(如碘伏)和抗生素软膏, 贴上创可贴。

JP: 流水で傷を洗い、消毒液(ポビドンなど)と抗生物質軟膏を塗り、絆創膏を貼る。

- 동네 의원

증상: 상처가 깊어 꿰매야 할 것 같은 경우(봉합 필요), 발목을 삐어 붓고 걷기 힘든 경우

EN: Deep cuts requiring stitches, or a sprained ankle that is swollen and difficult to walk on.

CN: 伤口较深可能需要缝合时, 或脚踝扭伤肿胀难以行走时。

JP: 傷が深く縫合が必要な場合、足首を捻挫して腫れ、歩行が困難な場合。

해결방안: 인근 정형외과, 일반외과 안내. 파상풍 주사 접종, 엑스레이 검사 및 깁스/물리치료 필요.

EN: Visit an orthopedics or general surgery clinic. Tetanus shot, X-rays, splints, or physical therapy needed.

CN: 前往骨科或普外科。需接种破伤风疫苗, 进行X光检查、打石膏或理疗。

JP: 近所の整形外科, 一般外科へ。破傷風注射、レントゲン検査、ギプス, 物理療法が必要。

- 응급실 및 119

증상: 뼈가 튀어나오거나 꺾인 개방성 골절, 수건으로 압박해도 피가 멈추지 않는 대량 출혈, 머리를 부딪친 후 구토, 기억상실, 의식불명

EN: Open fractures with visible bone, massive bleeding not stopping with pressure, head trauma followed by vomiting, amnesia, or unconsciousness.

CN: 骨头外露的开放性骨折、按压也无法止血的大量出血、头部受击后出现呕吐、失忆或昏迷。

JP: 骨が飛び出したり折れ曲がった開放性骨折、圧迫しても止まらない大量出血、頭を打った後の嘔吐, 記憶喪失, 意識不明。

해결방안: 즉시 119 신고. 지혈 방법(심장보다 높게 올리고 압박)을 화면에 띄우며 구급차 유도.

EN: Call 119 immediately. Show bleeding control instructions (elevate above heart and apply pressure) while waiting.

CN: 立即拨打119。在屏幕上显示止血方法(抬高至心脏以上并按压)以引导急救。

JP: 直ちに119番通報。止血方法(心臓より高く上げて圧迫)を画面に表示し、救急車を待つ。

5) 알레르기 / Allergy / 過敏 / アレルギー

- 약국 방문

증상: 특정 음식이나 접촉으로 인한 가벼운 피부 두드러기, 가려움증, 재채기

EN: Mild hives, itching, or sneezing caused by specific food or contact.

CN: 特定食物或接触引起的轻微荨麻疹、瘙痒、打喷嚏。

JP: 特定の食べ物や接触による軽い荨麻疹、かゆみ、くしゃみ。

해결방안: 일반의약품 항히스타민제 복용 안내, 상처 부위 냉찜질 권장.

EN: Take OTC antihistamines. Apply a cold compress to the affected area.

CN: 服用非处方抗组胺药, 建议对患处进行冷敷。

JP: 市販の抗ヒスタミン剤を服用し、患部の冷やしを推奨。

- 동네 의원

증상: 전신으로 번지는 두드러기, 가려움이 너무 심해 일상생활이나 수면이 불가능한 경우

EN: Hives spreading all over the body, intense itching disrupting daily life or sleep.

CN: 蔓延全身的荨麻疹, 瘙痒严重导致无法进行日常活动或睡眠。

JP: 全身に広がる荨麻疹、かゆみがひどく日常生活や睡眠が不可能な場合。

해결방안: 인근 피부과, 내과 안내. 스테로이드제 또는 강한 처방용 항히스타민제 필요.

EN: Visit a dermatology or internal medicine clinic. Steroids or strong prescription antihistamines needed.

CN: 前往附近的皮肤科或内科。需要类固醇或强效处方抗组胺药。

JP: 近所の皮膚科, 内科へ。ステロイド剤または強力な処方用抗ヒスタミン剤が必要。

- 응급실 및 119

증상: 알레르기 유발 물질 접촉 후 목구멍이 부어오름, 호흡 곤란, 혈압 저하 및 어지러움, 의식 상실

EN: Swelling of the throat, shortness of breath, low blood pressure, dizziness, or loss of consciousness after exposure to an allergen.

CN: 接触过敏原后喉咙肿胀、呼吸困难、血压下降、头晕、失去意识。

JP: アレルギー原因物質に触れた後、喉が腫れる、呼吸困難、血圧低下やめまい、意識喪失。

해결방안: 즉시 119 신고. (치명적인 아나필락시스 쇼크 상태이므로 구급차 내에서 에피네프린 투여

등 긴급 처치 필요)

EN: Call 119 immediately. (Fatal anaphylactic shock requires emergency treatment like epinephrine in the ambulance)

CN: 立即拨打119。(此为致命的过敏性休克，需在救护车內紧急注射肾上腺素等)

JP: 直ちに119番通報。(致命的なアナフィラキシーショックのため、救急車内でエピネフリン投与などの緊急処置が必要)