

#### <앱 구성>

홈, 증상, 진료찾기, ai채팅, 프로필로 구성

각 구성에 119 신고버튼이 있음

홈- 모든 구성을 볼 수 있음(프로필, 증상가이드, 진료찾기, ai 채팅)

\* 현재 홈 화면에 약국찾기와 병원현황이 있지만 약국찾기가 있지만 약국찾기를 진료찾기로 바꾸고 병원 현황은 진료찾기의 리스트와 겹쳐 ai 채팅을 넣을 것

다른 구성을 누를 경우 실행됨

증상: 기존에 결정한 5대 증상을 토대로 들어감(변경 사항 있음)

\* 변경 사항:

- 1) 감기 및 호흡기 증상-> 감기/독감 증상,
- 2) 복통 및 소화기 증상-> 복통/메스꺼움
- 3) 발열 증상-> 발열
- 4) 알레르기 없애고 식중독과 두통 추가
- 5) 외상 및 상해 변경 사항 없음

총 6개의 증상이 들어감

각 들어갈 내용(증상 간단한 설명(about), 대처방법, 일반 의약품(otc), 즉시 의료 도움을 받아야 할 때, 응급 버튼 문구 )

\*일반의약품에는 구매전 약사에게 문의하라는 내용이 있어야 됨

\*약 설명에는 약 이름, 약 성분, 주의할 점이 들어감

들어갈 내용 정리

[약 표시 방안: 약이름: 약성분(주의해야 할 점)]

#### 1) 두통

- about: 머리, 두피 또는 목의 통증이나 불편함입니다. 관광객에게 흔한 원인으로는 탈수, 시차, 스트레스, 피로 또는 환경 변화가 있습니다.

- 대처방법:

조용하고 어두운 방에서 휴식

물을 마시세요 - 탈수가 가장 흔한 원인입니다

밝은 화면과 시끄러운 환경을 피하세요

이마에 차갑고 축축한 천을 얹으세요

목과 어깨를 부드럽게 스트레칭하세요

- 일반의약품(otc)

진통제: 아세트아미노펜 (타이레놀), 이부프로펜 제품(이부프로펜은 음식과 함께 복용해야 함)

복합 두통 완화제: 카페인 + 진통제 복합 제품(카페인에 민감하면 피하기. 3일 이상 연속 사용 금지.)

-즉시 의료 도움을 받아야 할 때

갑작스럽고 심한 두통

두통 + 고열 + 목 경직

머리 부상 후 두통

시야 변화 또는 안면 처짐

24시간 동안 점점 악화되는 두통

## 2) 복통 / 메스꺼움

- about: 낫선 음식을 먹는 관광객에게 복통, 팽만감, 메스꺼움이 매우 흔합니다. 매운 한국 음식이나 날 해산물(회)이 자주 유발합니다.

- 대처방법

메스꺼우면 1~2시간 동안 식사를 피하세요

맑은 음료를 천천히 조금씩 마시세요

기름지고 매운 음식은 일시적으로 피하세요

죽, 크래커, 토스트 등 담백한 음식을 드세요

증상이 완전히 나아질 때까지 유제품을 피하세요

- 일반의약품

제산제: 탄산칼슘, 수산화마그네슘 제품(의료 조언 없이 2주 이상 사용하지 마세요.)

항구토제: 디멘히드리네이트 제품 (보나링-에이)(졸음을 유발할 수 있습니다. 운전 금지.)

소화 효소제: 효소 기반 소화제(약사에게 상호작용 문의하세요.)

- 즉시 의료 도움

완화되지 않는 심한 복통

피나 어두운 물질 구토

탈수 징후: 어지럼증, 소변 없음

복통과 함께 고열

48시간 이상 지속되는 증상

## 3)발열

- about: 발열 = 체온  $37.5^{\circ}\text{C}$  이상. 감염에 대한 신체의 면역 반응입니다.

- 대처방법

휴식 - 신체 활동을 피하세요

물과 전해질 음료를 충분히 마시세요

가볍고 통기성 있는 옷을 입으세요

이마에 차갑고 축축한 천을 얹으세요

2~4시간마다 체온을 확인하세요

- 일반의약품

해열제: 아세트아미노펜 제품 (타이레놀)(정해진 용량을 초과하지 마세요. 음주 금지.)

소염 해열제: 이부프로펜 제품(음식과 함께 복용하세요.)

- 즉시의료도움

체온  $39.5^{\circ}\text{C}$  이상

3일 이상 지속되는 발열

발열 + 심한 두통 + 목 경직

호흡 곤란 또는 흉통

혼란 또는 깨어 있기 어려움

#### 4) 감기/독감 증상

- about: 감기: 콧물, 인후통, 가벼운 기침. 독감: 갑작스러운 고열, 몸살, 극심한 피로.

- 대처방안

충분히 휴식을 취하세요

따뜻한 음료를 마시세요

따뜻하게 지내고 찬바람을 피하세요

손을 자주 씻으세요

혼잡한 실내에서는 마스크를 착용하세요

-일반 의약품

비충혈 완화제: 슈도에페드린 제품(고혈압이나 심장 질환이 있으면 피하세요.)

항히스타민제: 클로르페나민, 로라타딘 제품( 일부는 졸음을 유발합니다.)

목 사탕 / 스프레이: 벤조카인 목캔디( 6세 미만 어린이에게는 적합하지 않습니다.)

기침 억제제: 덱스트로메토르판 제품( 알코올과 함께 복용하지 마세요.)

- 즉시 의료 도움을 받아야 할 때

39°C 이상의 고열

호흡 곤란 또는 숨 가쁨

흉통 또는 답답함

7~10일 후 증상이 급격히 악화

피가 섞인 기침

#### 5) 식중독 의심

- about: 오염된 음식을 먹은 후 발생합니다. 날 해산물(회)과 부적절하게 보관된 음식이 흔한 원인입니다.

- 대처방안:

식사를 중단하고 2시간 이상 위를 쉬게 하세요

경구 수액 보충제로 수분을 보충하세요

구토가 멈출 때까지 고형 음식을 피하세요

죽, 크래커, 바나나부터 다시 시작하세요

변에 피가 보이면 지사제를 복용하지 마세요

- 일반의약품

경구 수액 보충제 (ORS): 전해질 파우치(수액보충)( 모든 약국에서 구입 가능. 가장 중요한 단계.)

지사제: 로페라마이드 제품(변에 피가 보이면 사용하지 마세요.)

항구토제: 디멘히드리네이트 제품(졸음을 유발할 수 있습니다)

- 즉시 의료 도움

구토물이나 변에 피가 섞임

심한 탈수: 어지럼증, 실신

체온 38.5°C 이상

48시간 이상 지속되는 증상

복어 의심 - 즉시 응급실로 가세요

## 6) 외상 및 상해

- about: 넘어지거나 부딪히거나 베이는 등의 사고로 발생하는 신체 손상입니다. 상처의 깊이와 출혈 정도에 따라 적절한 처치가 필요합니다.

- 대처방안:

흐르는 깨끗한 물로 상처 부위를 충분히 씻어주세요.

출혈이 있으면 깨끗한 거즈나 수건으로 5~10분 이상 압박하세요.

상처를 소독한 후 항생제 연고를 바르고 밴드를 부착하세요.

발목이나 손목을 삐었을 경우 휴식(Rest), 냉찜질(Ice), 압박(Compression), 거상(Elevation)을 시행하세요.

통증이나 붓기가 심해지면 의료기관을 방문하세요.

상처가 깊거나 오염되었다면 파상풍 예방접종 여부를 확인하세요.

- 일반의약품

소독제: 포비돈 요오드, 클로르헥시딘 제품(상처 세척 후 사용하세요.)

항생제 연고: 후시딘, 마데카솔 등(깨끗이 세척한 후 얇게 도포하세요.)

진통·소염제: 아세트아미노펜, 이부프로펜 제품(통증 완화에 도움이 되지만 권장 용량을 초과하지 마세요.)

냉찜질 팩: 즉시 냉찜질 팩(뺨 부위나 타박상에 15~20분씩 적용하세요)

- 즉시 의료 도움을 받아야 할 때

상처가 깊어 봉합이 필요해 보이는 경우

뼈가 보이거나 변형이 있는 골절 의심

수건으로 압박해도 출혈이 10분 이상 멈추지 않는 경우

머리를 다친 후 구토, 심한 두통, 기억상실 발생

의식 저하, 실신, 경련 발생

발목·손목 부상 후 체중을 실을 수 없을 정도로 통증이 심한 경우

동물에게 물리거나 녹슨 물체에 찔린 경우