

Решение контрольного задания оформляется в виде отчёта по лабораторной работе. Каждому пункту задания соответствует отдельная глава отчета. В каждой главе должно быть приведено задание, краткое описание решения, результаты (графики) и текст программы.

Ф.И.О., номер группы: _____

1. Решение системы линейных уравнений

1

Найдите решение системы линейных уравнений:

$$2 \cdot x_0 + 9 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 6 \cdot x_3 = 86 \quad (1)$$

$$4 \cdot x_0 + 10 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 97 \quad (2)$$

$$4 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 10 \cdot x_3 = 88 \quad (3)$$

$$4 \cdot x_0 + 2 \cdot x_1 + 5 \cdot x_2 + 8 \cdot x_3 = 82 \quad (4)$$

2. Максимальное значение массива

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0.76, 1.15, 1.08, 1.68, 0.68, 0.27, 0.24, -0.8, -0.87, 0.01, 0.53]$$

Напишите код, который определяет максимальное значение этой функции (и любой другой подобной функции) и значение x , которое соответствует максимальному значению. Постройте график функции.

3. Интерполяция

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2.]$$

$$y = [0.52, 2.28, 3.87, 5.37, 5.02]$$

Напишите код, который определяет приближенное значение функции при $x = 1.3$, используя линейную интерполяцию.

4. Аппроксимация

3

Задана табличная функция

$$x = [0, 1, 2, 3, 4]$$

$$y = [0.72, 4.39, 7.27, 10.24, 10.59]$$

- Определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 2 порядка.
- Определите коэффициенты аппроксимирующего многочлена 4 порядка.

Постройте на одном рисунке график табличной функции (точками) и график аппроксимирующих многочленов на интервале от 0 до 4.

5. Интегрирование табличной функции

2

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.5, 1., 1.5, 2., 2.5, 3.]$$

$$y = [8.96, 8.04, 5.14, 2.26, -1.49, -4.2, -7.17]$$

- Вычислите приближенное значение определенного интеграла этой от этой функции с нижним пределом $x_1 = 0$ и верхнем пределом $x_2 = 3$, используя приближенный метод трапеций.
- Найдите среднее значение функции на интервале от 0 до 3.
- Постройте график функции и покажите горизонтальной линией на этом же графике ее среднее значение.

6. Численное интегрирование заданной функции

2

Вычислите интеграл

$$I = \int_1^2 \frac{6 + \sin^2 x}{6 + 9x^2 + 9 \cos^2 x} dx$$

и постройте график подинтегральной функции на интервале от 1 до 2.

7. Решение нелинейного уравнения

3

Найдите ближайший к нулю корень уравнения

$$\cos 3x - 10x = 0$$

8. Интегрирование дифференциальных уравнений Найдите численное решение дифференциального уравнения

2

$$2 \frac{d^2 r}{dt^2} = -8 \cdot r + 9 \cos(6t)$$

при начальных условиях $r(0) = 10$, $\dot{r}(0) = 0$ на интервале от 0 до 1 с. Постройте графики $r(t)$ и $\dot{r}(t)$.

9. Линейное программирование

4

Для производства двух видов изделий (А и В) предприятие использует три вида сырья: S1, S2, S3. Для производства изделия А требуется 5 кг сырья S1, 4 кг сырья S2 и 3 кг сырья S3. Для производства изделия В требуется 4 кг сырья S1, 5 кг сырья

S2 и 4 кг сырья S3. Всего на предприятии имеется 409 кг S1, 366 кг S2 и 544 кг S3. Прибыль от реализации одного изделия А составляет 131 руб, одного изделия В – 116 руб. Составить такой план продукции, при котором прибыль предприятия от реализации продукции будет максимальной.

9. [64, 21]

10. Численное дифференцирование

3

Задана табличная функция

$$x = [0., 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.]$$

$$y = [0., 0.16, 0.31, 0.45, 0.59, 0.71, 0.81, 0.89, 0.95, 0.99, 1.]$$

Найдите приближенное значение первой производной этой функции в точке $x = 0.3$ и второй производной в точке $x = 0.7$.

11. Расстояние между точками на плоскости

4

Известны координаты семи точек на плоскости, заданных массивами координат x и y

$$x = [5, 7, 9, 7, 5, 9, 8], \quad y = [5, 7, 3, 0, 1, 7, 8]$$

Напишите код, который определяет и выводит на экран

- пары координат двух ближайших точек и расстояние между ними;
- максимальное расстояние между точками;
- среднее расстояние между точками.

12. Решение системы нелинейных уравнений

3

Найдите одно из решений системы нелинейных уравнений:

$$6(x_1 - 2)^2 + 4x_2^2 = 1 \quad (5)$$

$$(x_1 - 3)^2 + x_2^2 = 4 \quad (6)$$