



PLANILHAS



TREINO PERSONALIZADO



PLANILHAS

PLANILHAS PERSONALIZADAS

SUPINO RETO COM BARRA

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco reto;
- Pés apoiados no chão;
- Braços esticados.

MOVIMENTO

Descer a barra em linha reta em direção a porção média do peitoral, encostar a barra levemente no peitoral e subir novamente até a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Pegada aberta ou fechada demais;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Elevar demasiadamente os cotovelos (ombros em um ângulo de 90° com o tronco);

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Faça uma pegada mais aberta para aumentar ênfase no peitoral;
3. Faça uma pegada mais fechada para aumentar a ênfase no tríceps;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

SUPINO INCLINADO COM BARRA

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco inclinado a aproximadamente 45 graus;
- Pés apoiados no chão;
- Braços esticados.

MOVIMENTO

Descer a barra em linha reta em direção a porção clavicular do peitoral, encostar a barra levemente no peitoral e subir novamente até a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Pegada aberta ou fechada demais;
2. Descer a Barra na direção errada, muito acima ou muito abaixo;
3. Elevar demasiadamente os cotovelos (ombros em um ângulo de 90° com o tronco);
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Faça uma pegada mais aberta para aumentar ênfase no peitoral;
3. Faça uma pegada mais fechada para aumentar a ênfase no tríceps;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

SUPINO DECLINADO COM BARRA

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco declinado;
- Pés presos no banco;
- Braços estendidos.

MOVIMENTO

Descer a barra em linha reta em direção a porção inferior do peitoral, encostar a barra levemente no peitoral e subir novamente até a posição inicial..

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.

ERROS COMUNS

1. Pegada aberta ou fechada demais;
2. Descer a Barra na direção errada, muito acima ou muito abaixo;
3. Elevar demasiadamente os cotovelos (ombros em um ângulo de 90° com o tronco);
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Faça uma pegada mais aberta para aumentar ênfase no peitoral;
3. Faça uma pegada mais fechada para aumentar a ênfase no tríceps;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

SUPINO RETO COM HALTERES

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco reto;
- Pés apoiados no chão;
- Braços esticados.

MOVIMENTO

Descer a halter em linha reta em direção a porção média do peitoral, encostar o halter levemente no peitoral e subir novamente até a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Pegada aberta ou fechada demais;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Elevar demasiadamente os cotovelos (ombros em um ângulo de 90° com o tronco);

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Aumentar a amplitude de movimento para liberdade dos halteres.
3. Controle o movimento para melhorar a qualidade do exercício;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

SUPINO INCLINADO COM HALTERES

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco inclinado a aproximadamente 45 graus;
- Pés apoiados no chão;
- Braços esticados.

MOVIMENTO

Descer o halter em linha reta em direção a porção clavicular do peitoral, encostar o halter levemente no peitoral e subir novamente até a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Pegada aberta ou fechada demais;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Elevar demasiadamente os cotovelos (ombros em um ângulo de 90° com o tronco);

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Aumentar a amplitude de movimento para liberdade dos halteres.
3. Controle o movimento para melhorar a qualidade do exercício;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

CRUCIFIXO RETO COM HALTERES

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco reto;
- Pés apoiados no chão;
- Braços esticados;
- Palma das mãos voltadas para dentro.

MOVIMENTO

Controle a descida dos halteres para fora, com uma leve flexão de cotovelos enquanto os pesos descem até os níveis do peitoral, logo após retome a posição inicial mantendo a flexão de cotovelos até os halteres se aproximarem.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral e deltoides
(porção frontal)

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro.



ERROS COMUNS

1. Flexionar demasiadamente os cotovelos durante o movimento;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Amplitude exagerada dos ombros;
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Ao Retomar a posição inicial não deixe que os ombros formem um ângulo de 90° com o tronco pois isso irá tirar a tensão do peitoral;
3. Concentre-se na fase excêntrica do movimento.

CRUCIFIXO INCLINADO COM HALTERES

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado no banco inclinado;
- Pés apoiados no banco;
- Braços esticados;
- Palma das mãos voltadas para dentro.

MOVIMENTO

Controle a descida dos halteres para fora, com uma leve flexão de cotovelos enquanto os pesos descem até os níveis do peitoral, logo após retome a posição inicial mantendo a flexão de cotovelos até os halteres se aproximarem.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral e deltoides
(porção frontal)

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro.



ERROS COMUNS

1. Flexionar demasiadamente os cotovelos durante o movimento;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Amplitude exagerada dos ombros;
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Ao Retomar a posição inicial não deixe que os ombros formem um ângulo de 90° com o tronco pois isso irá tirar a tensão do peitoral;
3. Concentre-se na fase excêntrica do movimento.

CROSSOVER

POSIÇÃO INICIAL

- De pé em posição ereta;
- Ombros aproximadamente 90°;
- Braços esticados;
- Palma das mãos voltadas para dentro segurando a polia.

MOVIMENTO


Com os braços estendidos junte as polias na altura do seu umbigo e depois sustente o movimento de volta a posição inicial na fase excêntrica.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, deltoides (porção frontal) e bíceps braquial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro.



ERROS COMUNS

1. Realizar movimentos com os cotovelos durante todo movimento;
2. Colocar os pés no banco, retificando a coluna lombar;
3. Amplitude exagerada dos ombros;
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Ao Retomar a posição inicial não deixe que os ombros formem um ângulo de 90° com o tronco pois isso irá tirar a tensão do peitoral;
3. Concentre se na fase excêntrica do movimento.
4. Quanto mais alta a polia estiver, maior ação da parte inferior dos peitorais e quanto mais baixa,

FLEXÃO DE BRAÇOS

POSIÇÃO INICIAL

- Com os braços estendidos em posição ventral com pernas estendidas;
- Tronco estabilizado.

MOVIMENTO

Descer o corpo em direção ao solo flexionando os cotovelos, até que o peitoral fique bem próximo do solo, logo depois estender os cotovelos retomando a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Mãos abertas ou fechadas demais;
2. Cotovelos demasiadamente elevados (ombros em um ângulo de 90 graus com o tronco ou acima).
3. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma pegada mais aberta para aumentar ênfase no peitoral;
2. Faça uma pegada mais fechada para aumentar a ênfase no tríceps;
3. Controle o movimento para melhorar a qualidade do exercício;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

VOADOR

POSIÇÃO INICIAL

- De pé em posição ereta;
- Ombros aproximadamente 90°;
- Braços esticados;
- Palma das mãos voltadas para dentro segurando a polia.

MOVIMENTO

Com os braços estendidos junto as polias na altura do seu umbigo e depois sustente o movimento de volta a posição inicial na fase excêntrica.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, deltoides (porção frontal) e bíceps braquial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal ombro.



ERROS COMUNS

1. Ombros muito elevados ou muito baixos;
2. Movimentar os cotovelos durante o movimento;
3. Projetar o tronco a frente realizando movimento;
4. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Mantenha tensão no peitoral durante todo movimento;
3. Foque no movimentos dos ombros e deixe os cotovelos apenas levemente flexionados durante todo o movimento;
4. Mantenha os ombros aproximadamente 80 graus durante todo movimento.

PARALELAS

POSIÇÃO INICIAL

- Mãos na barra paralela;
- Sustentando o corpo com os cotovelos estendidos e bloqueados;
- Corpo levemente inclinado a frente.

MOVIMENTO


Dobre os cotovelos, baixando o tronco até que os braços fiquem paralelos ao chão. Empurre o corpo de volta à posição inicial, isto é, até que os cotovelos fiquem novamente estendidos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Não inclinar o tronco levemente a frente;
2. Amplitude muito grande de extensão de cotovelos;
3. Baixa amplitude de movimento;
4. Prescrever este exercício para pessoas com falta de mobilidade ou lesão na articulação dos ombros.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Faça uma pegada mais aberta e uma inclinação de tronco maior para aumentar ênfase no peitoral;
3. Faça uma pegada mais fechada e incline menos o tronco para aumentar a ênfase no tríceps.

COSTAS

Remada Curvada

Remada Articulada

Remada Baixa

Remada Serrador

Remada Cavalinho (Remada T)

Puxada (e suas variações)

Voador Invertido

Crucifixo Invertido

Barra Livre

Pull Down

REMADA CURVA COM HALTERES OU BARRA

POSIÇÃO INICIAL

- Faça uma pegada na barra com espaçamento um pouco maior que a largura dos ombros;
- Deixe o tronco inclinando em 45° aproximadamente e os joelhos levemente fletidos.

MOVIMENTO

Traga a barra verticalmente para cima até que ela chegue próximo a parte inferior do peito, mantendo as curvaturas naturais da coluna e mantendo os joelhos levemente fletidos. Logo depois volte a posição inicial com os braços estendidos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior e eretores da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros e flexão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Estender demasiadamente o tronco para trás;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na extensão dos ombros;
3. Estabilize as escapulas durante todo movimento;

REMADA ARTICULADA

POSIÇÃO INICIAL

- Segure o aparelho com os braços estendidos á frente, apoiando o tórax contra a almofada peitoral;
- A pegada das mãos pode variar entre pronada (mãos voltadas para baixo), neutra (mãos voltadas para dentro) e supinada (mãos voltadas para cima).

MOVIMENTO


Realizar um movimento de puxada para trás com os cotovelos, trazendo o aparelho na parte superior do abdome e mantendo a coluna estável. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros e flexão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar o tronco para trás;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na extensão dos ombros;
3. Estabilize as escapulas durante todo movimento;
4. Manter os cotovelos voltados para baixo irá aumentar a o trabalho do latíssimo do dorso

REMADA BAIXA

POSIÇÃO INICIAL

Sentado, segure os pegadores presos aos cabos com os braços estendidos a frente

MOVIMENTO

Traga o pegador na direção do abdome, mantendo a coluna estável e flexionando os cotovelos para trás. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros e flexão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Estender demasiadamente o tronco para trás;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na extensão dos ombros;
3. Estabilize as escapulas durante todo movimento;

REMADA SERRADOR


POSIÇÃO INICIAL

Joelho e mão apoiados no banco e tronco inclinado (deixando a coluna em posição natural). Segure o halter com a mão oposta e deixe o braço totalmente estendido.

OBS.: Este exercício pode ser feito apoiando somente uma das mãos no banco ou qualquer superfície, sem necessidade de apoiar os joelhos contanto que a coluna se mantenha em posição natural.

MOVIMENTO

Movimente o halter verticalmente, elevando o cotovelo até o nível mais alto possível. Após terminar a série, repita o processo para o outro braço.



MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior, e bíceps.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros e flexão de cotovelos



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar pouco o tronco a frente;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na extensão dos ombros;
3. Realize uma adução escapular no final do movimento;
4. Aumente a amplitude de movimento alongando o máximo que conseguir o latíssimo

REMADA CAVALINHO

REMADA COM BARRA EM T

POSIÇÃO INICIAL

- Nessa variação uma das extremidades da barra fica presa a um ponto fixo no solo, com os pés posicionados a cada lado da barra;
- A coluna fica em posição natural e o tronco inclinado em aproximadamente 45°. O joelhos ficam levemente flexionados (e permanecem durante todo o movimento).

OBS.: a diferença para a "remada cavalinho" ou "remada apoiada" é o apoio para o peitoral

MOVIMENTO


Levante a extremidade que contém o peso trazendo os cotovelos para trás e estendendo os ombros. Ao atingir amplitude máxima retome a posição inicial estendendo os cotovelos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, bíceps, trapézio, romboides, deltoide posterior e eretores da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros e flexão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar pouco o tronco a frente;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros.
5. Realizar uma extensão de tronco durante o movimento e não trabalhar adequadamente dorsais e bíceps

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais durante todo o movimento;
2. Focar na extensão dos ombros para maior trabalho de dorsais;
3. Estabilizar as escapulas durante todo movimento.

PUXADA E SUAS VARIAÇÕES

POSIÇÃO INICIAL

Sentado no aparelho, joelhos travados pelo encosto e uma uma pe barra com os braços estend

MOVIMENTO

Puxe a barra até a parte superior do peitoral, contraindo as dorsais e retorne a barra a posição inicial, acima da cabeça.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior, bíceps braquial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução de ombros e flexão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Puxar a barra demasiadamente para baixo até o nível do abdome;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Encolher os ombros durante o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na adução dos ombros;
3. Estabilize as escapulas durante todo o movimento;
4. Faça uma pegada mais aberta na barra para aumentar a ênfase em dorsais

VOADOR INVERTIDO

POSIÇÃO INICIAL

Sente-se de frente para o aparelho com o peitoral apoiado no encosto e segure os pegasores à frente com os braços estendidos (ou cotovelos levemente flexionados) e perpendiculares ao tronco (sem deixar os cotovelos ultrapassarem a linha dos ombros)
OBS.: A pegada pode ser pronada ou neutra.



MOVIMENTO

Faça uma abdução horizontal de ombros mantendo os cotovelos elevados e braços paralelos ao solo durante todo o movimento. Retome a posição inicial, com os puxadores a frente do corpo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Deltoide posterior, romboides, redondo maior.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução horizontal de ombros.

ERROS COMUNS

1. Mãos acima da linha dos ombros;
2. Flexionar o cotovelo durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Hiperextensão lombar

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter cotovelos levemente flexionados durante todo movimento;
2. Aduzir as escapulas ao final do movimento

CRUCIFIXO INVERTIDO

POSIÇÃO INICIAL

Utilizando uma pegada com os polegares para cima ou para o centro, segure os halteres, com braços esticados e fique com o tronco inclinado para frente.

MOVIMENTO

Leve as mãos para trás em um arco até os braços ficarem paralelos ao chão e em um ângulo de 90° com os ombros. Retorne os halteres à posição inicial a frente do corpo

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Deltoide medial e posterior e romboides

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução horizontal de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Realizar uma hiperextensão da lombar;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Realizar movimento com os cotovelos durante a execução

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Aduzir as escapulas ao final do movimento;
3. Manter a posição das mãos do início ao fim do movimento.

BARRA LIVRE

POSIÇÃO INICIAL

Fazendo uma pegada na barra com espaçamento um pouco maior que a largura dos ombros

MOVIMENTO

Trazer a parte superior do peitoral até próxima a barra fixa elevando o corpo e flexionando os cotovelos. Retome a posição inicial sustentando o seu corpo na descida

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior e eretores da espinha

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução dos ombros e flexão de cotovelos



ERROS COMUNS

1. Não sustentar a descida do corpo;
2. Não aduzir as escapulas;
3. Pouca amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na adução dos ombros e da escapula.
3. Realizar pré-aquecimento para musculaturas dorsais.

PULL DOWN

POSIÇÃO INICIAL

Inclinando o tronco a frente em um ângulo de aproximadamente 45° com o chão e joelhos levemente fletidos, segure a polia com as duas mãos com os braços estendidos.

MOVIMENTO


Traga a polia com os braços estendidos até a direção do abdome e retome a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Latíssimo do dorso, trapézio, romboides, deltoide posterior e eretores da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar pouco o tronco a frente;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que extensão de ombros

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na extensão dos ombros;
3. Aduzir as escapulas durante todo movimento;
4. Ultrapassar a linha dos ombros utilizando a corda no pulley

TRÍCEPS

Tríceps Testa

Tríceps Mergulho

Paralela

Apoio Fechado

Supino Fechado

Tríceps Francês

Tríceps Cross Over

Tríceps Polia

Tríceps Coice

TRÍCEPS TESTA

POSIÇÃO INICIAL

- Deitado em um banco horizontal;
- Segure um haltere ou barra com os braços estendidos acima de seu peito;
- Use pegada fechada, com o dorso das mãos voltado para cima, e com as mãos afastadas em aproximadamente na largura dos ombros.

MOVIMENTO

Flexione os cotovelos e abaixe a barra até chegar próximo a testa, Retome a posição inicial até estender todo cotovelo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Tríceps, deltoide.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Mãos muito afastadas;
2. Movimento dos ombros junto com os cotovelos;
3. Pouca amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos na direção dos ombros.

TRÍCEPS MERGULHO

POSIÇÃO INICIAL

- Mãos para trás apoiadas em um banco;
- Seu corpo vai estar estendido a frente como se estivesse sentado com a mão apoiando o corpo.

MOVIMENTO


Impulsione o corpo para cima, estendendo os cotovelos. Retome a posição inicial lentamente abaixando o corpo e flexionando os cotovelos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Tríceps, peitoral, deltoide anterior.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelo + flexão de ombros.



ERROS COMUNS

1. Não conseguir sustentar a posição do corpo;
2. Pouca mobilidade de ombros e um movimento exagerado nessa articulação;
3. Pouca amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos durante o movimento;
3. Trabalho de mobilidade articular dos ombros

FLEXÃO DE BRAÇOS (pegada fechada)

POSIÇÃO INICIAL

- Com os braços estendidos em posição ventral com pernas estendidas;
- Tronco estabilizado.

MOVIMENTO

Descer o corpo em direção ao solo flexionando os cotovelos próximo ao corpo, até que o peitoral fique bem próximo do solo, logo depois estender os cotovelos retomando a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Adução horizontal do ombro e extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Mãos abertas ou fechadas demais;
2. Cotovelos demasiadamente elevados (ombros em um ângulo de 90 graus com o tronco ou acima).
3. Baixa amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma pegada mais aberta para aumentar ênfase no peitoral;
2. Faça uma pegada mais fechada para aumentar a ênfase no tríceps;
3. Controle o movimento para melhorar a qualidade do exercício;
4. Para otimizar a tensão muscular não "trave" os cotovelos no final do movimento.

TRÍCEOS PARALELAS

POSIÇÃO INICIAL

- Mãos na barra paralela;
- Sustentando o corpo com os cotovelos estendidos e bloqueados;
- Corpo levemente inclinado a frente.

MOVIMENTO

Dobre os cotovelos, baixando o tronco até que os braços fiquem paralelos ao chão. Empurre o corpo de volta à posição inicial, isto é, até que os cotovelos fiquem novamente estendidos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Peitoral, tríceps e deltóides (porção frontal).

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelo.



ERROS COMUNS

1. Não inclinar o tronco levemente a frente;
2. Amplitude muito grande de extensão de cotovelos;
3. Baixa amplitude de movimento;
4. Prescrever este exercício para pessoas com falta de mobilidade ou lesão na articulação dos ombros.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça uma adução escapular para maior estabilidade do movimento;
2. Faça uma pegada mais aberta e uma inclinação de tronco maior para aumentar ênfase no peitoral;
3. Faça uma pegada mais fechada e incline menos o tronco para aumentar a ênfase no tríceps.

TRÍCEPS CORDA

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé posicionado a frente de uma polia;
- Com cotovelos a flexionados e segurar a corda presa a uma polia alta.

MOVIMENTO


Com os cotovelos próximos do corpo jogue as mãos para “baixo” e para fora na direção do abdome até que os cotovelos estejam totalmente estendidos. Retome a posição inicial flexionando os cotovelos mantendo a estabilidade dos ombros.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Tríceps Braquial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelos



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Utilize a corda para aumentar ainda mais a amplitude de movimento.

TRÍCEPS FRANCÊS

POSIÇÃO INICIAL

- Sente-se com o tronco reto;
- Segure um haltere ou barra nas duas mãos com os braços estendidos acima da cabeça;
- Utilize a palma das mãos voltadas para cima

MOVIMENTO


Flexione os cotovelos e abaixe o peso por trás da cabeça. Estenda os cotovelos retomando o peso para a posição inicial acima da cabeça.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Tríceps.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Movimento do ombro durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos durante o movimento;
3. Estender ao máximo os cotovelos.

TRÍCEPS PULLEY

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé posicionado a frente de uma polia;
- Com cotovelos a flexionados e segurar o pegador preso a uma polia alta.

MOVIMENTO


Com os cotovelos próximos do corpo jogue as mãos para “baixo” na direção do abdome até que os cotovelos estejam totalmente estendidos. Retome a posição inicial flexionando os cotovelos mantendo a estabilidade dos ombros.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Triceps Braquial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelos.



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento.


TRÍCEPS COICE

POSIÇÃO INICIAL

- Pegue o haltere com uma mão;
- Mantenha seu tronco curvado a frente aproximadamente 90° e apoie-se em um banco

MOVIMENTO

Comece com o braço paralelo ao chão e com o cotovelo flexionado a 90°. Movimente o haltere para cima, estendendo o braço até que ocorra a extensão completa do cotovelo.



MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Tríceps.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de cotovelos



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento.

BÍCEPS

Os ombros são compostos por músculos como o deltoide (dividido em três partes: o anterior (que fica na frente), o lateral e o posterior (que fica na parte de trás) e o manguito rotador, que abrange quatro músculos que formam uma camada de proteção em torno da articulação dos ombros.

O deltoide é responsável por movimentos como o levantamento do braço para a frente, para o lado e para trás.

Já os músculos do manguito rotador são importantes para a estabilidade e força dos ombros, além de levantar o braço para cima e para fora, girar o braço para fora, e fazer a rotação interna do braço, movimento que executamos ao cruzar os braços.

BÍCEPS

Rosca Scott

Rosca Direta

Rosca Concentrada

Rosca Arnold

Rosca Alternada

Rosca Martelo

Rosca Banco Inclínada

Rosca Invertida

ROSCA SCOTT

POSIÇÃO INICIAL

- Sente-se com os braços repousando no banco scott;
- Faça a pegada na barra ou halteres com a palma das mãos para cima e na mesma distância dos ombros.

MOVIMENTO


Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, braquial e braquiorradial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento.

ROSCA DIRETA

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra na frente dos corpos;
- Faça a pegada na barra ou halteres com a palma das mãos para cima e na mesma distância dos ombros.

MOVIMENTO

Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente.



MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, braquial e braquiorradial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Mantenha a coluna estável durante todo o movimento.

ROSCA CONCENTRADA

POSIÇÃO INICIAL

- Sentado em um banco;
- Com os cotovelos apoiados próximo ao seu joelho;
- Com braço estendido segurando um haltere

MOVIMENTO

Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, braquial e braquiorradial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Coluna muito flexionada a frente;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Hiperextensão de cotovelo

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimente apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Mantenha a coluna estável durante todo o movimento

ROSCA ARNOLD

POSIÇÃO INICIAL

Apoie em um banco com os braços ficam estendidos segurando o halter.

MOVIMENTO

Flexione o cotovelo trazendo o halter na direção dos ombros e depois estenda novamente controlando o movimento.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimente apenas o cotovelo durante o movimento.

ROSCA BANCO INCLINADO

POSIÇÃO INICIAL

- Sentado no banco inclinado;
- Com os braços estendidos lateralmente ao corpo.

MOVIMENTO

Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, Braquial e braquiorradial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Mantenha a coluna estável durante todo o movimento.

ROSCA MARTELO

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra na frente dos corpos;
- Faça a pegada neutra na barra ou halteres com a palma das mãos para dentro e na mesma distância dos ombros.

MOVIMENTO


Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, braquial e braquiorradial..

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Cotovelos muito afastados durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimento apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Mantenha a coluna estável durante todo o movimento.

ROSCA INVERTIDA

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra na frente dos corpos;
- Faça a pegada na barra ou halteres com a palma das mãos para baixo e na mesma distância dos ombros

MOVIMENTO

Flexionando os cotovelos, trazendo a barra ou haltere na direção dos ombros. Retome a posição inicial estendendo os cotovelos lentamente.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Bíceps, braquial e braquiorradial.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de cotovelo



ERROS COMUNS

1. Movimento dos ombros durante a execução;
2. Coluna muito flexionada a frente;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Hiperextensão de cotovelo

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo;
3. Movimente apenas o cotovelo durante o movimento;
4. Mantenha a coluna estável durante todo o movimento

OMBRO

Os ombros são compostos por músculos como o deltoide (dividido em três partes: o anterior (que fica na frente), o lateral e o posterior (que fica na parte de trás) e o manguito rotador, que abrange quatro músculos que formam uma camada de proteção em torno da articulação dos ombros.

O deltoide é responsável por movimentos como o levantamento do braço para a frente, para o lado e para trás.

Já os músculos do manguito rotador são importantes para a estabilidade e força dos ombros, além de levantar o braço para cima e para fora, girar o braço para fora, e fazer a rotação interna do braço, movimento que executamos ao cruzar os braços.

OMBRO

Além de ajudar em relação ao fortalecimento, os exercícios para ombros podem contribuir para a definição e hipertrofia ou construção muscular, que são objetivos de alguns praticantes de atividades físicas.

Confira na lista abaixo alguns dos melhores exercícios para ombros. As atividades não estão organizadas em ordem de preferência ou eficiência.

OMBRO

Desenvolvimento
(e suas variações)

Elevação Frontal

Elevação Lateral

Remada Alta

Encolhimento

Rotação Interna

Rotação Externa

DESENVOLVIMENTO

POSIÇÃO INICIAL

Sentado em um banco ou em pé comece com os halteres no nível dos ombros com a palma das mãos para frente ou para dentro.

MOVIMENTO

Eleve os halteres verticalmente para cima até que os cotovelos estejam estendidos, abaixe os halteres de volta até a posição inicial.



MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Deltoides, tríceps, trapézio e peitoral nível clavicular.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução dos ombros com extensão de cotovelos



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna ;
2. Grande rotação externa de ombros;
3. Pouca amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Realizar uma leve flexão de ombros para passar para o plano escapular;
3. Pode ser realizada a pegada neutra para realização do movimento.

ELEVAÇÃO FRONTAL

POSIÇÃO INICIAL

• Em pé com os braços para baixo segurando uma barra ou halteres na frente do corpo.

MOVIMENTO

Levante os braços para a frente do corpo até que a barra ou halteres atinjam aproximadamente 80°. Abaixar a barra ou os halteres de volta até a linha do quadril.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Deltoide, Peitoral e Trapézio.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar o tronco para trás;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Maior flexão de cotovelo do que flexão de ombros

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na flexão dos ombros;
3. Elevar a barra ou halter até aproximadamente 80°;
4. Pode ser realizado sentado em um banco também, ou no cabo do cross over ou com barra ou anilha.

ELEVAÇÃO LATERAL

POSIÇÃO INICIAL

Em pé com os braços para baixo segurando halteres.

MOVIMENTO


Levante os braços para o lado do corpo seguindo o plano escapular até que os halteres atinjam aproximadamente 80°. Abaixе os halteres de volta até a linha do quadril.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Deltóides
(principalmente região medial)

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar muito os cotovelos;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Realizar uma rotação externa na hora do movimento;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Focar na abdução dos ombros no plano escapular;
3. Mantenha os cotovelos em semi flexão durante todo movimento;
4. Evite ultrapassar a linha dos ombros devido a possibilidade de gerar síndrome do impacto na articulação.

REMADA ALTA

POSIÇÃO INICIAL

- Segure a barra ou halteres com afastamento um pouco maior que a distância entre os ombros;
- Faça uma pegada pronada com as mãos voltadas para o seu corpo.

MOVIMENTO


Eleve a barra verticalmente para cima até que os cotovelos cheguem próximos a 90° em relação aos ombros. Retome a posição abaixando lentamente a barra até que os braços fiquem estendidos.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Trapézio, deltoides e bíceps.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução do ombro com flexão de cotovelos e elevação das escapulas.



ERROS COMUNS

1. Ultrapassar as linhas do ombro com os cotovelos.
2. Pouca amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Afastar mais as mãos para que não haja impactação no ombro;
3. Controle todo o movimento, principalmente a fase excêntrica

ENCOLHIMENTO

POSIÇÃO INICIAL

• Segure um haltere ou barra com os braços estendidos à frente do corpo utilizando pegada com a distancia um pouco maior que a linha dos ombros.

MOVIMENTO


Mantendo os braços estendidos, encolha os ombros até o ponto mais alto trazendo a barra em um movimento vertical para cima. Retome a posição lentamente até a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Trapézio, levantador da escápula, deltoide, eretor da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Elevação das escápulas.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Flexionar o tronco muito para trás;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Flexionar os cotovelos durante o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Controlar todo o movimento e fazer numa cadência mais lenta;
3. Deixe a carga fazer o alongamento da musculatura na fase excêntrica.

ROTAÇÃO EXTERNA

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé posicionado ao lado de uma polia ajustada na direção das mãos;
- Com cotovelos a 90 graus, segure o pegador com o polegar para cima, iniciando próximo a cicatriz umbilical.

MOVIMENTO

Com os cotovelos presos ao lado do corpo movimente o braço “fora” do corpo trazendo as mãos até a linha dos ombros, retome lentamente a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Infra espinhal, Redondo menor, deltoide posterior.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Rotação externa de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Movimento do cotovelo durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Ombros realizam abdução junto com a rotação;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos grudados ao corpo;
3. Movimento apenas do ombro em rotação.

ROTAÇÃO INTERNA

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé, posicionado ao lado de uma polia ajustada na direção das mãos;
- Cotovelos a 90°, segure o pegador com o polegar para cima.

MOVIMENTO

Flexione os cotovelos e abaixe a barra até chegar próximo a testa, Retome a posição inicial até estender todo cotovelo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Subescapular e peitoral maior.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Rotação interna de ombros.



ERROS COMUNS

1. Perder as curvaturas naturais da coluna;
2. Movimento do cotovelo durante o movimento;
3. Pouca amplitude de movimento;
4. Ombros realizam abdução junto com a rotação;

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos grudados ao corpo;
3. Movimento apenas do ombro em rotação

AGACHAMENTO

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra apoiada nos ombros;
- Pés afastados aproximadamente na largura dos ombros.

MOVIMENTO

Flexione lentamente os joelhos e quadril até que os joelhos cheguem a aproximadamente 90°. Estenda as pernas para retornar à posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps,
Glúteos e isquiotibiais.



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho e quadril.

ERROS COMUNS

1. Realizar movimentos com pés juntos;
2. Flexionar muito o troco a frente;
3. Amplitude exagerada sem o aluno ter mobilidade suficiente;
4. Valgo dinâmico (adução do quadril acentuada durante o movimento);
5. Mantenha a coluna sempre ereta e rígida durante o movimento;
6. Não restrinja o movimento dos joelhos (ex.: não deixar passar da ponta dos pés).

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril e tornozelo antes do treino;
2. Ao Retomar a posição inicial coloque a força no calcanhar, mas sem tirar a ponta dos pés do chão;
3. Mantenha sempre joelhos na direção do segundo dedo do pé;
4. Mantenha os cotovelos para baixo durante o movimento;
5. Respeite a biomecânica do aluno: não existe um movimento padrão para todos os alunos. Uns vão se sentir mais seguros e a vontade com a base mais aberta e outros mais fechada. Uns vão se sentir mais a vontade com flexão de tronco mais acentuada e outros menos acentuada. Contanto que respeite a biomecânica básica,

LEG 180

POSIÇÃO INICIAL

- Sente-se no aparelho;
- Coloque os pés com afastamento na plataforma mais ou menos na largura dos ombros.

MOVIMENTO

Empurre a plataforma e estenda os joelhos sem realizar uma hiperextensão (travar os joelhos). Controle a plataforma de volta a posição inicial, onde os joelhos ficam em aproximadamente 90° de flexão.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps,
Glúteos e isquiotibiais.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho e quadril.



ERROS COMUNS

1. Realizar movimentos com pés juntos;
2. Hiperextensão do joelho;
3. Amplitude exagerada sem o aluno ter mobilidade suficiente;
4. Valgo dinâmico (adução do quadril acentuada durante o movimento).

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril e tornozelo antes do treino;
2. Ao Retomar a posição inicial coloque a força no calcanhar, mas sem tirar a ponta dos pés do chão;
3. Mantenha sempre joelhos na direção do segundo dedo do pé;
4. Mantenha cabeça, coluna e quadril apoiado

LEG 45

POSIÇÃO INICIAL

- Sente-se no aparelho;
- Coloque os pés com afastamento na plataforma mais ou menos na largura dos ombros.

MOVIMENTO

Deixe a plataforma descer, até que os joelhos estejam aproximadamente com 90° de flexão, logo depois empurre de volta estendendo as pernas.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps, Glúteos e isquiotibiais.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho e quadril.



ERROS COMUNS

1. Realizar movimentos com pés juntos;
2. Não deixar as costas apoiada no banco durante todo o movimento;
3. Amplitude exagerada sem o aluno ter mobilidade suficiente;
4. Valgo dinâmico (adução do quadril acentuada durante o movimento)

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril e tornozelo antes do treino;
2. Empurre a plataforma direcionando a força para o calcanhar, porém sem tirar a ponta dos pés do chão;
3. Mantenha sempre joelhos na direção do segundo dedo do pé;
4. Utilize os apoiadores dos braços para manter o corpo em contato com o banco durante todo o movimento.

AVANÇO

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra apoiada nos ombros;
- Pés afastados aproximadamente na largura dos ombros

MOVIMENTO

Dê um passo para frente e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90° (deixando a coxa paralela ao solo). Retome à posição inicial e repita utilizando a outra perna.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps, glúteos e isquiotibiais.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho e quadril.



ERROS COMUNS

1. Não fixar o pé da frente no solo;
2. Passada curta ou ampla demais;
3. Falta de equilíbrio do aluno;
4. Valgo dinâmico

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril, joelho e tornozelo antes do treino;
2. Logo depois de dar a passada a frente, faça força com os calcanhares para retornar à posição inicial;
3. Mantenha sempre joelhos na direção do segundo dedo do pé;
4. Mantenha os músculos do core ativados para maior estabilidade no movimento

EXTENSORA

POSIÇÃO INICIAL

Sentado no aparelho e com os pés por trás do apoio (na altura do tornozelo).

OBS.: ajuste o apoio de maneira confortável para o aluno

MOVIMENTO

Levante as pernas até que os joelhos estejam totalmente estendidos e então retorne a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps.



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho.

ERROS COMUNS

1. Realizar o movimento com os pés juntos ou afastados demais.
2. Deixar o tronco demasiadamente estendido (tronco inclinado para trás) ou flexionado (tronco inclinado para frente) durante o movimento;
3. Regular encosto das costas e pernas de forma desconfortável para o aluno.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Ajustes adequadamente a máquina de maneira confortável para o aluno;
2. O apoio das pernas deve se posicionar no tornozelo (entre o pé e a canela).
3. Mantenha o corpo apoiado no aparelho durante todo movimento

CADEIRA ABDUTORA

POSIÇÃO INICIAL

Sentado no aparelho com os joelhos flexionados e pés juntos.

MOVIMENTO

Levante as pernas até que os joelhos estejam totalmente estendidos e então retorne a posRealize a abertura das pernas fazendo força no apoio que fica próximo aos joelhos. Retome a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Glúteos (médio e mínimo)..

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Abdução de quadril.



ERROS COMUNS

1. Não ficar apoiado adequadamente no aparelho durante o movimento;
2. Ajuste errado do banco;
3. Usar os braços como auxílio no movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril antes do treino;
2. Contraia os glúteos durante todo o movimento

RECUO

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé com halteres ou barra apoiada nos ombros;
- Pés afastados aproximadamente na largura dos ombros

MOVIMENTO

Dê um passo para trás e flexione os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90° (deixando a coxa paralela ao solo). Retorne à posição inicial e repita utilizando a outra perna.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Quadríceps, glúteos e isquiotibiais

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de joelho e quadril.



ERROS COMUNS

1. Não fixar o pé da frente no solo;
2. Passada curta ou ampla demais;
3. Falta de equilíbrio do aluno;
4. Valgo dinâmico

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril, joelho e tornozelo antes do treino;
2. Logo depois de dar a passada a frente, faça força com os calcanhares para retornar à posição inicial;
3. Mantenha sempre joelhos na direção do segundo dedo do pé;
4. Mantenha os músculos do core ativados para maior estabilidade no movimento

STIFF

POSIÇÃO INICIAL

Faça uma pegada com afastamento igual à largura dos ombros, braços totalmente estendidos, tronco e quadril flexionados (posição agachado) e joelhos totalmente estendidos ou levemente flexionados (que deverão ficar por todo movimento).

MOVIMENTO

Mantendo a coluna em posição natural (ereta) e os cotovelos estendidos, estenda o tronco e fique em pé levantando a barra até o nível do quadril. Lentamente volte a barra a posição inicial sem flexionar os joelhos.



MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Glúteos, isquiotibiais, quadríceps e eretores da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de quadril.

ERROS COMUNS

1. Realizar movimentos com pés demasiadamente aproximados;
2. Flexionar demasiadamente os joelhos;
3. Amplitude exagerada sem o aluno ter mobilidade suficiente;
4. Não manter as curvaturas naturais da coluna

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril, joelho e tornozelo antes do treino;
2. Comece o movimento realizando força com o quadril e sem flexionar os joelhos durante o movimento;
3. Mantenha sempre os cotovelos estendidos;
4. Mantenha sempre uma contração voluntária dos músculos do core e dos glúteos;

CADEIRA FLEXORA

POSIÇÃO INICIAL

Sentado no banco com os pés por cima do apoio das pernas e as coxas por baixo do apoio dos joelhos.

MOVIMENTO


Flexione o joelho contra o apoio dos pés e retorne a posição inicial.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Isquiotibiais e gastrocnêmicos.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de joelhos.



ERROS COMUNS

1. Hiperextensão de joelhos;
2. Regulagem errada do banco;
3. Corpo se deslocar da posição ao realizar o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Para aumento do trabalho dos isquiotibiais realize uma flexão plantar durante a flexão de joelho;
2. Mantenha-se fixo e apoiado no banco durante todo movimento.

GOOD MORNING

POSIÇÃO INICIAL

Fique em pé em uma posição ereta com uma barra apoiada nos ombros .

MOVIMENTO

Mantendo a coluna em posição natural e joelhos estendidos, incline o corpo a frente até que o tronco esteja um pouco acima da posição paralela ao solo. Retome o tronco a posição neutra

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Glúteos, isquiotibiais e eretor da espinha

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Flexionar a coluna durante o movimento;
2. Flexionar os joelhos durante o movimento;
3. Amplitude exagerada sem o aluno ter mobilidade suficiente;
4. Não manter as curvaturas naturais da coluna

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Realize um movimento de mobilidade articular de quadril, joelho e tornozelo antes do treino;
2. Comece o movimento realizando a força com o quadril;
3. Mantenha sempre os glúteos e músculos do core contraídos

FLEXORA EM PÉ

POSIÇÃO INICIAL

De pé com os pés por trás do apoio que fica próximo ao calcanhar.

MOVIMENTO

Flexione o joelho e retome a posição inicial controlando o movimento

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Isquiotibiais e gastrocnêmios.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de joelhos. .



ERROS COMUNS

1. Hiperextensão de joelhos;
2. Se posicionar errado no aparelho;
3. Hiperextensão lombar durante o movimento;
4. Não manter as curvaturas naturais da coluna

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Caso queira aumentar o trabalho dos isquiotibiais realize uma flexão plantar;
2. Mantenha-se com a coluna em posição natural durante todo movimento.

EXTENSÃO DE QUADRIL

POSIÇÃO INICIAL

Deitado no solo com os joelhos flexionados, pés apoiados no chão e joelhos afastados na largura do quadril (posição de 4 apoios).

MOVIMENTO

Faça uma extensão de quadril até que a coxa esteja alinhada com o tronco e retome a posição inicial controlando a descida.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Glúteos e isquiotibiais e eretor da espinha.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Extensão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Realizar os movimentos com os joelhos demasiadamente próximos;
2. Hiperextensão da coluna lombar;
3. Não manter as curvaturas naturais da coluna.
4. Rotacionar o quadril durante o movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça a força nos calcanhares ao elevar o quadril;
2. Mantenha sempre uma contração voluntária de músculos do core e glúteos.
3. Estenda a os joelhos para aumentar a força exigida pelos glúteos.
4. Faça o exercício em um banco apropriado para aumentar a amplitude de movimento.
5. Utilize faixas elásticas para aumentar a tensão

PANTURRILHA SENTADO

POSIÇÃO INICIAL

Sentado na plataforma posicione os pés no aparelho e a região próxima aos joelhos abaixo da almofada.

MOVIMENTO


Levantando os calcanhares até o ponto mais alto e volte a posição inicial lentamente com máximo de amplitude possível.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Sóleo e gastrocnêmios.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão plantar.



ERROS COMUNS

1. Movimento pendular;
2. Baixa amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça o exercício com uma cadência reduzida para evitar movimento elástico do tendão de aquiles

PANTURRILHA EM PÉ

POSIÇÃO INICIAL

- Em pé na plataforma ou de frente para parede;
- Posicione os pés no aparelho com a sobrecarga sobre os ombros.

MOVIMENTO

Levantando os calcanhares até o ponto mais alto e volte a posição inicial lentamente com máximo de amplitude possível

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Sóleo e gastrocnêmios.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão plantar.



ERROS COMUNS

1. Movimento pendular;
2. Baixa amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça o exercício com uma cadência reduzida para evitar movimento elástico do tendão de aquiles

PANTURRILHA NO LEG PRESS

POSIÇÃO INICIAL

- No aparelho de Leg Press com a ponta dos pés no aparelho e joelhos estendidos..

MOVIMENTO

Levantando os calcanhares até o ponto mais alto e volte a posição inicial lentamente com máximo de amplitude possível..

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Sóleo e gastrocnêmios.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão plantar.



ERROS COMUNS

1. Movimento pendular;
2. Baixa amplitude de movimento

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça o exercício com uma cadênça reduzida para evitar movimento elástico do tendão de aquiles

ABDOMINAL PEDALADA

POSIÇÃO INICIAL

Deite-se no chão, com as pernas flexionadas e mãos atrás da cabeça.

MOVIMENTO

Flexionando o tronco tente tocar o joelho direito com o cotovelo esquerdo a flexionando junto o quadril. Faça o movimento cada vez com um lado.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal, infra do abdome, reto femoral, oblíquos.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de tronco e flexão de quadril.



ERROS COMUNS

11. Pouca amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais

ABDOMINAL REMADOR

POSIÇÃO INICIAL

Deite-se no chão, com as pernas e braços estendidos.

MOVIMENTO

Flexionando o tronco a frente abrace os joelhos que serão flexionados junto com o quadril durante o movimento sem retirar os pés completamente do solo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal, infra do abdome, reto femoral, oblíquos.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de tronco e flexão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Pouca amplitude de movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais

ABDOMINAL INFRA

POSIÇÃO INICIAL

Deite-se no chão, com as pernas estendidas.

MOVIMENTO

Flexionando o quadril, elevando as pernas e retomando a posição inicial sem tocar o solo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal e oblíquos e flexores do quadril

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Baixa amplitude de movimento;
2. Não tirar o quadril do solo.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Faça variações do movimento com os joelhos flexionados;
2. Utilize caneleiras como sobrecarga.

ABDOMINAL CRUNCH

POSIÇÃO INICIAL

Deitado com os pés elevados ou apoiados em um banco a cerca de 90° de flexão de quadril

MOVIMENTO

Eleve o tronco para cima na máxima amplitude sem retirar os glúteos do solo, retome lentamente para a posição inicial..

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto do Abdome..

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de tronco.



ERROS COMUNS

1. Movimento em arranco;
2. Não flexionar o tronco.
3. Puxar o pescoço com as mãos.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Utilize anilhas ou halteres atrás da cabeça para aumentar a sobrecarga;
2. Mantenha o olhar sempre para cima para evitar movimentos inapropriados.

ABDOMINAL INFRA SUSPENSO

POSIÇÃO INICIAL

Apoiado na barra paralela com as pernas estendidas.

MOVIMENTO

Flexionando o quadril, elevando as pernas até formar um ângulo de 90 graus e retomando a posição inicial lentamente.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal e oblíquos e flexores do quadril.

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Não elevar o quadril no final do movimento.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Comece com os joelhos flexionados e depois faça com os joelhos estendidos para maior sobrecarga

ABDOMINAL LATERAL

POSIÇÃO INICIAL

Deite-se no chão lateralmente com quadril flexionado a frente.

MOVIMENTO

Flexionando o tronco lateralmente o máximo que conseguir.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal e oblíquos

MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão lateral do tronco.



ERROS COMUNS

1. Não realizar o movimento lateral do tronco e realizar apenas com braços e pernas.

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Tente encostar o cotovelo nos joelhos;
2. Foco na região oblíqua do abdômen.

ABDOMINAL EM V

POSIÇÃO INICIAL

Deite-se no chão, com as pernas e braços estendidos..

MOVIMENTO

Flexionando o tronco tente tocar a ponta dos pés com a ponta dos dedos flexionando junto o quadril.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Reto abdominal, infra do abdome, reto femoral, oblíquos.



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Flexão de tronco e flexão de quadril.



ERROS COMUNS

1. Pouca amplitude de movimento
2. Realizar o exercício sem ter um core e abdômen bem fortalecido

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Flexionar bem o tronco para gerar a contração abdominal

PRANCHA LATERAL

POSIÇÃO INICIAL

- Em posição lateral com os cotovelos flexionados e apoiados no solo;
- Corpo estendido mantendo as curvaturas naturais da coluna com quadril elevado

MOVIMENTO

Devemos manter a coluna direita (coluna neutra) em toda a amplitude de movimento. Os músculos abdominais estabilizam o tórax a partir do topo, e a pélvis a partir do fundo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Músculos do Core.



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Músculos do Core e glúteos.



ERROS COMUNS

1. Movimento do corpo durante o movimento
2. Perder as curvaturas naturais da coluna

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo.

PRANCHA VENTRAL

POSIÇÃO INICIAL

Em posição ventral com os cotovelos flexionados e corpo estendido mantendo as curvaturas naturais da coluna com quadril elevado

MOVIMENTO

Devemos manter a coluna direita (coluna neutra) em toda a amplitude de movimento. Os músculos abdominais estabilizam o tórax a partir do topo, e a pélvis a partir do fundo.

MUSCULATURAS ENVOLVIDAS

Músculos do Core.



MOVIMENTOS CINECIOLÓGICOS

Estabilização de tronco em posição ventral.



ERROS COMUNS

1. Movimento do corpo durante o movimento
2. Perder as curvaturas naturais da coluna

DICAS DE OTIMIZAÇÃO

1. Manter a contração dos músculos abdominais;
2. Manter os cotovelos próximos ao corpo.

