

METHODOLOGIE DE LA COINTEGRATION

Section 1 : Recherche d'une éventuelle saisonnalité

Etude du graphique de l'ACF

par TSP

Section 2 : Etude graphique : moyenne et trend

La procédure est la suivante :

- 1) on va faire des graphiques des variables sous forme de séries temporelles,
- 2) pour chaque variable on va essayer de déterminer visuellement (ou par ols en régressant la variable sur la constante et le trend)

- si la série semble fluctuer autour de la moyenne nulle, auquel cas on utilisera le **TEST DF PAS DE CSTE NI TREND** ie test DF1

- si la série semble fluctuer autour de la moyenne non nulle, auquel cas on utilisera le **TEST DF AVEC CSTE PAS TREND** ie test DF2

- si la série semble fluctuer autour d'une tendance linéaire, auquel cas on utilisera le **TEST DF AVEC CSTE ET TREND** ie test DF3

Rappels test DF et ADF

Il existe 3 sortes de tests DF :

TEST DF1 : pas de constante pas de TREND

TEST DF2 : avec constante pas de TREND

TEST DF3 : avec constante et TREND

Formellement nous écrivons les tests de la manière suivante :

$$\Delta \mathbf{y}_t = \gamma \mathbf{y}_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{DF1}$$

$$\Delta \mathbf{y}_t = \alpha + \gamma \mathbf{y}_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{DF2}$$

$$\Delta \mathbf{y}_t = \alpha + \gamma \mathbf{y}_{t-1} + \lambda \mathbf{T} + \varepsilon_t \quad \text{DF3}$$

Le test se présente sous les formes équivalentes suivantes :

$$\mathbf{y}_t = \rho \mathbf{y}_{t-1} + \varepsilon_t \quad \Delta \mathbf{y}_t = \gamma \mathbf{y}_{t-1} + \varepsilon_t$$

On teste alors :

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 : \rho = 1 \\ \mathbf{H}_1 : \rho < 1 \end{cases} \quad \text{ou de même} \quad \begin{cases} \mathbf{H}_0 : \gamma = 0 \\ \mathbf{H}_1 : \gamma < 0 \end{cases}$$

Si on accepte H_0 alors la série est **non stationnaire**

Si on accepte H_1 alors la série est **stationnaire**

Pour faire ces tests il faut utiliser les tables tabulées par Dickey-Fuller (et non les tables de la loi normale ou de Student).

Si le T-ratio trouvé < Seuil Critique \Rightarrow on accepte H_1

Si le T-ratio trouvé > Seuil Critique \Rightarrow on accepte H_0

➤ Les tests de Dickey-Fuller (DF) :

Ce sont des tests paramétriques composés de la forme :

$$\begin{cases} H_0 : \phi_1 = 1 & \text{(pas stationnaire)} \\ H_1 : |\phi_1| < 1 \end{cases}$$

Que l'on applique dans les trois modèles suivants :

$$[1] X_t = \phi_1 X_{t-1} + \varepsilon_t \quad \text{(DS sans dérive)}$$

$$[2] X_t = \phi_1 X_{t-1} + \text{cste} + \varepsilon_t \quad \text{(DS avec dérive)}$$

$$[3] X_t = \phi_1 X_{t-1} + \text{cste} + b^*t + \varepsilon_t \quad \text{(TS)}$$

Si H_0 est vérifiée alors la série X_t n'est pas stationnaire (i.e. il existe une racine unitaire) quel que soit le modèle. Pour des raisons statistiques le T-ratio calculé pour ϕ_1 n'est plus comparé au t_α lu dans une normale (0,1) (ou Student) mais dans des tables spéciales tabulées par Dickey-Fuller (voir infra). Si T-ratio $> t_\alpha$ alors on accepte H_0 .

Dans le modèle [3] si b est significativement différent de zéro ($|T\text{-ratio}| > t_\alpha$; t_α lu dans une loi normale traditionnelle ou Student) alors on a affaire à un processus TS.

Dans le modèle [2] si cste est significativement différent de zéro, on a affaire à un modèle DS avec dérive.

➤ Les tests de Dickey-Fuller augmentés (ADF) :

Les tests ADF supposent que les résidus ne sont plus des bruits blancs mais soient autocorrélés. Ces tests se déroulent de manière similaire aux tests DF (seules les tables statistiques sont différentes) pour les modèles suivants :


$$[1'] \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum \phi_j \Delta X_{t-j+1} + \varepsilon_t$$

$$[2'] \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum \phi_j \Delta X_{t-j+1} + \text{cste} + \varepsilon_t$$

$$[3'] \Delta X_t = \rho X_{t-1} - \sum \phi_j \Delta X_{t-j+1} + \text{cste} + b^*t + \varepsilon_t$$


Section 3 : Etude de la stationnarité (propriété) des variables-Tests de racines unitaires : étude univariée par EVIEWS 7.0

TEST DF :



The 'Unit Root Test' dialog box in EViews 7.0 is shown. The 'Test type' is set to 'Augmented Dickey-Fuller'. Under 'Test for unit root in', the 'Level' option is selected. Under 'Include in test equation', the 'Trend and intercept' option is selected. Under 'Lag length', the 'User specified' option is selected with a value of 1. The 'Maximum lags' is set to 10. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

TEST ADF retards de 4 :



The 'Unit Root Test' dialog box in EViews 7.0 is shown. The 'Test type' is set to 'Augmented Dickey-Fuller'. Under 'Test for unit root in', the 'Level' option is selected. Under 'Include in test equation', the 'Trend and intercept' option is selected. Under 'Lag length', the 'User specified' option is selected with a value of 4. The 'Maximum lags' is set to 10. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

NB : les tests ADF sont plus puissants que les tests DF

TEST Phillips-Perron :

C'est un test alternatif au test ADF. Pour des raisons purement statistiques (il n'y a pas d'ajout de régresseurs supplémentaires) ces tests sont plus puissants que les tests ADF

The screenshot shows the 'Unit Root Test' dialog box with the following settings:

- Test type:** Phillips-Perron
- Test for unit root in:** ☒ Level, ☐ 1st difference, ☐ 2nd difference
- Spectral estimation method:** Default (Bartlett kernel)
- Bandwidth:** ☒ Automatic selection: Newey-West Bandwidth, ☐ User specified: 3
- Include in test equation:** ☐ Intercept, ☒ Trend and intercept, ☐ None

Buttons: OK, Cancel

TEST KPSS :

The screenshot shows the 'Unit Root Test' dialog box with the following settings:

- Test type:** Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
- Test for unit root in:** ☒ Level, ☐ 1st difference, ☐ 2nd difference
- Spectral estimation method:** Default (Bartlett kernel)
- Bandwidth:** ☐ Automatic selection: Andrews Bandwidth, ☒ User specified: 3
- Include in test equation:** ☐ Intercept, ☒ Trend and intercept, ☐ None

Buttons: OK, Cancel

Si la valeur du test (DF-ADF-PP) > au seuil critique alors la série est non stationnaire, on accepte H0

Si la valeur du test (KPSS) > au seuil critique alors la série est non stationnaire, on accepte H1

Rappel du cours : **pour DF ADF PP**, on doit tester l'assertion suivante :

H_0 : il y a une racine unitaire (pas stationnarité)

H_1 : il n'y a pas de racine unitaire (stationnarité) au seuil α

On calcule les tests DF et ADF, PP....La procédure des tests est la suivante :

Si $TR < \text{seuil critique}$ on accepte H_1

Si $TR > \text{seuil critique}$ on accepte H_0 .

NB : on ne prend pas les TR (T-Ratio) en valeur absolue (ici ce ne sont pas des tests de significativité)

Rappel du cours : **POUR LE TEST KPSS**

Attention c'est l'inverse !!!

H_0 : IL Y A STATIONNARITE

H_1 : IL N'Y A PAS STATIONNARITE au seuil α

On calcule les tests. La procédure des tests est la suivante :

Si $TR < \text{seuil critique}$ on accepte H_0

Si $TR > \text{seuil critique}$ on REFUSE H_0 (et donc on accepte H_1)

Sur TSP :

☞ **Test de racine unitaire :**

si $PV > .05 \Rightarrow I(1)$

☞ **Test de cointégration :**
cointégrées

si $PV < .05 \Rightarrow \text{les variables sont}$

En pratique la démarche est la suivante :

1) Variable en niveau : Y . On fait les tests :

- Si Y est $I(0)$ on arrête (la série est stationnaire en niveau)
- Si Y est $I(1)$ on passe en différence 1 :

2) Variable en différence 1 : ΔY . On fait les tests :

- Si ΔY est $I(0)$ on arrête (la série est stationnaire en différence 1)
- Si ΔY est $I(1)$ on passe en différence 2 :

3) Variable en différence 2 : $\Delta\Delta Y$. On fait les tests :

- Si $\Delta\Delta Y$ est $I(0)$ on arrête (la série est stationnaire en différence 2)
- Si $\Delta\Delta Y$ est $I(1)$: impossible en économie, il faudrait passer en différence 3 et pour l'instant nous ne connaissons pas de série $I(3)$.

Les différentes méthodes pour déterminer les retards pour le test ADF

- 1) On cherche sur l'ACF de la série dY (ou DDy) le nombre de retards qui sort de l'intervalle de confiance,
- 2) On choisit le nombre de retards qui minimise le critère AIC,
- 3) On élimine les retards non significatifs (tests de Fisher ou t-ratio),

Section 4. La cointégration (entre 2 variables)

4.1. Définition

En règle générale des variables non stationnaires ne doivent pas être utilisées dans un modèle de régression, nous obtenons alors des régressions « spurious », factices.

Toutefois il y a une exception à cette règle : si y et x sont deux variables non stationnaires d'ordre $I(1)$ alors toutes combinaisons linéaires, par exemple $[\epsilon_t = y_t - \beta_1 - \beta_2 x_t]$ doivent aussi être $I(1)$.

Toutefois il peut y avoir un cas particulier : quand la combinaison $\epsilon_t = y_t - \beta_1 - \beta_2 x_t$ est $I(0)$. Dans ce cas on dit alors que y et x sont cointégrées.

4.2. Test de cointégration

Pour savoir si y et x sont cointégrées il suffit de tester si les résidus $(\epsilon_t = y_t - \beta_1 - \beta_2 x_t)$ sont stationnaires en utilisant les tests :

- 1) **DF** de la forme $\Delta \hat{\epsilon}_t = \gamma \hat{\epsilon}_{t-1} + e_t$
- 2) **ADF** de la forme $\Delta \hat{\epsilon}_t = \gamma \hat{\epsilon}_{t-1} + \sum_{s=1}^m a_s \Delta \hat{\epsilon}_{t-s} + e_t$
- 3) pp
- 4) KPSS

De ce fait un test de cointégration est un test de stationnarité des résidus :

- Si les résidus sont stationnaires alors y et x sont dit coïntégrées,
- Dans le cas contraire (résidus non stationnaires) alors y et x sont non coïntégrées et toutes les relations que l'on peut trouver entre elles sont factices.

4.3. Résumé de la méthode

1) On estime par OLS une relation (dite de long terme) entre les variables, par exemple :

$$\hat{y}_t = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_t$$

2) On sauvegarde les résidus

3) On va faire des tests DF, ADF, pp et KPSS sur les résidus.

Sur EVIEWS :

- 1) on estime la relation $y=ax+b$
- 2) dans la fenêtre où se trouve l'équation estimée on va dans PROCS puis on choisit MAKE RESIDUAL SERIES. On donne un nom à cette série
- 3) On fait les tests DF-ADF...Si la série des résidus est stationnaire on a une relation de coïntégration (entre les variables de la relation 1)).
- 4) on va pouvoir alors utiliser la méthode d'estimation en deux étapes de Engle et Granger cf. annexe I.

Les tests se présentent sous la forme :

H_0 : Les séries ne sont pas cointégrées i.e. les résidus sont non stationnaires

H_1 : Les séries sont cointégrées i.e. les résidus sont stationnaires

La procédure du test est la suivante :

Si le T-ratio trouvé < Seuil Critique \Rightarrow on accepte H_1

ANNEXE 1

On présente la méthode d'estimation en deux étapes de systèmes coïntégrés d'ordre (1,1)¹ proposée par Engle et Granger en 1987. Il s'agit d'estimer dans une première étape les paramètres du vecteur coïntégrant puis, dans une deuxième étape, d'utiliser ceux-ci dans un modèle à correcteur d'erreurs. En d'autres termes, cette méthode consiste à estimer d'une part une équation statique de long terme et d'autre part une équation de court terme c'est à dire la spécification ECM. Sur le plan statistique on peut démontrer que les OLS fournissent une estimation convergente du paramètre coïntégrant. De même que l'estimateur des OLS de l'équation à ECM obtenu en utilisant la valeur estimée du paramètre coïntégrant est convergent et asymptotiquement équivalent à l'estimateur du maximum de vraisemblance qui utilise la vraie valeur du paramètre coïntégrant. En pratique on peut exposer la méthode comme suit :

↳ Etape n°1 : on estime l'équation de long terme :

$$Y_t = \text{cste} + a X_t + \varepsilon_t$$

On sauvegarde les résidus de cette équation (par exemple RES)

↳ Etape n°2 : on estime l'équation de court terme :

$$\sum a_i' \Delta Y_{t-i} = \text{cste} + \sum b_i' \Delta X_{t-i} + c \text{ RES}_{t-1}$$

¹ Seulement pour deux variables I(1). Pour d'autres ordres d'intégration il n'y a aucune méthode.

Cette dernière étape n'est pas automatique. Il faut en fait vérifier s'il existe réellement une relation de coïntégration entre les variables. Pour cela des tests de coïntégration sont appliqués sur l'équation de la première étape. Si les tests indiquent l'existence d'une relation de coïntégration alors, et seulement dans ce cas, on peut passer à la deuxième étape. Dans le cas contraire on arrête la procédure et on estime la relation par les ECM traditionnels.

Section 5 : Etude multivariée (test de Johansen)

Nombre de variable k (nombre de variables endogènes) > 2 .

Pour 3 (k) variables il ne peut y avoir que 2 ($k-1$) relations de coïntégration.

Il existe 2 tests :

- le test de la trace
- le test de la valeur propre (maximale)

Les hypothèses du test de la trace sont :

Méthodologie :

- rechercher la présence ou non de la constante, du trend...(déjà fait plus haut)
- effectuer le test de la trace (fait par le logiciel)
- Interpréter le test :

Si trace (valeur propre) $<$ valeur critique \Rightarrow on refuse H_0

De même si prob $> .05$ on refuse H_0

Si