



**MOŻ NA
ZWARIOWAĆ**

i żyć normalnie!

Przewodnik Fundacji Można Zwariować
po wybranych zaburzeniach psychicznych.

W dzisiejszym świecie życie z chorobą lub zaburzeniami psychicznymi jest codziennością.

Ludzie nie wiedzą, jak dużo jest takich osób i że wbrew pozorom żyją one normalnie z tym problemem - podejmując odpowiednie leczenie, udając się do lekarza specjalisty i otrzymując pomoc od wykwalifikowanych osób.

Kampania społeczna “Można Zwariować i żyć normalnie” ma zachęcić do “coming outów”, czyli pozbycia się wstydu i przyznania się - przed samym sobą, rodziną, światem lub tylko przed lekarzem specjalistą do swoich problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. To zawsze jest pierwszy krok do zdrowia!

Choć możesz nawet o tym nie wiedzieć, Twoja otwartość może wesprzeć też osobę, dla której diagnoza to nowy i trudny temat.

Co czwarty Polak lub Polka w czasie dorosłego życia miał, ma lub będzie mieć jakąś formę zaburzeń psychicznych, a depresja w najbliższych latach zajmie pierwsze miejsce w rankingu przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych. *

*wg. badania przeprowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN). EZOP II: rozpowszechnienie zaburzeń (kiedykolwiek w życiu, ostatnie 12 miesięcy, ostatni miesiąc), J. Wciórka, J. Leciak, A. Rawska-Kabacińska, E. Suchecka, P. Świtaj, B. Stefanowski, J. Stokwiszewski (<https://ezop.edu.pl/wyniki-badania/>)

fundacja
**MOŻ NA
ZWARIOWAĆ**

WWW.MOZNAZWARIOWAC.PL



Schizofrenia

To przewlekła choroba, która zawsze wymaga leczenia. Jej charakterystycznymi objawami są urojenia, omamy i narastająca podejrzliwość. Zaburzona jest spójność myśli, emocji i zachowania, dlatego osoba chorująca sprawia wrażenie bardzo chaotycznej i rozkojarzonej.

Trudniejsze do wyłapania symptomy to np. brak umiejętności przeżywania i wyrażania emocji, utrata zainteresowań i energii życiowej. Często problemy są zauważane w pierwszej kolejności przez bliskich osoby chorującej – ich rola jest bardzo ważna zarówno w procesie diagnozy, jak też zdrowienia i zapobiegania nawrotom.

Leczenie umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania, więc jeśli zauważasz niepokojące objawy u siebie lub kogoś bliskiego, nie wahaj się zgłosić po pomoc do specjalisty!



Zaburzenia osobowości typu borderline

Ogromne pragnienie bliskości w relacjach i gwałtowne wybuchy złości, kiedy nie da się go zrealizować, nadmierne poczucie odrzucenia i doświadczanie emocjonalnej huśtawki, ogromne napięcie i ryzykowne dla zdrowia próby jego regulowania, trudności z określeniem własnego ja, a czasami wszechogarniająca pustka - to tylko niektóre objawy zaburzenia osobowości borderline. Możesz mieć je wszystkie lub tylko parę, bo każde zaburzenie osobowości to spektrum, a każda osoba zdiagnozowana jako osobowość borderline jest jedyna w swoim rodzaju.

Jeśli od dłuższego czasu trudno Ci w relacjach z innymi i nie masz kontroli nad swoimi emocjami, a odczuwany przez Ciebie dyskomfort rzutuje na niemal każdą dziedzinę życia, pomyśl o psychoterapii lub wizycie u lekarza psychiatry. Żeby zmienić coś w swoim życiu czasami potrzebne jest wsparcie z zewnątrz.

Napady lękowe

Lęk sam w sobie, jako okazjonalna reakcja na stresującą sytuację, nie musi być niczym złym. Gdy jednak utrzymuje się przez długi czas, często powraca lub pojawia się bez wyraźnej przyczyny, nie powinno się go bagatelizować.

Zaburzenia lękowe mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie i zwiększać ryzyko np. depresji czy problemów ze snem. Mogą pojawić się też objawy z ciała (somatyczne) – np. bóle głowy lub brzucha, nudności, wymioty, drżenie rąk czy uczucie ucisku w klatce piersiowej.

Odpowiednio dobrane leczenie lub terapia przynoszą znaczącą poprawę. Dlatego gdy lęk towarzyszy Ci zbyt długo, spróbuj (samodzielnie lub z pomocą bliskiej osoby)... przełamać lęk przed poproszeniem o fachową pomoc. Nie obawiaj się też zasugerować wizyty u specjalisty, jeśli widzisz, że ktoś w Twoim otoczeniu zmagają się z lękiem. To zawsze pierwszy krok do lepszego życia! Trzymamy kciuki!





Choroba alkoholowa

Kieliszek wina do kolacji, spotkanie ze znajomymi w pubie, kolorowe drinki na wakacjach... Spożywanie alkoholu to powszechny zwyczaj i nie w każdym przypadku prowadzi do uzależnienia. Warto jednak obserwować swoje relacje z procentami - ważna jest zarówno ilość, jak też przyczyny i okoliczności picia oraz emocjonalny stosunek do niego.

Gdy alkohol staje się ucieczką (np. przez stresem, smutkiem, wspomnieniami, napięciem, niepewnością), nieodłącznym elementem każdego spotkania towarzyskiego i uroczystości, gdy nie umiesz odmówić kieliszka, a rytm picia zaczyna wyznaczać rytm codzienności (np. odbijając się negatywnie na pracy, rodzinie czy śnie), w głowie powinna zapalić się lampka.

Jeśli czujesz, że alkohol staje się ważniejszy od innych aktywności (lub zauważasz takie objawy u swoich bliskich) - to znak, że warto poradzić się specjalisty. Na zdrowie!



Depresja poporodowa

Wszystkie wydarzenia związane z pojawieniem się na świecie nowego członka rodziny składają się na zupełnie nową rzeczywistość. Tworzą ją zmiany w wyglądzie, hormonach, emocjach, psychice i w końcu - w całej organizacji życia. Można czuć zmęczenie, głód, niewyspanie, przeciążenie. Można nie dawać rady. Ale jeśli przez dłuższy czas towarzyszy temu rozdrażnienie, złość, smutek lub lęk, jeśli śmiech i radość znikają z codzienności, nic nie wydaje się interesujące, a skupienie staje się niemożliwe - to może być depresja poporodowa.

Czujność powinny wzbudzić też problemy ze snem (zarówno bezsenność, jak i nadmierna senność) czy jedzeniem (brak apetytu, ale i "zajadanie smutków") oraz poczucie winy i bycia niewystarczającą. Depresja poporodowa negatywnie wpływa na matkę, dziecko i całą rodzinę. Ważne, by nie bać się prosić o pomoc. Wsparcie specjalisty pomoże odzyskać równowagę w tym trudnym czasie



Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne

Nawracające, natrączywe myśli i związane z nimi kompulsywne czynności oraz lęk, gdy ich nie wykonamy, to główne objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.

Jeśli często towarzyszy Ci poczucie niepewności oraz sprawdzanie, czy dane czynności zostały wykonane (np. czy drzwi są zamknięte, czy kurki z gazem zostały zakręcone itd.), obawy przed brudem, bakteriami, wrażenie, że coś jest “nieczyste”, przymus kontroli najbliższego otoczenia, obsesyjne myśli o charakterze religijnym, związane z normami społecznymi, tematami tabu lub impulsy, że zrobisz coś, co związane jest z kompromitacją, wstydem, niebezpieczeństwem, nie zwlekaj - umów się na wizytę do lekarza psychiatry lub psychoterapeuty.



Depresja

To śmiertelna choroba, która zmienia to, w jaki sposób postrzegamy siebie i otaczający nas świat. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy w porę reagowali na jej objawy - zarówno u siebie, jak i u innych. Depresja może towarzyszyć innym zaburzeniom i mieć różne formy. Czasami ukrywa się pod maską perfekcjonizmu, czasem towarzyszy uzależnieniu lub przedłużającej się żałobie.

Jeśli od co najmniej dwóch tygodni przez większą część dnia czujesz obniżony nastrój, utratę odczuwania przyjemności, problemy ze snem, problemy z koncentracją, poczucie winy lub bezwartościowości, pragnienie śmierci lub myśli samobójcze, to sygnał, że warto zgłosić się po pomoc.

Jeśli znasz osobę, która doświadcza powyższych objawów - działaj, póki nie jest za późno i zgłoś się po pomoc.

Zaburzenia eksplozywne przerywane

Czy to tylko temperament, a może już zaburzenie? Każdemu z nas może zdarzyć się wybuch złości, jednak zwykle umiemy ją w mniejszym lub większym stopniu kontrolować - na tyle, by nie zagrażała ani nam, ani otoczeniu. Jeśli jednak mamy do czynienia z agresją (fizyczną lub słowną), wybuchy powtarzają, są nieproporcjonalne do okoliczności, a nawet całkowicie nieracjonalne - to sygnał alarmowy!

Szczególną czujność powinny wzbudzić sytuacje, w których dochodzi do przemocy fizycznej (uszkodzenia ciała, ale też przedmiotów), psychicznej (wywołanie lęku, upośledzenie funkcjonowania) i takie, gdy napady złości skutkują konsekwencjami finansowymi lub łamaniem prawa. Ryzyko zaburzeń dotyczy osób w każdym wieku - także dzieci!





Fobia społeczna

Czy czujesz lęk w sytuacjach społecznych? To normalne, każdy czasem tak ma. Jeśli jednak paraliżuje on całe Twoje ciało i ogranicza w życiu codziennym, warto skonsultować się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Lęk społeczny to rodzaj fobii, która narasta z czasem. Towarzyszą jej intensywne myśli na temat tego, jak oceniają nas inni ludzie, jak wypadniemy w rozmowie oraz obawa, że inni zauważą nasze objawy. Z czasem, pod wpływem lęku zaczynamy coraz bardziej unikać kontaktów społecznych, co daje nam ulgę, ale tylko na chwilę. Długofalowo, unikanie jeszcze bardziej zwiększa nasz lęk.

Pierwszy krok w kierunku zmiany może być dla Ciebie trudny, ale przerwanie błędnego koła lęku jest możliwe. Zrób to dla siebie!

Zaburzenia mowy

Objawiają się brakiem płynności w mówieniu, wadami wymowy, używaniem słów w ich niewłaściwym znaczeniu, a także nieprawidłową artykulacją czy tonem głosu. Ich przyczyny mogą być fizjologiczne, ale mogą też mieć związek z psychiką. Problemy z wysławianiem się często towarzyszą zaburzeniom lękowym, schizofrenii czy autyzmowi. Z drugiej strony - ich występowanie może zwiększać ryzyko rozwoju depresji (w wyniku braku akceptacji społecznej i poczucia osamotnienia). Jeśli zaburzenia mowy utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie lub zauważasz, że bliska Ci osoba cierpi z tego powodu - warto rozważyć specjalistyczną konsultację. Podczas terapii można liczyć na pełne zrozumienie!





Zaburzenia snu

Przedłużająca się bezsenność, ale też nadmierna senność lub/i problemy z zasypianiem. Jeśli obserwujesz u siebie zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia oddechowe czy ruchowe w trakcie snu, warto przyrzeć się problemowi z bliska. Zaburzenia snu mogą współwystępować u osób zmagających się z depresją czy zaburzeniami lękowymi.

Dobry sen jest ogromnie ważny dla naszego zdrowia, dlatego jeśli obserwujesz u siebie lub kogoś bliskiego coś co Cię niepokoi, nie bagatelizuj tego. Skonsultuj się ze specjalistą i śpij spokojnie!

Akrofobia

Potocznie - lęk wysokości. Może być wynikiem traumatycznego przeżycia z przeszłości (np. upadku), być uwarunkowana fizjologicznie (na osi wzrok-błądnik) lub wiązać się z ogólnie zwiększoną niechęcią do ryzykownych zachowań.

Osoby cierpiące na akrofobię doświadczają podczas sytuacji związanych z przebywaniem na wysokościach zarówno lęku (mogącego prowadzić do ataków paniki czy histerii), jak i objawów z ciała - np. zawrotów głowy, drżenia, przyspieszonego tętna, pocenia się, osłabienia czy uczucia "miękkich nóg".

Fobie to obszerna kategoria, ale wszystkie mają wspólną cechę - znacząco utrudniają funkcjonowanie i uniemożliwiają korzystanie z życia w pełni! Tymczasem odpowiednio dobrana, specjalistyczna terapia może zmniejszyć objawy i małymi krokami wnieść codzienność na zupełnie nowy (i wciąż bezpieczny!) poziom.





PTSD

Zaburzenie stresu pourazowego charakteryzuje się szeregiem dokuczliwych objawów, przypominających o wystąpieniu traumatycznego stresora. Mogą pojawiać się w formie uporczywych myśli lub obrazów dotyczących wydarzenia lub zaburzeń snu (np. koszmarów sennych). Charakterystyczne jest obniżenie nastroju i dokuczliwy lęk. Osoba przeżywająca PTSD może być drażliwa, mieć trudności z koncentracją i łatwiej doznawać przestachu, często unikać miejsca lub osób związanych z traumatycznym zdarzeniem, gdyż przywołują one przykre wspomnienia.

Nie każdy, kto doświadczył traumatycznego zdarzenia rozwinie to zaburzenie. Jeśli jednak tak się stanie, potrzebna będzie pomoc wyspecjalizowanych fachowców - psychiatry oraz psychoterapeuty. Cenne jest również wsparcie społeczne, które pomaga w zdrowieniu.

Zaburzenia psychiczne mają wiele twarzy. Czy któraś z nich jest Ci szczególnie bliska?

Materiał edukacyjny powstał w ramach kampanii społecznej Fundacji Można Zwariować “Można Zwariować i Żyć Normalnie.”

Zdjęcia autorstwa Wiktora Malinowskiego.

W kampanii wystąpili:

Maciek Łączyński

Grzegorz Białas

Iza Kuna

Maciej Kacperczyk

Paweł Kacperczyk

Emil Młodak

Helena Englert

Zosia Zborowska

Bartek Kotschedoff

Lena Urbańska

Violetta Kowalska

Jacek Łukowski

Sebastian Stankiewicz

Adam Szustak

fundacja
**MOŻ NA
ZWARIOWAĆ**

WWW.MOZNAZWARIOWAC.PL