

# Keterkaitan

Hendrik Santoso Sugiarto

IBDA4221 – Selected Topic in Computer Technology

*Quantum Computing*

# Capaian Pembelajaran

- Composite System
- Entanglement
- Non-locality
- Multiqubit system

# Composite System

# Composite System

- Jika Alice mempunyai photon dengan state  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$ , maka wavefunctionnya dapat berbentuk superposisi:

$$\begin{aligned} |\Psi_A\rangle &= \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle \\ \alpha_0^*\alpha_0 + \alpha_1^*\alpha_1 &= 1 \end{aligned}$$

- Lalu bob mempunyai photon dengan state  $|0\rangle$  dan  $|1\rangle$ , maka wavefunctionnya dapat berbentuk superposisi:

$$\begin{aligned} |\Psi_B\rangle &= \beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle \\ \beta_0^*\beta_0 + \beta_1^*\beta_1 &= 1 \end{aligned}$$

- Dapatkah kita mengkonstruksi single composite system dari keduanya?

# Tensor product

- Composite wavefunction dari 2 sistem dapat direpresentasikan secara Tensor :

$$\begin{aligned} |\Psi_{AB}\rangle &= |\Psi_A\rangle \otimes |\Psi_B\rangle \\ |\Psi_{AB}\rangle &= (\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) \otimes (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle) \\ |\Psi_{AB}\rangle &= \alpha_0\beta_0|0\rangle|0\rangle + \alpha_0\beta_1|0\rangle|1\rangle + \alpha_1\beta_0|1\rangle|0\rangle + \alpha_1\beta_1|1\rangle|1\rangle \\ |\Psi_{AB}\rangle &= \alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \alpha_1\beta_0|10\rangle + \alpha_1\beta_1|11\rangle \end{aligned}$$

- Vektor ket sekarang memiliki 2 indeks untuk merepresentasikan suatu state:

$$|\Psi_{AB}\rangle = \sum_{a,b} c(a,b)|ab\rangle$$

- Vektor ket  $|ab\rangle$  bersifat orthonormal, dimana:

$$\langle ab|a'b'\rangle = \delta_{aa'}\delta_{bb'}$$

# Uji Pemahaman

- Apakah hasil tensor product dari  $|\Psi_{ab}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$
- Berapa peluang mengukur 01 pada wavefunction diatas?

# Tensor Product Matrices

- Untuk menggabungkan 2 matriks 2x2 menjadi matriks 4x4:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & A_{12}B \\ A_{21}B & A_{22}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} & A_{12}B_{11} & A_{12}B_{12} \\ A_{11}B_{21} & A_{11}B_{22} & A_{12}B_{21} & A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} & A_{21}B_{12} & A_{22}B_{11} & A_{22}B_{12} \\ A_{21}B_{21} & A_{21}B_{22} & A_{22}B_{21} & A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

- Untuk menggabungkan 2 vektor kolom 2x1 menjadi vektor kolom 4x1:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} \\ a_{11}b_{21} \\ a_{21}b_{11} \\ a_{21}b_{21} \end{pmatrix}$$

# Uji Pemahaman

- Apakah tensor product dari  $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  dan  $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ?
- Apakah tensor product dari  $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$  dan  $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ?



# Tensor Product Basis

- Bentuk basis ket:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Bentuk komposit:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |01\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

# Tensor Product Operator

- Bentuk basis operator:

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Bentuk komposit:

$$Z \otimes X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$Z \otimes X \neq X \otimes Z$$

# Operator pada Basis ket

- Sebuah operator  $Z \otimes X$  bekerja pada basis ket  $|01\rangle$

$$(Z \otimes X)|01\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |00\rangle$$

# Uji Pemahaman

- Apakah output dari operasi  $(Z \otimes X)|00\rangle$ ?

# Entanglement

# Entangled States

- Quantum mechanics memungkinkan superposisi vektor lebih dari sekedar tensor product

- Bentuk komposit yang paling general adalah:

$$|\Psi_{AB}\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$$

- Dimana kondisi normalisasinya:

$$c_{00}^* c_{00} + c_{01}^* c_{01} + c_{10}^* c_{10} + c_{11}^* c_{11} = 1$$

# Maximally Entangled States

- Terdapat sistem yang lebih entangled dari sistem lain (entanglement bukanlah binari antara ya dan tidak)

- Sebuah sistem disebut maximally entangled states jika:

$$|\Psi_{AB}\rangle = c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle$$

- Dimana tidak mungkin dibentuk dari produk 2 qubit:

$$|\Psi_{AB}\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$$

# Keterkaitan

- Sebuah system dikatakan terkait jika observasi yang satu akan sekaligus menentukan hasil observasi yang lain
- Secara wavefunction dapat ditulis:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle|0\rangle + |0\rangle|1\rangle)$$



# Uji Pemahaman

- Apakah qubit pertama dan kedua dari wavefunction berikut entangled?
  - $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$
  - $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{8}} |01\rangle + \frac{1}{\sqrt{8}} |10\rangle + \frac{1}{\sqrt{4}} |11\rangle$


# Non-Locality

# Lokalitas

- Lokalitas adalah fondasi dari fisika klasik
- Lokal berarti suatu kejadian hanya dapat disebabkan oleh sesuatu yang berada di lokasi dan saat yang sama
- Gaya gravitasi Newton bersifat non-lokal dan medan gravitasi Einstein bersifat lokal

# EPR Paradox

- “Spooky Action at Distance”




## EINSTEIN ATTACKS QUANTUM THEORY

Scientist and Two Colleagues  
Find It Is Not 'Complete'  
Even Though 'Correct.'

SEE FULLER ONE POSSIBLE

Believe a Whole Description of  
'the Physical Reality' Can Be  
Provided Eventually.



A. Einstein






B. Podolsky



N. Rosen



# Bell Inequality






# Demonstration of Entanglement

- <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1517007112>





# Longest Entanglement



# Multiqubit System



# Single Qubit Gates on Multi-Qubit State

- Sekalipun kita menggunakan multi-qubit, tapi antar qubit bisa saja tidak berinteraksi (tiap operator hanya beroperasi pada qubit masing-masing secara independen)
- Contoh: Sebuah operator  $H$  beroperasi pada qubit  $q_0$  dan operator  $X$  beroperasi pada qubit  $q_1$


$$X|q_1\rangle \otimes H|q_0\rangle = (X \otimes H)|q_1q_0\rangle$$

- Operator kompositnya:

$$X \otimes H = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


- Misalkan semua qubit berada pada inisiasi awal, qubit kompositnya:

$$|q_1q_0\rangle = |00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



# Uji Pemahaman

- Apakah bentuk komposit dari sirkuit kuantum berikut?
- Bandingkan state akhir bentuk komposit dan bentuk terpisah
  - Jika  $|q_1 q_0\rangle = |00\rangle$
  - Jika  $|q_0\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$  dan  $|q_1\rangle = c|0\rangle + d|1\rangle$




# Multi-Qubit Gates

- Multiqubit gate adalah quantum gate yang beroperasi pada beberapa qubit sekaligus (terjadi interaksi antar qubit ketika operator ini digunakan)
- Contoh:
  - CNOT gate
  - CCNOT (Toffoli) gate
  - Swap gate
  - Cswap (Fredkin) gate

# CNOT Gate


- Jika controlled qubit adalah 0, tidak merubah apa-apa
- Jika controlled qubit adalah 1, operasi X pada target qubit
- $CNOT = I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1|$
- $CNOT = (|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) \otimes |0\rangle\langle 0| + (|0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|) \otimes |1\rangle\langle 1|$
- $CNOT = |00\rangle\langle 00| + |10\rangle\langle 10| + |01\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 01|$
- $CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$



Input (t,c)	Output (t,c)
00	00
01	11
10	10
11	01

# Uji Pemahaman

- Apakah hasil dari operasi berikut?



# CU Gate

- Kita dapat mengontrol operasi gate apapun
- Jika controlled qubit adalah 0, tidak merubah apa-apa
- Jika controlled qubit adalah 1, operasi U pada target qubit
- $CU = I \otimes |0\rangle\langle 0| + U \otimes |1\rangle\langle 1|$
- Misalnya  $CPhase = I \otimes |0\rangle\langle 0| + Z \otimes |1\rangle\langle 1|$


# Uji Pemahaman

- Buatlah Cphase gate dengan menggunakan CNOT gate

# Entangled States

- $CNOT |0+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$

- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$





# Uji Pemahaman

- Berapa state akhir dari  $CNOT(I \otimes H)|00\rangle$ ?

# Bell States

- Terdapat 4 bell states yang maximally entangled dan membentuk basis orthonormal:
- $|\phi^+\rangle = CNOT(I \otimes H)|00\rangle = CNOT|0+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$
- $|\phi^-\rangle = CNOT(I \otimes H)|01\rangle = CNOT|0-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$
- $|\psi^+\rangle = CNOT(I \otimes H)|10\rangle = CNOT|1+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle)$
- $|\psi^-\rangle = CNOT(I \otimes H)|11\rangle = CNOT|1-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle)$

# Uji Pemahaman

- Apakah bentuk dari  $\frac{1}{2}(|00\rangle + i|01\rangle + i|10\rangle + |11\rangle)$  dalam basis:  $\{|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), |\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), |\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |01\rangle), |\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle)\}$

# Aktivitas

- Multiqubit system dan Entanglement di Qiskit
- <https://learn.qiskit.org/course/ch-gates/multiple-qubits-and-entangled-states>

# Tuhan Memberkati