



WCE: BreitnauNeuhof.Rosch.1989 (lcRWWzCPyjezteZo74a)



| | |
|--|---|
| geo_latitude: | 47.9333 |
| geo_longitude: | 8.0667 |
| geo_elevation: | |
| archiveType: | Peat |
| Category: | Pollen |
| CategorySpecific: | Pollen (calibrated) |
| paleoData_proxyGeneral: | pollen |
| paleoData_proxy: | pollen |
| paleoData_proxyDetail: | Bog with Pinus uncinata forest. Surrounding vegetation: Spruce forest |
| paleoData_variableName: | precipitation |
| climateInterpretation1_seasonalityGeneral: | Annual |
| climateInterpretation1_variable: | P |
| paleoData_units: | mm/a |
| chronData_agesN_12k: | 14 |
| chronData_agesMaxGap_12k: | 1950 |
| Source: | Legacy Climate v1.0 |
| pub1_title: | Breitnau-Neuhof pollen profile: On the temporal course of the Holocene |
| pub1_doi: | Rosch, M., 1989. Breitnau-Neuhof pollen profile: On the temporal course of the |
| pub2_doi: | 10.5194/essd-2022-38 |
| originalDataUrl: | https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.930512 |