



NWN: UpperPintoFen.Yu.2003 (PeatDBD)



|  |  |
|--|--|
| paleoData_TSid:                            | WEBc8473abd  |
| dataSetName:                               | WA01.Rainville.2013  |
| geo_latitude:                              | 61.2447  |
| geo_longitude:                             | -136.9264  |
| geo_elevation:                             | 1000   |
| archiveType:                               | LakeSediment   |
| Category:                                  | Other  |
| CategorySpecific:                          | Other (not calibrated)   |
| paleoData_proxyGeneral:                    | biophysical  |
| paleoData_proxy:                           | TOC  |
| paleoData_proxyDetail:                     | bulk sediment  |
| paleoData_variableName:                    | LOI  |
| climateInterpretation1_seasonalityGeneral: | Annual   |
| climateInterpretation1_variable:           | P-E  |
| paleoData_units:                           | percent  |
| Source:                                    | Other  |
| pub1_title:                                | Holocene environmental history of the Aishihik Region, Yukon, Can                            |
| pub1_doi:                                  | 10.1139/cjes-2012-0103   |
| pub2_doi:                                  |  |
| originalDataUrl:                           | <a href="http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/18435">www.ncdc.noaa.gov/paleo/study/18435</a> |