



ENA: White.Watts.1980a (OLS_R4QPDsP0JVVX)



| | |
|--|---|
| geo_latitude: | 34.16 |
| geo_longitude: | -80.76 |
| geo_elevation: | |
| archiveType: | LakeDeposits |
| Category: | Shoreline |
| CategorySpecific: | Shoreline (Lake Level) |
| paleoData_proxyGeneral: | lakeLevel |
| paleoData_proxy: | lakeLevel |
| paleoData_proxyDetail: | LakeDeposits |
| paleoData_variableName: | lakeStatus |
| climateInterpretation1_seasonalityGeneral: | Annual |
| climateInterpretation1_variable: | P-E |
| paleoData_units: | unitless index |
| chronData_agesN_12k: | |
| chronData_agesMaxGap_12k: | |
| Source: | Oxford Lake Level Database |
| pub1_title: | Late-Quaternary vegetation history at White Pond on the Inner Coast |
| pub1_doi: | Street-Perrott, F.A., D.S. Marchand, N. Roberts, and S.P. Harisson, 2010. doi:10.1016/j.jas.2010.08.001 |
| pub2_doi: | |
| originalDataUrl: | ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/paleolimnology/lakelevels/oxford/ |