



SAU: Frome.Bowler.1986 (OLS\_RTxbwsdvMwm)



|  |   |
|--|---|
| geo_latitude:                              | -30.75  |
| geo_longitude:                             | 139.83  |
| geo_elevation:                             |   |
| archiveType:                               | LakeDeposits  |
| Category:                                  | Shoreline   |
| CategorySpecific:                          | Shoreline (Lake Level)  |
| paleoData_proxyGeneral:                    | lakeLevel   |
| paleoData_proxy:                           | lakeLevel   |
| paleoData_proxyDetail:                     | LakeDeposits  |
| paleoData_variableName:                    | lakeStatus  |
| climateInterpretation1_seasonalityGeneral: | Annual  |
| climateInterpretation1_variable:           | P-E   |
| paleoData_units:                           | unitless index  |
| chronData_agesN_12k:                       |   |
| chronData_agesMaxGap_12k:                  |   |
| Source:                                    | Oxford Lake Level Database  |
| pub1_title:                                | Radiocarbon dating of playa-lake hydrologic changes: examples from  |
| pub1_doi:                                  | Street-Perrott, F.A., D.S. Marchand, N. Roberts, and S.P. Harisson, 2004.   |
| pub2_doi:                                  |   |
| originalDataUrl:                           | <a href="ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/paleolimnology/lakelevels/oxford/">ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/paleolimnology/lakelevels/oxford/</a> |