

## Aphasia 失語症 V.S. Dysarthria 喎語症

失語症是一種由特定腦區受損引起的語言障礙（如：中風、腦傷），主要可分為流暢性失語症和非流暢性失語症。又可細分為 Wernicke's 失語症、命名不能型失語症、傳導型失語症、Broca's 失語症、混合型失語症和全面性失語症。

失語症可能同時伴有吶語症、言語失用症等。

吶語症又稱為吶吃，是一種動作執行上的問題，並非語言障礙。可能是因為一些和言語有關的 basic motor processes 受損造成。

吶語症可以單獨存在。

吶語症分為弛緩型、痙攣型、單側性上運動神經型、運動失調型、運動不及型、運動過度型、混合型等。

失語症及吶語症有根本上的不同，一個是語言障礙，一個是構音障礙。以這點來說就已經不能混為一談。

Table 2.2

神經病理的類型	溝通障礙類型
腦血管性疾病 (出血、動脈瘤、動脈粥狀硬化、動靜脈畸形)	失語、吶語、失智
退化性疾病 (阿茲海默症、皮克氏症)	失智
創傷 (穿透或封閉的頭部外傷)	失語、吶語、語言混亂
帕金森氏症	吶語、dementia
多發性硬化症	吶語
水腦症	失語
良性或惡性腫瘤	失語或吶語 / 失語及吶語
杭丁頓舞蹈症	失智及吶語
遺傳性運動失調	吶語
肌萎縮側索硬化症 (漸凍人)	吶語
重症肌無力	吶語