



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY



Jaroslav Kolařík a kolektiv

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

včetně výpočtu kompenzačních opatření
za kácené nebo poškozené dřeviny

METODIKA AOPK ČR

PRAHA 2022

Jaroslav Kolařík a kolektiv

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

včetně výpočtu kompenzačních opatření
za kácené nebo poškozené dřeviny

METODIKA AOPK ČR

Praha 2022

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Kolařík, Jaroslav, 1969-

Oceňování dřevin rostoucích mimo les : včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny : metodika AOPK ČR / Jaroslav Kolařík a kolektiv. -- Vydání: čtvrté. -- Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2022. -- 122 stran. -- (Metodika AOPK ČR)

Obsahuje bibliografické odkazy

ISBN 978-80-7620-099-9 (brožováno)

* 657.92:582.091/.097 * 502.172:582 * (072)

- oceňování dřevin
- ochrana rostlin
- metodické příručky

502 - Životní prostředí a jeho ochrana [2]



Tato metodika *Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR* byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA, projektu č. TL01000020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“.

© **SAFE TREES, s. r. o., Univerzita Karlova v Praze – Centrum pro otázky životního prostředí, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.**

© **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2022**

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

Více na **www.nature.cz**

ISBN 978-80-7620-099-9 (brožováno)

NEPRODEJNÉ



PŘÍRODA JE NAŠE
DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

AUTORSKÝ TÝM



Ing. Jaroslav Kolařík, Ph. D.
Ing. Andrea Szórádová, Ph. D.
Ing. Hana Holešová
Mgr. Jiří Mikulášek



UNIVERZITA KARLOVA
Centrum pro otázky životního prostředí

Ing. Kateřina Máčová (Kaprová), Ph. D.



Mgr. Jan Karel
Ing. Eva Smolová
Mgr. Radek Jaroš

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za odbornou spolupráci kolegům z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Ing. Brigita Neumannová, Mgr. Zuzana Stanzelová, Ing. Libor Sedláček, DiS., Ing. Pavel Pešout) a z Ministerstva životního prostředí ČR (Ing. Tomáš Staněk, CSc., Ing. Pavel Chotěbor), kteří významně přispěli ke vzniku inovovaného metodického postupu.

Rádi bychom také poděkovali všem ostatním expertům a uživatelům, kteří se na inovaci metodického postupu podíleli svými komentáři v rámci expertního panelu, seminářů a workshopů apod., a také oponentům metodiky za cenné komentáře a doplnění.

DOPORUČENÁ CITACE:

Kolařík, J. a kol. (2022): *Metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR*. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 122 stran.

Obsah

Předmluva.....	6
----------------	---

1 Úvod..... 7

Agenda OOP při rozhodování o povolení kácení dřevin.....	8
Agenda OOP při povolování kácení dřevin – stanovování kompenzačních výsadeb.....	9
Agenda OOP při neoprávněných zásazích na dřevinách	
– ukládání náhradních opatření k nápravě.....	10
Další účely použití metodiky	11
Zohlednění oborových standardů při práci s metodikou	11

2 Oceňování solitérních stromů 12

Krok 1: Určení základní hodnoty stromu	13
Krok 2: Zohlednění objemu koruny stromu	21
Krok 3: Zohlednění zdravotního stavu a vitality	29
Krok 4: Zohlednění nevhodného řezu.....	36
Krok 5: Zohlednění polohového koeficientu.....	38
Krok 6: Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem.....	44
Krok 7: Zohlednění biologického významu taxonu stromu.....	49
Krok 8: Výpočet základní hodnoty stromu s prvky se zvýšeným biologickým potenciálem	50
Krok 9: Výpočet hodnoty stromu v korunách	50

3 Případová studie – solitérní strom..... 51

4 Oceňování porostu dřevin..... 53

Krok 1: Určení základní hodnoty porostu	54
Krok 2: Zohlednění vhodnosti a pěstebního stavu porostu	59
Krok 3: Zohlednění biologické hodnoty a atraktivity umístění porostu	61
Krok 4: Výpočet hodnoty porostu dřevin v korunách	62

5 Případová studie k oceňování porostů 63

6 Kompenzační opatření..... 65

Krok 1: Určení výše korekčního rámce	65
Krok 2: Volba typu kompenzačního opatření	66
Krok 3: Výsadby – volba počtu a velikosti vysazovaných rostlin	67
Krok 4: Výsadby – volba taxonu a délky povýsadbové péče	67
Krok 5: Výsadby – výpočet hodnoty kompenzačních opatření.....	73
Krok 6: Výpočet hodnoty kompenzačních opatření zahrnující pěstební opatření.....	75
Krok 7: Kontrola využití korekčního rámce.....	81
Krok 8: Kontrola realizovaných kompenzačních opatření	82

7 Přílohy 83

PŘEDMLUVA

Nejcitelněji v České republice v „nástrojovém mixu“ (kombinaci nástrojů) státní ochrany přírody chybí širší využívání metod vycházejících z oceňování biodiverzity na všech úrovních. Většinou chápeme biodiverzitu vč. krajiny jako veřejný statek. Ohodnocení tohoto veřejného statku a jeho jednotlivých částí a poskytovaných přímých i nepřímých užitků však stále není metodicky dopracováno a jeho aplikace nemá systémovou oporu v legislativě. Umožnění promítnutí ceny části spotřebovaného veřejného statku do ceny uvažované investice přitom integruje zachování biologické rozmanitosti do rozhodování hospodářských subjektů a investorů. Současný, i když v dobré snaze upravený, výpočet odvodů za vynětí zemědělské a lesní půdy nemůže tento ucelený přístup nahradit.

Stejný princip by měl být významně uplatněn i při aplikaci nástrojů pozitivní stimulace – podpor, dotací atd. z veřejných rozpočtů. Jistě právě využití obdobné metodiky pro stanovení výše poplatků (případně sankce) za spotřebu (zničení či poškození) veřejného statku i pro posuzování výše dotací na jeho tvorbu by mohlo být pro obě skupiny nástrojů základem jejich pochopení širší veřejností. Zejména pak, pokud by se podařilo v tomto směru udržet dnešní model, kdy jsou stávající poplatky (za znečišťování, odvody zemědělské půdy apod.) a sankce příjmem stejné kapitoly veřejného rozpočtu (např. Státního fondu životního prostředí ČR), ze které jsou pak uvolňovány dotace např. na krajinnotvorná opatření. Bylo by však žádoucí, aby byla, významněji než dnes, uplatněna místní úměra – tedy aby v oblasti, kde je odvedeno nejvíce poplatků a sankcí za spotřebu veřejného statku, se vrátilo z tohoto zdroje i nejvíce financí na jeho obnovu či tvorbu.

Agentura ochrany přírody ČR proto dlouhodobě rozvíjí metodiky hodnocení a ohodnocování jednotlivých vybraných částí přírody. Někde jsme teprve na počátku; např. v oceňování jedinců zvláště chráněných druhů organismů vytržených z prostředí či v oceňování přístupu do krajiny. Pro širší uplatnění v praxi se upravuje hodnocení a oceňování biotopů. Nejdále je oceňování dřevin rostoucích mimo les vyvíjené Agenturou ochrany přírody a krajiny již od r. 1993, které je v současnosti již běžně v praxi užívané. Metodiku nyní předkládáme vč. elektronické aplikace ve třetí verzi.

Metodika oceňování dřevin volně rostoucích mimo les je postavena na objektivizovaných kritériích, která však byla volena co nejjednodušší. Vlastní ocenění je pak vždy výsledkem společenské dohody, která se v této metodice opírá především o stanovení pětileté doby pro kompenzaci újmy. Pětiletá doba byla zvolena zejména z důvodu stanovení této doby jako maximální pro následnou péči o náhradní výsadby dřevin dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Metodika AOPK ČR tedy počítá s náhradou odstraňovaného stromu či keře formou výsadby více jedinců, jejichž funkční význam v horizontu stanovených pěti let povede k náhradě efektu dřevin odstraňovaných.

Aktuálně předkládáná novelizace metodiky obsahuje úpravu hodnoty koeficientů (např. polohového) na základě výzkumu provedeného v rámci projektu TAČR č. TL0100020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“. Dále pro praxi přináší zjednodušený postup pro oceňování porostů dřevin (porostů stromů, keřů, popínavých dřevin a jejich směsí).

Věřím, že tato třetí novelizace metodiky AOPK ČR oceňování dřevin rostoucích mimo les se setká s kladným ohlasem u nových i stávajících uživatelů. Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.

Pavel Pešout

ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny AOPK ČR

1 ÚVOD

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK ČR je určena pro oceňování dřevin v mimolesním prostředí. **Slouží především k výpočtu kompenzace za vzniklou ekologickou či společenskou újmu¹ vzniklou při kácení či poškození dřevin, a souvztažně ke stanovení náhrad, které vzniklou újmu kompenzují.** V praxi orgánů ochrany přírody (dále jen OOP) se tato metodika používá nejčastěji pro stanovení kompenzačních výsadeb za dřeviny, u nichž OOP rozhodl o povolení kácení (§ 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění – dále jen ZOPK), anebo pro stanovení náhradních opatření za dřeviny poškozené (§ 86 ZOPK).

Metodiku je vhodné využívat i jako **podklad pro rozhodování OOP při povolování kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, konkrétně za účelem vyhodnocování funkčního a estetického významu dřevin a pro účely správních úvah, zda důvody ke kácení uvedené žadatelem o kácení převažují veřejný zájem na zachování dřeviny – a tudíž zda kácení povolit, či nepovolit.** Obdobně je možné metodiku použít jako podklad pro vydání závazného stanoviska OOP při kácení dřevin pro účely stavebního záměru (§ 8 odst. (6) ZOPK).

Dále metodický výpočet umožňuje OOP stanovit, **kolik nově vysazených dřevin (stromů či keřů) jakého druhu a velikosti adekvátně nahradí společenskou újmu, ke které pokácením či poškozením dané dřeviny dojde či došlo.** Metodika (již od verze z roku 2013) umožňuje také stanovit, jak adekvátně kompenzovat vzniklou újmu nejen výsadbou nových dřevin, ale také formou pěstebních zásahů, které zlepšují stav či prodlužují perspektivu jiných dřevin. Tuto možnost lze ale podle platné právní úpravy použít pouze v případě kompenzace za poškození dřevin (§ 86 ZOPK), nikoliv v případě povolování kácení (§ 8 odst. 6 a § 9 ZOPK).

Používání metodiky AOPK ČR není pro orgány ochrany přírody právně závazné, je však pro toto využití doporučena MŽP² a v praxi často využívána OOP, odbornými posuzovateli i soudními znalci.

S ohledem na účel, pro který byla metodika AOPK ČR vytvořena, sestává její obsah z následujících částí:

- ocenění kácených a poškozených dřevin
 - ocenění solitérních stromů
 - ocenění porostů dřevin (vč. keřů a lián)

¹ Termín „ekologická újma“ vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (a dalších zákonů platných v ČR – podrobně viz kapitola 11 Technické zprávy k metodice AOPK ČR 2021 (Kaprová, K. a kol. (2021)). Metodika AOPK ČR je zpracována přímo jako nástroj vhodný pro výpočet ekologické újmy odpovídající definicím z právní úpravy ČR.

Ve vědecké literatuře se lze setkat s mnohem širším pojetím i s různým názvoslovím hodnot (či přínosů, služeb, funkcí...) poskytovaných přírodou i dřevinami (ekologických, společenských a dalších). Nákladové přístupy oceňování dřevin, které jsou základem metodiky AOPK ČR, jsou jedním z možných (a relativně často používaných) přístupů pro kvantifikaci v mnohých pojetích hodnot, například pro vyjádření celospolečenské hodnoty dřeviny. Podrobněji viz kapitoly 3. 1. a 11: Technická zpráva k Metodice Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR (verze 2021). Praha: COŽP UK, ATEM a SAFE TREES.).

² Viz Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody – *Věstník MŽP, ročník XXXI, částka 4, duben 2021, str. 21.* [https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/\\$FILE/SOTPR-Vestnik_duben_2021-210429.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2021/$FILE/SOTPR-Vestnik_duben_2021-210429.pdf)

- ocenění kompenzací za kácené a poškozené dřeviny
 - ocenění kompenzačních výsadeb dřevin
 - ocenění kompenzací formou péstebních opatření

Aktuální verze (2021) metodiky AOPK ČR byla zpracovaná se státní podporou Technologické agentury ČR, Program ÉTA, v rámci projektu č. TL01000020 „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“. Metodika byla v rámci projektu TA ČR certifikována MŽP ČR.

Stejně jako předchozí verze metodiky AOPK ČR, tento metodický text obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu komentován pouze stručně. Komplexní podklady k metodice vzniklé v rámci řešení projektu TA ČR jsou shrnuty ve veřejně dostupné Technické zprávě k Metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les (verze 2021)³, která Metodiku AOPK ČR v tomto směru doplňuje. Technická zpráva ve vazbě na metodiku AOPK ČR detailněji komentuje jednotlivé v metodice prezentované kroky ocenění a širší kontext využití metodiky pro uživatele i další odbornou veřejnost. Dále technická zpráva také objasňuje samotnou metodologii ocenění jak v samotné metodice AOPK ČR, tak i v kontextu dalších českých i zahraničních postupů a detailně uvádí postupy a metody použité pro přepracování metodického postupu do nové verze, včetně jednotlivých provedených změn oproti minulé verzi metodiky AOPK ČR (z r. 2018).

Agenda OOP při rozhodování o povolení kácení dřevin

Metodiku je vhodné používat jako jeden z podpůrných podkladů ve správním kroku OOP rozhodování o povolení – či nepovolení – kácení dřevin (dle ZOPK § 8 odst. 1 „Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.“). Podle článku 3. 1. 4 Metodické instrukce MŽP ČR (str. 8, citace viz výše) „součástí vyhodnocení funkčního a estetického významu je úvaha o vzniku ekologické újmy, která kácením dřevin vznikne, resp. o jejím rozsahu“, přičemž metodika AOPK ČR podklad pro tuto úvahu o rozsahu újmy přímo obsahuje.

Jednotlivé kroky metodického postupu ocenění solitérních dřevin a porostů dřevin umožňují do určité míry standardizovaně uchopit i některá další doporučení článku 3. 1. 4 Metodické instrukce MŽP vyhodnocovat funkční a estetický význam dřevin i „slovně s ohledem na konkrétní podmínky na základě souhrnu jednotlivých funkcí, které dřevina plní (např. zdravotně-hygienická funkce v urbanizovaném prostoru obce, ekologicko-stabilizační funkce, krajinná dominanta, dřevina jako biotop pro další organismy), a dílčích kritérií popisujících stav dřeviny (zejména zdravotní stav, vitalita, perspektiva dřevin) s přihlédnutím ke konkrétnímu stanovišti a místu v krajině“.

Metodika je standardizovaný postup a její výsledek by rozhodně neměl být jediným podkladem, který má OOP při rozhodování o povolení kácení konkrétní dřeviny zohlednit⁴. Číselný výsledek metodického postupu nemá plně nahradit správní úvahu, kterou i nadále doporučujeme OOP zpracovat slovně s ohledem na konkrétní dřevinu a okolní podmínky, které tento standardizovaný metodický postup nemusí vždy zachycovat do úplného detailu. OOP má v rámci slovního vyjádření zhodnotit

3 Kaprová, K. a kol. (2021): Technická zpráva k Metodice Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR (verze 2021). Praha: COŽP UK, ATEM a SAFE TREES.

4 Pozn. Bližší informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les, včetně rozhodování o povolení kácení, lze nalézt na průběžně aktualizované webové stránce MŽP ČR k této problematice: https://www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska.

a odůvodnit, zda zájem na pokácení dřeviny převyšuje veřejný zájem na jejím zachování a zda by případným kácením nemohlo dojít k ohrožení jiných zájmů chráněných podle ZOPK.

Obdobně **je možné metodiku použít jako podklad pro závazné stanovisko OOP při kácení dřevin pro účely stavebního záměru** (§ 8 odst. 6 ZOPK). Podle článku 3. 1. 4 Metodické instrukce MŽP ČR "při vydávání závazného stanoviska podle § 8 odst. 6 ZOPK postupuje OOP obdobně jako při vydávání povolení ke kácení, tzn. zváží funkční a estetický význam dřeviny na straně jedné a závažnost důvodů spočívající v kolizi se stavebním záměrem na straně druhé".

Agenda OOP při povolování kácení dřevin – stanovování kompenzačních výsadeb

OOP metodiku používá také **ve fázi, kdy je o povolení kácení souhlasně rozhodnuto a dochází k ukládání náhradní výsadby jako kompenzace ekologické újmy** vzniklé kácením dřevin (§ 9 ZOPK), o jejichž uložení rozhoduje OOP. Smyslem náhradní výsadby je zachování zeleně na daném stanovišti, včetně zachování její estetické, biologické a funkční hodnoty. Při ukládání náhradní výsadby lze dle § 9 ZOPK uložit také následnou péči o tyto dřeviny až po dobu 5 let. Stejný postup se používá také pro ukládání náhradní výsadby jako součásti závazného stanoviska OOP ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povoleného v řízeních podle stavebního zákona, kdy OOP postupuje podle § 8 odst. 6 ZOPK.

Kompenzační výsadby lze uložit buď na pozemku žadatele, nebo (pokud tam výsadbu není možné nebo vhodné realizovat) na pozemcích jiných vlastníků s jejich svolením. Obce jsou pro tento účel povinny dle § 9 odst. 2 ZOPK povinny vést ve svém územním obvodu přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu po předběžném projednání s jejich vlastníky. V praxi dochází často k náhradní výsadbě na pozemku žadatele, nebo na obecních pozemcích.

Aplikace metodického postupu v tomto případě spočívá v ocenění kácených dřevin (solitérních stromů či porostů dřevin – přičemž metodika pro ocenění porostů dřevin zahrnuje i výpočet hodnoty pro keře a dřevité liány); a následně výběru vhodného odpovídajícího složení kompenzačních výsadeb dřevin tak, aby byla výsadba úměrná újmě vzniklé kácením.

Dle platné právní úpravy lze ekologickou újmu v agendě povolování kácení dřevin dle § 9 ZOPK nahrazovat **pouze výsadbami nových dřevin**, nikoli formou péstebních zásahů a opatření, které zlepšují stav či prodlužují perspektivu jiných dřevin. Metodika přitom umožňuje relativně jednoduše stanovit (a tím pádem i v rozhodnutí řádně zdůvodnit), kolik nově vysazených dřevin (stromů či keřů) jakého druhu a velikosti adekvátně nahradí újmu vzniklou kácením dřevin.

Pro stanovení kompenzační výsadby za kácené dřeviny lze využít **výpočetní kalkulačku** (ocenovanidrevin.nature.cz), která umožňuje automatizovaně provést výpočet ekologické újmy i nastavení náhradních dřevin k výsadbě tak, aby adekvátně újmu kompenzovaly.

Výběr doporučených taxonů pro nové výsadby dřevin nově OOP usnadňuje mapa ekologických nároků dřevin. Mapa je zpracována formou kategorizace růstových podmínek (běžné, složité či extrémní) ve vazbě na abiotické faktory působící v dané lokalitě, a umožňuje tak OOP při návrhu náhradních výsadeb volit takové druhy dřevin, které budou v daném místě prosperovat. Mapa vznikla (stejně jako inovovaná metodika) jako výstup projektu TAČR ÉTA „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení“ a je

veřejně dostupná na prohlížeči mapových služeb AOPK ČR MapoMat (<https://webgis.nature.cz/mapomat/>).

Metodiku OOP nevyužije v případech správní agendy týkající se kácení dřevin, kdy žádná ekologická újma v souvislosti s kácením dřevin nevzniká. Může se jednat o případy, **kdy je kácení dřevin prováděno v prospěch jiných zájmů chráněných stejným zákonem**, např. při kácení invazních druhů (ne vždy) nebo při kácení prováděném ve prospěch jiných dřevin, zvláště chráněných druhů, zvláště chráněných území či evropsky významných lokalit apod. Dále pak metodika není využívána v případech, **kdy nemůže být ukládána náhradní výsadba vůbec**, tj. při kácení dřevin ve stanovených případech, k nimž není potřeba povolení OOP – viz § 8 odst. 3 ZOPK, resp. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení; anebo **při kácení dřevin „na oznámení“** ve zvláštních případech definovaných v § 8 odst. 2 a 4 ZOPK, které je mimo režim „rozhodování o povolení kácení“ dřevin, a tedy se náhradní výsadba neukládá⁵.

Agenda OOP při neoprávněných zásazích na dřevinách – ukládání náhradních opatření k nápravě
V případě, že dojde k neoprávněnému zásahu na dřevinách (poškození či zničení dřevin), u nichž není možné a účelné uvedení do původního stavu (§ 86 odst. 1 ZOPK), může OOP dle § 86 odst. 2 ZOPK uložit povinnému, aby provedl **přiměřená náhradní opatření k nápravě**. Stanovení opatření k nápravě dle § 86 ZOPK může spočívat **v kompenzačních výsadbách dřevin anebo v realizaci pěstebních zásahů a opatření**, které zlepšují stav či prodlužují perspektivu jiných dřevin.

Aplikace metodického postupu v tomto případě spočívá v ocenění výše újmy, která vznikla poškozením či zničením dřeviny; a následně výběru vhodného odpovídajícího složení kompenzačních výsadeb dřevin či pěstebních opatření tak, aby byla výsadba úměrná újmě vzniklé neoprávněným zásahem.

Postup ocenění výše újmy dle metodiky je následující:

- pokud neoprávněný zásah spočívá v **poškození stromu nevhodným ořezem** (což je velmi častý případ), je součástí výpočtu hodnoty solitérní dřeviny v metodice přímo krok, v němž se zjišťuje snížení hodnoty stromu o nevhodný ořez. **Výše újmy se pak rovná právě vypočtené srážce hodnoty o nevhodný ořez.**
- pokud neoprávněný zásah spočívá v **jiném typu zásahu na dřevině** (např. poškození kmene) či **na porostu dřevin**, lze **výši újmy vypočíst jako rozdíl hodnoty dřeviny či porostu dřevin před a po neoprávněném zásahu.**

Metodika dále **umožňuje relativně jednoduše stanovit** (a tím pádem i v rozhodnutí řádně zdůvodnit), **kolik nově vysazených dřevin (stromů či keřů) jakého druhu a velikosti a/nebo kolik jakých typů pěstebních opatření adekvátně nahradí** vypočtenou újmu vzniklou neoprávněným zásahem.

Pro účel vypočtení hodnoty dřeviny před neoprávněným zásahem a po něm lze využít **výpočetní kalkulačku** (ocenovanidrevin.nature.cz), která umožňuje automatizovaně tyto výpočty provést (je nutné

⁵ Na tomto místě je vhodné také zdůraznit, že dále se Metodika AOPK ČR **nepoužívá ani pro oceňování majetkové újmy dle zákona č. 89/2012 Sb.**, občanský zákoník, protože k tomuto účelu je dle platné legislativy právně závazné využít vyhlášku Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku – „oceňovací vyhlášku“. Další podrobnosti viz technická zpráva k metodice AOPK ČR (Kaprová a kol., 2021) kapitola 11.

postupovat tak, že uživatel vypočte zvlášť hodnotu dřeviny před, zvlášť hodnotu po, a rozdíl obou hodnot odečte manuálně). Ostatní kroky výpočtu újmy (např. vyhodnocení výše újmy při nevhodném ořezu) ani nastavení kompenzace pro konkrétní předem vypočtenou újmu kalkulačka zatím jako samostatný výpočet nezahrnuje – je nutné postupovat podle metodického postupu (aktuální verze metodiky z r. 2021).

I v tomto případě lze pro **výběr vhodných taxonů pro nové výsadby dřevin použít mapu ekologických nároků dřevin nově vzniklou v rámci projektu TA ČR.**

Uložením náhradního opatření k nápravě dle (§ 86 odst. 1 ZOPK) přitom není dotčena případná povinnost náhrady škody podle jiných předpisů ani možnost postihu za přestupek nebo protiprávní jednání či trestný čin.

Další účely použití metodiky

Další účely, k nimž je metodika využívána, jsou následující:

- ukládání trestů v rámci přestupkových řízení vedených při poškození nebo nepovoleném pokácení dřevin rostoucích mimo les (§ 87 a § 88 ZOPK) či odůvodnění výše sankce,
- návrh náhradních opatření při hodnocení závažného zásahu autorizovanou osobou (§ 67 ZOPK),
- zpracování odborných a znaleckých posudků ve vztahu ke dřevinám.

Výpočet hodnoty dřevin pomocí metodiky AOPK ČR může sloužit i jako vhodný argument např. při plánování umístění staveb, plánování tras výkopů apod. Lze ji použít i v případě zdůvodnění výše finančních nákladů vynaložených na pravidelnou péči o dřeviny. Je také využívána pro osvětové a výukové účely v tematice ochrany přírody a krajiny (demonstrace výše společenské hodnoty dřevin).


Zohlednění oborových standardů při práci s metodikou

Při práci s touto metodikou (zejména při měření taxačních a dendrometrických parametrů stromů) je nutné zohledňovat standardy péče o přírodu a krajinu (<https://standarty.nature.cz/seznam-standardu/>), z nichž metodika vychází. Zejména se jedná o Standard péče o přírodu a krajinu A01 001 „Hodnocení stavu stromů“, který konkretizuje doporučený způsob měření taxonomických a dendrometrických parametrů stromů, a dále o Standard péče o přírodu a krajinu A02 008 „Zakládání a péče o porosty dřevin“. Pro specifické, méně časté případy neupravené přímo těmito standardy lze také doporučit další odbornou literaturu k tématu (například Kolařík a kol., 2010: Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. ČSOP Vlašim, 744 p.).

2 OCEŇOVÁNÍ SOLITÉRNÍCH STROMŮ

Zjišťování taxačních a dendrometrických parametrů se řídí ustanoveními Standardu péče o přírodu a krajinu A01 001 – Hodnocení stavu stromů⁶. Dále jsou uvedené specifické postupy týkající se konkrétní metodiky oceňování.

Schéma postupu výpočtu hodnoty stromu:



⁶ Specifické a méně časté případy neupravené přímo těmito standardy jsou popsány v další oborové literatuře (viz například Kolařík a kol., 2010: *Péče o dřeviny rostoucí mimo les II*. ČSOP Vlašim, 744 p.).

Krok 1: Určení základní hodnoty stromu

V prvním kroku postupu výpočtu hodnoty stromu se na základě **taxonu stromu** a **průměru kmene** určí základní hodnota stromu, která bude v následujících krocích upravována, podle dalších parametrů stromu.

Vstupní parametry

Taxon

Je uváděn rod, druh a případně název vnitrodruhové jednotky hodnoceného stromu vědeckým jménem. Uvádění autora vědeckého jména není nutné při uvedení citace literárního pramene v metodice hodnocení. Formální úprava uváděných jmen taxonů se řídí Mezinárodním kódem botanické nomenklatury.

V opodstatněných případech zjednodušených hodnocení, např. hodnocení po skácení dřeviny (hodnocení pařezu), případně při hodnocení stromů mimo vegetační období je možné po dohodě s objednatелеm používat i zjednodušené určování taxonů s uváděním pouze rodu stromu. Neúplné určení taxonu, případně chybné zařazení do druhu u rodů s obtížnou determinací nelze považovat za zásadní chybu hodnocení.

Účelem zařazení do taxonomické skupiny je rozčlenění taxonů do následujícího schématu:

Kategorie	Vysvětlení
A	Taxony převážně dlouhověké
B	Taxony převážně krátkověké
C	Malokorunné taxony (s modifikovanou velikostí koruny)
D	Taxony invazivních dřevin ⁷

Dimenze kmene

Dimenzi kmene je možné uvádět jako průměr (tloušťku) či obvod kmene. Vzájemný přepočtení mezi parametry je možný.

Přepočtení **průměru kmene na obvod** probíhá pomocí vzorce:

$$O = d * \pi, \quad \text{kde } O \text{ je obvod kmene, } d \text{ je průměr kmene a } \pi \text{ je Ludolfovo číslo ve tvaru } 3,1416$$

Přepočtení **obvodu na průměr kmene** opačným způsobem:

$$d = O / \pi, \quad \text{kde } O \text{ je obvod kmene, } d \text{ je průměr kmene a } \pi \text{ je Ludolfovo číslo ve tvaru } 3,1416$$

⁷ V případě jedinců záměrně vysazených, rostoucích v zastavěném a zastavitelném území s patrnou realizací výchovných a pěstebních zásahů lze ocenění provést s jejich zařazením do kategorie B (krátkověké a rychlerostoucí dřeviny).

Uvádí se zaokrouhleně na celé centimetry. Dimenze kmene se měří ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene.

Dimenze kmene se zjišťuje pomocí odpovídajících přístrojů, například pomocí průměrky či obvodového pásma. Parametr je nutné stanovit měřením, nikoliv odhadem.

- V případě, že na kmeni jsou ve výčetní výšce nerovnosti (boule, rány a podobně), se dimenze zjišťuje nad či pod nerovností tak, aby byla změřena reprezentativní hodnota žádaného parametru bez ovlivnění kořenovými náběhy či větvením.
- V případě růstu stromu na svahu se výčetní výška měří od horní hrany styku kmene s terénem.
- U roubovaných stromů, kde se místo roubování nachází přibližně mezi 100 a 160 cm výšky, se měří průměr podnože.
- Pokud se strom větví pod výčetní výškou, měří se dimenze kmene pod větvením v místě, kde není významným způsobem ovlivněna kořenovými náběhy nebo náběhy větví. Pokud to není možné, postupuje se jako při měření vícekmennů.

V případě vícekmennů jsou měřeny dimenze alespoň 4 nejsilnějších kmenů. Podle požadavků následného zpracování může být objednatelem vyžadováno měření všech kmenů. Je doporučeno uvádět počet kmenů v poznámce.

Pro účely kumulativního vyjádření dimenze kmene u vícekmennů může být využit výpočet průměr náhradního kmene přepočtem ze všech kmenů dle následujícího vzorce:

$$d = \sqrt{d_{\max}^2 + d_{\text{ostatní}}^2}$$

kde $d_{\max}$ je průměr nejsilnějšího kmene a $d_{\text{ostatní}}$ je aritmetický průměr průměrů kmenů ostatních.


Při určování dimenze kmene z pařezu se přepočtový koeficient zjišťuje referenčním měřením stromů obdobného věku a taxonu na daném stanovišti. Pokud srovnávací vzorek není k dispozici, určí se průměr kmene ve výčetní výšce pomocí funkce:

$$d_{1,3} = \frac{d_{\text{pařez}}}{1,37}$$

kde $d_{1,3}$ je průměr kmene ve výčetní výšce a $d_{\text{pařez}}$ je průměr kmene na pařezu.

Pro účely oceňování dřevin do výpočtu vstupuje dimenze kmene charakterizovaná průměrem kmene (příp. náhradního kmene) v kategoriích po:

- 1 cm mezi průměry kmene 5–29 cm,
- 5 cm od průměru kmene 30 cm.



Obr. 1: Zobrazení místa měření průměru kmene.



Obr. 2: Měření průměru kmene u nakloněného stromu.



Obr. 3: Měření průměru kmene u stromu s nerovností na kmeni.



Obr. 4: Místo měření průměru stromu větvičného se pod úroveň výčetní výšky.



Obr. 5: Místo měření průměru kmene stromu rostoucího ve svahu.



Obr. 6: a, b Místa měření průměru u vícekmennů.

Postup výpočtu

Ze seznamu taxonů (tab. 1 – viz příloha) se pro konkrétní druh či kultivar zjistí kategorie taxonu (kategorie A, B, C nebo D). Rozdělení stromů do kategorií bylo provedeno zejména podle růstových charakteristik daného taxonu a možnosti jeho nahrazení. Pokud v seznamu není uveden konkrétní kultivar, použije se základní druh nebo kultivar s obdobnými růstovými vlastnostmi.

Kategorie	Charakteristika	Mezní průměr kmene při nárůstu základní hodnoty
A	Převážně dlouhověké taxony	100 cm
B	Převážně taxony krátkověkých (pionýrských) dřevin, příp. taxony se snadnou náhradou	60 cm
C	Malokorunné taxony (kultivary) s pozměněnou charakteristikou tvaru koruny	30 cm
D	Invazivní druhy	60 cm

V případě jedinců invazivních druhů (kategorie D) záměrně vysazených, rostoucích v zastavěném a zastavitelném území s patrnou realizací výchovných a péstebních zásahů lze ocenění provést s jejich zařazením do kategorie B. Tento postup musí být v postupu ocenění řádně zdůvodněn.

Grafika 1: Výňatek z tabulky 1 „Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů“ uvedený v příloze

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
ambroň	<i>Liquidambar sp.</i>	A	nízká		nízký
ambroň západní	<i>Liquidambar styraciflua</i>	A	nízká		nízký
borovice	<i>Pinus sp.</i>	A	nízká		nízký
borovice Banksova	<i>Pinus banksiana</i>	A	nízká		nízký
borovice bělokorá	<i>Pinus leucodermis</i>	A	nízká		nízký
borovice blatka	<i>Pinus rotundata</i>	A	nízká		nízký
borovice Bungeova	<i>Pinus bungeana</i>	A	nízká		nízký
borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	B	nízká		nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora</i>	A	nízká		nízký

Podle průměru kmene daného stromu a kategorie taxonu se z tab. 2 (viz příloha) stanoví základní hodnota.

Grafika 2: Výňatek z tabulky 2 „Základní hodnota“ uvedený v příloze

Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Kategorie A (ZBHs)	Kategorie B (ZBHs)	Kategorie C (ZBHs)	Kategorie D (ZBHs)
5	16	3 030	1 780	4 090	180
6	19	4 360	2 560	5 890	260
7	22	5 940	3 490	8 010	350
8	25	7 750	4 560	10 480	450
9	28	9 820	5 770	13 250	570
10	31	12 130	7 120	16 360	710
11	35	14 670	8 620	19 800	860
12	38	17 460	10 260	23 570	1 030
13	41	20 490	12 030	27 650	1 200

Krok 2: Zohlednění objemu koruny stromu

Za účelem úpravy základní hodnoty dle aktuální velikosti koruny stromu jsou zjišťované reálné dimenze koruny hodnoceného stromu. Jedná se o úpravný koeficient, který vstupuje do výpočtu pouze v případě, že je koruna oceňovaného stromu menší, než je průměrná (tabulková) hodnota.

V případě stromů s **průměrem kmene menším než 25 cm** se objem koruny stromu nezohledňuje a ve výpočtu se pokračuje krokem č. 3.

Vstupní parametry


Pro stanovení objemu koruny je třeba změřit:

- výšku stromu,
- výšku nasazení koruny,
- průměr koruny.

Výška stromu

Výška stromu je dána vzdáleností mezi bází kmene a vrcholem koruny. V případě stromů nakloněných je tato vzdálenost dána úsečkou, která prochází vrcholem stromu a je kolmá k povrchu terénu (viz obr. 7).


Výška stromu je měřena pomocí výškoměru. Principem je měření na základě podobnosti pravoúhlých trojúhelníků, proto je třeba znát přesnou odstupovou vzdálenost. Odstupová vzdálenost je běžně počítána od báze kmene (viz obr. 7), pouze v případě nakloněného stromu je nutno tuto vzdálenost počítat od svislice z vrcholu (viz obr. 8). Nezbytné je i zvolení dostatečné odstupové vzdálenosti, neboť v opačném případě může docházet ke vzniku chyb (viz obr. 9). Výška se určuje s přesností na metry.



Obr. 7: Výška stromu.



Obr. 8: Měření výšky nakloněného stromu.




Obr. 9: Chyba vznikající při zvolení nedostatečné odstupové vzdálenosti.

Výška nasazení koruny

Výška nasazení koruny (viz obr. 10–11) se určuje jako vzdálenost mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů. Určuje se s uvažováním skutečnosti, že jeho účelem je následný reprezentativní výpočet objemu koruny. Výška nasazení koruny je udávána s přesností na metry. Rozdílem výšky stromu a výšky nasazení koruny je dán parametr „výška koruny“.



Obr. 10: Zobrazení výšky nasazení koruny.




Obr. 11: Zobrazení výšky nasazení koruny.

Průměr koruny


Průměr koruny se uvádí v metrech jako aritmetický průměr dvou na sebe kolmých měření. V případě výrazně asymetrické koruny se měří jeden průměr v nejdelsí ose a jeden na něj kolmý (viz obr. 12).



Obr. 12: Zobrazení průměru koruny.



Obr. 13: a, b Průměr koruny u stromu s asymetrickou korunou



Obr. 14: Průměr asymetrické koruny.

Postup výpočtu

Pokud má daný taxon v tabulce 1 označen tvar koruny jako „jiný“, krok 2 se vynechává.

V tomto kroku je strom hodnocen podle vytvořeného objemu koruny. Srovnáván je běžný (tabulkový) stav se stavem zjištěným (změřeným).

Na základě parametru výšky koruny a průměru koruny se z tabulky 3 a (popř. 3 b) odečte skutečný objem koruny (tzn. stav hodnotitelem zjištěný) a dle barevné legendy v téže tabulce se zjistí tvarová skupina koruny. Jehličnatým dřevinám je vždy přisuzována koruna kuželovitá.

Výsledný objem vychází v m³.

Grafika 3: Výňatek z tabulky 3 a „Skutečný objem koruny (listnaté)*“ uvedené v příloze

		Průměr koruny (m)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Výška koruny (m)	3	14	25	39	57	77	101	127	157	190	226	265
	4	19	34	52	75	103	134	170	209	253	302	354
	5	24	42	65	94	128	168	212	262	317	377	442
	6	28	50	79	113	154	201	254	314	380	452	531
	7	33	59	92	132	180	235	297	367	443	528	619
	8	38	67	105	151	205	268	339	419	507	603	708
	9	42	75	118	170	231	302	382	471	570	679	796
	10	47	84	131	188	257	335	424	524	634	754	885

Z tabulky 4 (viz příloha) se určí podle průměru kmene hodnoceného stromu a tvarové skupiny koruny (viz tabulka č. 3) hodnota tabulkového objemu vyjadřující běžný stav pro daný průměr a tvarovou skupinu koruny. Bez ohledu na kategorii taxonu (A, B, C či D) se odečítá tabulkový objem koruny až

do průměru kmene 100 cm. U stromů s větším průměrem kmene se počítá s maximálními tabulkovými objemy korun pro jednotlivé tvarové skupiny korun (tzn. 749 m³ pro kuželovitou korunu, 442 m³ pro sloupovitou korunu, 1257 m³ pro zaoblenou korunu a 1830 m³ pro kulovitou korunu).

Grafika 4: Výňatek z tabulky 4 „Tabulkový objem koruny stromů“ uvedené v příloze

Průměr kmene [cm]	Obvod kmene [cm]	Objem koruny [m ³]			
		Kuželovitá koruna	Sloupovitá koruna	Zaoblená koruna	Kulovitá koruna
25–30	79–96	39	110	148	153
31–35	97–112	58	132	203	188
36–40	113–128	83	152	267	229
41–45	129–144	115	169	338	278
46–50	145–159	157	186	415	336
51–55	160–175	209	202	498	407
56–60	176–191	272	219	586	494
61–65	192–206	346	237	676	602

Pokud je skutečný objem koruny hodnoceného stromu větší nebo rovný objemu tabulkovému, základní hodnota vypočtená až do tohoto kroku se nemění. Pokud je však skutečný objem koruny menší nežli tabulkový, upraví se základní hodnota proporcionálně. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla.

Krok 3: Zohlednění zdravotního stavu a vitality

Aktuální stav stromu může významným způsobem modifikovat perspektivu stromu, a tím i jeho hodnotu. Stav stromu je charakterizovaný základními diagnostickými parametry, vycházejícími ze Standardu péče o přírodu a krajinu A01 001 – Hodnocení stavu stromů:

- vitalitou
- zdravotním stavem⁸.

Vstupní parametry

Vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost. Do tohoto diagnostického pohledu jsou zahrnuty především následující ukazatele:

- rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic),
- změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,
- významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,
- dynamika vývoje sekundárních výhonů,

⁸ Stabilita není brána v potaz proto, že se jedná o podmnožinu zjištěných parametrů, zahrnutých v charakteristice zdravotního stavu.

- změny formy větvení vrcholové části koruny,
- prosychání na periferii koruny,
- dynamika reakce na poškození,
- u fyziologického stáří 1–3 (vývojové fáze mladého jedince s dynamicky probíhajícím výškovým přírůstem) aktivita výškového přírůstu.

Použitá stupnice je následující:

1 výborná až mírně snižená

- hustě olistěná kompaktní koruna,
- bez známek prosychání na periferii (možné výjimky při růstu v částečném zástínu),
- ve vrcholové partii dlouhodobý vývoj makroblastů z vrcholového i postranních pupenů (bez výjimky u jedinců s fyziologickým stářím 1–3),
- bez vývoje sekundárních výhonů (možné výjimky při výrazné změně poměrů osvětlení – redukce koruny, uvolnění z porostu apod.),
- u stálezelených jehličnanů počet ročníků jehličí odpovídající taxonu,
- vývoj kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva.

2 zřetelně snižená

- patrná defoliace koruny s její možnou fragmentací na periferii,
- prosychání bočních partií koruny nevyvolané zástínem s tendencí jejího dalšího prosychání (většinou se netýká vrcholové partie),
- ve vrcholové partii koruny častý vývoj brachyblastů z postranních pupenů,
- možný spontánní vývoj sekundárních výhonů v koruně, na kmeni či v okolí báze kmene i bez změn stanoviště,
- snížený počet ročníků jehličí u stálezelených jehličnanů,
- snížený vývoj kalusu a ránového dřeva (druhově specifické), event. reakčního dřeva.

3 výrazně snižená

- významná defoliace koruny (až do cca 50 %),
- koruna významně fragmentovaná,
- dynamické prosychání nevyvolané zástínem s tendencí dalšího sestupu; často suchá vrcholová partie koruny,
- brachyblasty se vyvíjí jak z postranních, tak i z vrcholových pupenů,
- u stálezelených jehličnanů pouze 1–2 ročníky jehličí.

4 zbytková

- defoliace koruny významně nad 50 %,
- pouze některé části koruny vykazují živý asimilační aparát, většina koruny odumřelá.

5 suchý strom

- zcela odumřelý jedinec.



Obr. 15: Vitalita výborná až mírně snižená.



Obr. 16: Vitalita zřetelně snižená.



Obr. 17: Vitalita výrazně snižená.



Obr. 18: Vitalita zbytková.



Obr. 19: Suchý strom.

Zdravotní stav

Parametr zdravotního stavu odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanické integrity, přítomnosti růstových defektů, růstových deformací, stupně kolonizace dřevními houbami apod. Pozor na užší vymezení tohoto termínu např. v rostlinolékařské praxi nebo v lesnictví, kde se jako „zdravotní stav“ označuje pouze jistý utilitární výsek obsahu, definovaného pro obor arboristika. Při aplikaci této metodiky se opíráme o níže uvedené arboristické definice zdravotního stavu stromu vycházející ze Standardů péče o přírodu a krajinu.

Použitá stupnice je následující:**1 výborný až dobrý**

- bez patrných mechanických poškození kmene a silnějších větví (možná přítomnost ran po vhodné prováděném řezu),
- bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 5 cm),
- žádné symptomy infekce dřevními houbami (výjimečně možná přítomnost saprofytů na odumřelém dřevě),
- případné defektní větvení (i v kosterním větvení) pouze ve stádiu vývoje.

2 zhoršený

- možná přítomnost poškození na kmeni či větší poškození větví,
- patrné symptomy infekce dřevními houbami v počátečních fázích vývoje,

- možná přítomnost silných suchých větví, vylomené či zlomené silnější větve,
- možná přítomnost ojedinělých výletových otvorů v koruně,
- vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v kosterním větvení,
- možná přítomnost trhlin na kmeni či v kosterních větvích,
- možná přítomnost „rakovinných“ útvarů,
- nerovnovážený přírůst podnože a roubu, případně patrná inkonzistence v oblasti spoje.

3 výrazně zhoršený

- mechanická poškození kmene se symptomy aktivně probíhající infekce dřevními houbami,
- rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových otvorů ve více úrovních,
- rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních větví,
- odlomená část koruny,
- vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve větvení silných větví,
- podezření na zásah do mechanicky významného kořenového talíře.

Jednotlivé zásadní defekty se nevyskytují ve vzájemné kombinaci. Při souběhu více než 2 výše popsaných defektů přechod na zdravotní stav 4.

4 silně narušený

- rozsáhlé dutiny ve kmeni,
- symptomy infekce či rozsáhlého narušení mechanicky významného kořenového talíře,
- vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se symptomy infekce dřevními houbami,
- odlomená podstatná část koruny,
- stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v důsledku mechanických poškození.

Obecně se jedná o souběh více závažných defektů.

5 havarijný/rozpadlý strom

- celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo).

Jako poškození dřeviny mohou být orgánem ochrany přírody kvalifikovány i zásahy, které mají vliv na zdravotní stav nebo vitalitu stromu (např. mechanické poškození kmene nebo větví)⁹. Výsledná společenská/ekologická újma je následně vyčíslena rozdílem celkové hodnoty stromu před zásahem (poškozením) a po něm. Hodnotami, které popisují rozsah poškození, jsou většinou právě zdravotní stav a vitalita stromu.

⁹ Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. „Nedovolenými zásahy do dřevin se rozumí takové poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.“



Obr. 20: Zdravotní stav výborný až dobrý.



Obr. 21: Zdravotní stav zhoršený.



Obr. 22: Zdravotní stav výrazně zhoršený.



Obr. 23: Zdravotní stav silně narušený.



Obr. 24: Havarijní/rozpadlý strom.

Postup výpočtu

Pomocí koeficientu z tabulky 5, zjištěného na základě zdravotního stavu a vitality stromu, se provede úprava základní hodnoty. Základní hodnota z předchozího kroku se vynásobí koeficientem z tabulky 5. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla.

Grafika 5: Tabulka č. 5 zohledňující stav stromu uvedená v příloze

		Zdravotní stav				
		1	2	3	4	5
Fyziologická vitalita	1	1	0,8	0,6	0,4	x
	2	0,8	0,7	0,5	0,3	0,01
	3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,01
	4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,01
	5	x	0,01	0,01	0,01	0,01

Krok 4: Zohlednění nevhodného řezu

K tomuto kroku přistupujeme pouze v případě, když strom byl poškozen nevhodným řezem. Pokud tomu tak není, krok 4 je ve výpočtu hodnoty stromu vynechán.


Kvalifikaci řezu jako nevhodného zásahu do koruny stromu provádí kvalifikovaná osoba se zohledněním zásad Standardu péče o přírodu a krajinu A02 002 – Řez stromů, případně A02 009 – Speciální zásahy na stromech.

Pozn. Pokud je strom poškozen nevhodným řezem, může dojít zároveň ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Nevhodný ořez můžeme tedy ve výpočtu zohlednit dle postupu popsáném v kroku 4 nebo vyčíslením rozdílu hodnoty stromu před poškozením a po poškození (se zohledněním změněné hodnoty zdravotního stavu).

Vstupní parametry

Odebraný objem koruny

Rozsah objemu koruny odstraněné nevhodným řezem se stanovuje odhadem s přesností na desítky procent.



Obr. 25: Schéma odhadu části koruny odebrané nevhodným řezem.



Obr. 26: Příklad části koruny odebrané nevhodným řezem.

Postup výpočtu

Kvalifikovaným odhadem se určí objem odebrané části koruny v desítkách procent.

Určí se snížení základní hodnoty a to tak, že procentuální část základní hodnoty (odpovídající procentu odebrané části koruny) se vynásobí koeficientem zjištěným v tabulce 6 podle stupně regenerovatelnosti (uvedeného v tab. 1) daného taxonu a fyziologické vitality.

Grafika 6: Výňatek z tabulky 1 „Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů“ uvedené v příloze

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
ambroň	<i>Liquidambar sp.</i>	A	nízká		nízký
ambroň západní	<i>Liquidambar styraciflua</i>	A	nízká		nízký
borovice	<i>Pinus sp.</i>	A	nízká		nízký
borovice Banksova	<i>Pinus banksiana</i>	A	nízká		nízký
borovice bělokorá	<i>Pinus leucodermis</i>	A	nízká		nízký
borovice blatka	<i>Pinus rotundata</i>	A	nízká		nízký
borovice Bungeova	<i>Pinus bungeana</i>	A	nízká		nízký
borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	B	nízká		nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora</i>	A	nízká		nízký

Grafika 7: Výňatek z tabulky 6 „Koeficient pro zohlednění nevhodného řezu“ uvedené v příloze

Stupeň regenerovatelnosti	Fyziologická vitalita				
	1	2	3	4	5
vysoký	0,2	0,3	0,4	0,5	–
střední	0,6	0,7	0,8	0,9	–
nízký	0,9	0,9	1	1	–

Ze základní hodnoty (z předchozího kroku) se odečte vypočítané snížení hodnoty a výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla.

Krok 5: Zohlednění polohového koeficientu

Růstový kontext stromu ovlivňuje jednak jeho význam na stanovišti a jednak jeho perspektivu. Zhodnocení hlavních parametrů růstového kontextu je proto důležitou součástí procesu oceňování.

Vstupní parametry

Atraktivita umístění stromu

Parametrem nazvaným jako atraktivita umístění stromu zohledňujeme parametry lokality, na které se strom nachází. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a význam stromu jako estetického či prostoro-
rovného (kompozičního) prvku na daném místě včetně jeho vizuálního efektu.

Použité kategorie jsou následující:

Vysoká

- pohledově významný solitérní strom nebo prvek malé skupiny stromů ve vysoce frekventovaném veřejném prostoru měst a obcí, historických a kulturních objektech, strom nebo malá skupina stromů jako významná krajinná dominanta mimo zastavěná území.

Střední

- strom, který je součástí většího významného prostorově či vizuálně se uplatňujícího vegetačního prvku nebo struktury zeleně v rámci zastavěného území či krajiny – stromořadí, aleje, okraje skupin stromů, remízy apod.
- do této kategorie je zařazovaná doprovodná zeleň komunikací bez ohledu na třídu komunikace.

Méně významná

- strom situovaný v méně přístupných či frekventovaných lokalitách nebo lokalitách, které jsou v rámci širšího okolního prostoru z větší míry pohledově uzavřené, strom s menším prostorovým či vizuálním uplatněním v zastavěném území či krajině.

Nízká

- strom jako součást okraje přibližně stejnorodého porostu v zastavěném území či v krajině, významně se nelišící od ostatních jedinců.

Velmi nízká

- strom jako součást vnitřní části přibližně stejnorodého porostu v zastavěném území či v krajině, významně se nelišící od ostatních jedinců.



Obr. 27: Atraktivita umístění stromu „vysoká“.



Obr. 28: Atraktivita umístění stromu „střední“.



Obr. 29: Atraktivita umístění stromu „méně významná“.



Obr. 30: Atraktivita umístění stromu „nízká“.



Obr. 31: Atraktivita umístění stromu „velmi nízká“.

Růstové podmínky stromu

Parametr označený jako růstové podmínky stromu zohledňuje stanoviště z hlediska velikosti prokořenného prostoru a půdních podmínek pro růst a vývoj jedince, resp. nahraditelnost stromu na daném místě. Prostor pro rozvoj koruny je hodnocen pouze v případech, kdy významným způsobem ovlivňuje možnost udržení jedince na stanovišti bez možnosti řešení péstebním zásahem (řezem). Se zhoršujícími se růstovými podmínkami adekvátně narůstá hodnota stromu, protože se tak komplikuje možnost jeho náhrady na daném stanovišti. Růstové podmínky stromu se hodnotí vizuálně v prostoru daném průmětem koruny dospělého jedince daného taxonu.

Použité kategorie jsou následující:**Neovlivněné**

- stromy rostoucí v zastavěném území i v krajině, kde je bez omezení umožněn růst a vývoj jejich nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází nebo dochází jen minimálně k negativnímu ovlivňování půdních poměrů stanoviště.

Dobré

- stromy rostoucí v místech, kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jejich podzemních, popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy působením pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti stromů apod.).

Zhoršené

- stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí, a to okolní zástavbou nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky jsou významně zhoršené, půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná.

Extrémní

- stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy popř. i nadzemních částí a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst (působením chemických látek, solením, zhutňováním půdy apod.). Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do bezprostřední blízkosti báze kmene, zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně zásadních hodnot.



Obr. 32: Růstové podmínky „neovlivněné“.



Obr. 33: Růstové podmínky „dobré“.



Obr. 34: Růstové podmínky „zhoršené“.



Obr. 35: Růstové podmínky „extrémní“.

Postup výpočtu

Do výpočtu společenské/ekologické hodnoty vstupuje hodnocení atraktivity a růstových podmínek stromů pomocí koeficientu s následující konstrukcí:

Grafika 8: Tabulka č. 7 „zohlednění polohové koeficientu“ uvedená v příloze

Růstové podmínky	Atraktivita umístění stromu				
	vysoká	střední	méně významná	nízká	velmi nízká
neovlivněné	0,8	0,6	0,4	0,2	0,03
dobré	0,85	0,7	0,5	0,3	0,05
zhoršené	0,9	0,8	0,6	0,4	0,1
extrémní	1	0,85	0,7	0,5	0,2

Pokud se jedná o památný strom, vyhlášený dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, polohový koeficient je roven 2. V ostatních případech je polohový koeficient určen na základě atraktivity umístění stromu a růstových podmínek z tabulky 7.

Základní hodnota upravená dle předchozích kroků se vynásobí příslušným polohovým koeficientem. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla.

Krok 6: Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem

Pro vyjádření zvýšené biologické hodnoty, vztahující se zejména k prvkům s potenciálním výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů organismů je určena následující část metodického postupu:

Do oceňování stromů v kroku 6 vstupuje kvantifikovaný rozsah biologicky hodnotných mikrohabitátů – prvků se zvýšeným biologickým potenciálem. Součástí procesu oceňování přitom není detailní fytopatologický či biologický průzkum stromů. Jedná se pouze o základní evidenci prvků, které mohou představovat potenciál pro osídlení těmito doprovodnými organismy.

Ke kroku 6 přistupujeme pouze v případě, že na stromě byly detekovány prvky se zvýšeným biologickým potenciálem, jejichž bodový součet je alespoň 2 body. V opačném případě vynecháme krok 6 i návazné kroky 7 a 8 a pokračujeme krokem 9.

Vstupní parametry

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem

Prvkem se zvýšeným biologickým potenciálem se rozumí místa na stromě (mikrohabitaty), která vykazují významně zvýšenou atraktivitu pro doprovodné organismy. Hodnotí se prvky, které se vymykají obecné základní ekologické hodnotě stromu jako biologického prvku a které představují evidentní zvýšení biologického potenciálu předmětného stromu. Pro konstrukci seznamu mikrohabitátů byl využit Catalogue of tree microhabitats, European Forest Institute, 2016¹⁰. Pro referenci jsou u každého typu mikrohabitatu uvedeny kódy z Catalogue of tree microhabitats.

Pozn. Níže uvedené prvky se zvýšeným biologickým potenciálem slouží k orientaci při hodnocení ekologické funkce stromu dle logiky metodiky.

Červeně jsou označené obzvláště hodnotné prvky, které mohou mít v případě extenzivního (roz-sáhlého) výskytu zdvojnásobenou hodnotu = 2 body.

Dutiny a otvory	
Dutiny od ptáků, dutinky	
(Woodpecker cavities – CV11 až CV15) – vstupní a výletové otvory (průměr cca 5–10cm) doupného ptactva, zpravidla datlovitých ptáků.	

10 V českém překladu viz Kraus, D a kol. (2016). Seznam stromových mikrobiotopů – Terénní příručka. Integrate+ Technický článek. 16 str.

Kmenové dutiny	
(Trunk and mould cavities – CV21 až CV26) – částečně otevřené až zcela otevřené dutiny různého tvaru, rozsahu a lokalizace s možnou přítomností hniloby.	
Dutiny po větvích	
(Branch holes – CV31 až CV33) – dutiny, vzniklé po odlomení či odstranění významnějších větví (průměr cca 5–10 cm).	
Vodní kapsy	
(Dendrotelms and water-filled holes – CV41 až CV44) – prohlubně a dutiny se zadržanou vodou (např. v úžlabích větví, v oblasti paty kmene a kořenových náběhů).	
Hmyzí požerky a otvory	
(Insect galleries and bore holes – CV51 a CV52) – síť drobných výletových otvorů (zpravidla do průměru cca 2cm) saproxylofágního hmyzu lokalizovaná ponejvíce v oblasti kmene.	

Poškození (koruny a kmene) a známky kolonizace	
Ztráta kůry (Bark loss / exposed sapwood – IN11 až IN14) – absence kůry/obnažená běl na kmeni v různém rozsahu, za významnější ztrátu borky je považována plocha cca 600 cm² a více.	
Přítomnost rozštípnutého dřeva (Exposed heartwood / trunk and crown breakage IN21 až IN24) – rozštípnuté dřevo většího rozsahu, obnažené jádrové dřevo, rozhraní mrtvého a živého dřeva, přítomnost hniloby (např. odlomené částí koruny, zlomy kosterních větví, roztržení tlakové vidlice, rozlomení či ukroucení kmene větrem, rozštípnuté části dřeva apod.).	
Trhliny a nezahojené jizvy (Cracks and scars – IN31 až IN34) – poranění s různou příčinou vzniku ve tvaru linie (délka cca 30–100 cm, hloubka alespoň 10 cm) nebo i plochy (alespoň 600 cm²), které prostupují přes borku až do vnitřních pletiv stromu.	
Odlupující/odchylující se borka (Bark pockets – BA11 až BA21) – odlupující se borka s plochou nad 100 cm², kdy se mezi dřevem a borkou tvoří kapsy. Zahnuje se do hodnocení pouze v případech, kdy se evidentně jedná o dlouhodobě fungující mikrohabitat.	

Výtoky mýzy a exudátů (Sap and resin run – OT11 a OT12) – vytékající tekutina (často zabarvená či fermentovaná) z trhlín, poranění a dutin.	
Plodnice hub (Fruiting bodies, fungi – EP 11 až EP13) – přítomnost plodnic hub na kmeni a kosterních větvích, podstatné jsou zejména vytrvalé (víceleté) plodnice, případně masivní kolonizace plodnic jednoletých.	
Odumřelé části	
Suché odumřelé větve (Dead branches and limbs / crown deadwood – DE11 až DE15), přítomnost suchých větví, popřípadě i větších pahýlů, stále však v kontaktu se živým dřevem. Za významnější se považují suché větve od průměru 20 cm a více při minimální délce 1 m. Zahrnují se pouze větve, které není nutné odstranit za účelem zajištění provozní bezpečnosti stanoviště.	
Pahýly po větvích (Stumps of branches) – zbytky po odlomených silných větvích v koruně (průměr větve alespoň 15 cm) zakončené přirozeným zlomem za úrovní větvního límečku. Mohou být doprovázené jizvou po vytržení pletiv kmene.	

Růstové a tvarové deformace	
Zduřené, členité kořenové náběhy	
(Root buttress cavities – GR11 až GR13) – členité či zduřelé kořenové náběhy s přirozeně vzniklými dutinami a úžlabími.	

Postup výpočtu

Při výpočtu vycházíme ze základní hodnoty získané krokem 1.

Provede se součet bodové hodnoty prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, přičemž každý typ prvku je ohodnocen 1 bodem, vybrané prvky (označené červeným písmem) s extenzivním charakterem mohou mít hodnotu 2 bodů.

Na základě bodového součtu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem se z tabulky 8 odečte koeficient.

Grafika 9: Tabulka 8 „Koeficienty pro počet bodů dle typu prvku se zvýšeným biologickým potenciálem“ uvedená v příloze

Součet bodů dle výskytu prvků se zvýšeným biol. potenciálem	Koeficient
2	0,1
4 až 6	0,2
7 a více	0,3

Základní hodnota (shodná s hodnotou v kroku 1) se vynásobí koeficientem z tabulky 8 (zohledňujícím počet bodů dle typu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem).

Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla. Dále pokračujeme krokem 7.

Krok 7: Zohlednění biologického významu taxonu stromu

Biologickým významem taxonu (s kategoriemi nízký, střední a vysoký) rozumíme souhrn druhově specifických vlastností, který zahrnuje původnost daného taxonu v rámci České republiky a atraktivitu stromu pro různé druhy živočichů, které jsou na něj vázány v průběhu svého vývoje. Biologický význam taxonu je stanoven v tabulce 1.

Grafika 10: Výňatek z tabulky 1 „Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů“ uvedený v příloze

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
ambroň	<i>Liquidambar sp.</i>	A	nízká		nízký
ambroň západní	<i>Liquidambar styraciflua</i>	A	nízká		nízký
borovice	<i>Pinus sp.</i>	A	nízká		nízký
borovice Banksova	<i>Pinus banksiana</i>	A	nízká		nízký
borovice bělokora	<i>Pinus leucodermis</i>	A	nízká		nízký
borovice blatka	<i>Pinus rotundata</i>	A	nízká		nízký
borovice Bungeova	<i>Pinus bungeana</i>	A	nízká		nízký
borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	B	nízká		nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora</i>	A	nízká		nízký

Postup výpočtu

Podle biologického významu taxonu (uveden v tab. 1) se určí z tabulky 9 příslušný koeficient.

Grafika 11: Tabulka 9 „Biologický význam taxonu“ uvedená v příloze

Biologický význam taxonu		
Nízký	Střední	Vysoký
0,6	0,8	1

Koeficient z tabulky 9 se vynásobí základní hodnotou získanou v kroku 6. Výsledek se matematicky zaokrouhlí na celá čísla.

Krok 8: Výpočet základní hodnoty stromu s prvky se zvýšeným biologickým potenciálem

Postup výpočtu

Celková základní hodnota stromu, u kterého zohledňujeme výskyt prvků se zvýšeným biologickým potenciálem, je dána součtem základní hodnoty z kroku 5 a kroku 7.

Krok 9: Výpočet hodnoty stromu v korunách

Hodnota stromu v peněžních jednotkách platná pro aktuální rok je určena vynásobením základní hodnoty inflačním koeficientem platným pro daný rok. Pro výpočet je použita průměrná roční míra inflace (index spotřebitelských cen) každoročně zveřejňovaná Českým statistickým úřadem (www.czso.cz), zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

Hodnoty v textu metodiky jsou uvedeny v cenové úrovni roku 2020. Od této verze metodiky z roku 2021 se pro přepočet hodnoty pro aktuální rok používá nejnovější inflační koeficient dostupný k 1. 1. aktuálního roku.¹¹

Výsledná hodnota stromu se matematicky zaokrouhlí na celé koruny.

¹¹ Oproti verzi metodiky 2018 nedochází již k přepočtu v průběhu ledna o novější inflační koeficient publikovaný později v lednu. Úprava cenové úrovně je tedy prováděna s ročním zpožděním, nikoli k cenové úrovni roku předchozího jako dosud. Důvodem je požadavek na použití jednotného koeficientu pro celý rok (i pro využívání metody od prvních dnů nového roku, kdy při dosavadní praxi ještě nebyly k dispozici informace o výši inflace z předcházejícího roku).

Tj. pro roky 2021 a 2022 se použijí hodnoty vycházející přímo z metodiky, jedná se o hodnoty v cenové úrovni roku 2020; od roku 2023 včetně se hodnota přepočte inflačním koeficientem dostupným k 1.1. daného roku (v roce 2023 budou tedy výsledné hodnoty v cenové úrovni roku 2021).

3 PŘÍPADOVÁ STUDIE – SOLITÉRNÍ STROM

Borovice lesní (*Pinus sylvestris*) rostoucí na sídlišti s následujícími parametry:

- průměr kmene 62 cm,
- výška stromu 15 m
- výška nasazení koruny 2 m,
- průměr koruny 8 m,
- vitalita výborná až mírně snížená (1)
- zdravotní stav výrazně zhoršený (3)
- atraktivita umístění stromu méně významná
- růstové podmínky neovlivněné



Ukázka 1: borovice lesní

Krok 1: Určení základní hodnoty stromu

Z tab. 1: borovice lesní (*Pinus sylvestris*) – kategorie A

Z tab. 2: pro průměr kmene 62 cm (tzn. 61–65 cm) a kategorii A je základní hodnota 481 180

Krok 2: Zohlednění objemu koruny stromu

Z tab. 3b: skutečný objem koruny

- pro průměr koruny 8 m a výšku koruny 13 m (výška stromu – výška nasazení koruny) je skutečný objem koruny 217 m³.

Z tab. 4: tabulkový objem koruny

- pro průměr kmene 62 cm (tzn. 61–65 cm) a kuželovitý tvar koruny (platí pro všechny jehličnany) je tabulkový objem koruny 346 m³.

Protože skutečný objem koruny je menší, než by měl být (než tabulkový objem koruny), proporcionálně snížíme hodnotu následujícím způsobem:

$$481180 \cdot 217/346 = 301\,781$$

Krok 3: Zohlednění zdravotního stavu a vitality

Z tab. 5: pro vitalitu 1 a zdravotní stav 3 je koeficient 0,6

$$301\,781 \cdot 0,6 = 181\,069$$

Krok 4: Zohlednění nevhodného řezu

V tomto případě se neřeší, postupujeme k následujícímu kroku.

Krok 5: Zohlednění polohového koeficientu

Z tab. 7: pro atraktivitu umístění méně významnou a růstové podmínky neovlivněné je koeficient 0,4

$$181\,069 \cdot 0,4 = 72\,427,6$$

Po zaokrouhlení 72 428.

Krok 6: Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem

V tomto případě se neřeší.

Krok 7: Zohlednění biologického významu taxonu

V tomto případě se neřeší.

Krok 8: Výpočet hodnoty stromu s prvky se zvýšeným biologickým potenciálem

V tomto případě se neřeší.

Krok 9: Výpočet hodnoty stromu v peněžních jednotkách

Hodnota stromu v peněžních jednotkách je určena vynásobením základní hodnoty (v tomto případě hodnota z kroku 5) inflačním koeficientem platným pro daný rok.

Hodnota stromu v peněžních jednotkách platná k roku 2021 i 2022 je přímo rovna výše vypočtené hodnotě z kroku 5, tzn. 72 428 Kč. Jedná se o hodnotu stromu v cenové úrovni roku 2020¹²

¹² Pro současnou verzi metodiky z roku 2021 se bude s inflačním koeficientem počítat až od roku 2023, kdy bude k dispozici inflační koeficient pro přepočtení na cenovou úroveň roku 2021.

4 OCEŇOVÁNÍ POROSTU DŘEVIN

Porostem se pro účely metodiky oceňování míní soubor dřevin (keřovitého, stromovitého růstu nebo jejich kombinace, případně v kombinaci s porosty popínavých dřevin), které vytváří kompaktní celek plošného charakteru se specifickými podmínkami (např. mikroklimatem, převážně souvislým zápojem, vzájemnými vazbami), v němž se dřeviny významně ovlivňují a zpravidla si konkurují.

Definice „Porostu“ vyplývá z výkladu k zákonu č. 114/1992 Sb. dle Metodické instrukce MŽP ČR (Věstník MŽP, Ročník XXXI, duben 2021, Částka 4):

Porostem se rozumí soubor dřevin (keřovitého, stromovitého vzrůstu nebo jejich kombinace), který vytváří kompaktní celek plošného charakteru se specifickými podmínkami (např. mikroklimatem, převážně souvislým zápojem, vzájemnými vazbami), v němž se dřeviny významně ovlivňují a zpravidla si konkurují, a který vyžaduje výchovnou probírku nebo v něm dochází k samovolné redukci počtu jedinců. Za porost proto nelze např. považovat stromořadí (liniové uspořádání stromů ve smyslu §1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb.) nebo jiné skupiny dřevin (např. rozvolněnou skupinu dřevin nebo solitérních jedinců v parcích a na hřbitovech, příp. i ve volné krajině), ve kterých nevnikají specifické podmínky porostu a vzájemné působení dřevin, a tudíž i výchovné zásahy jsou minimalizovány, resp. mají charakter ošetřování jednotlivých dřevin. Typickým příkladem porostu je zapojený porost dřevin ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb. nebo intenzivně pěstovaný zapojený ovocný sad.

Vyhláška č. 189/2013 Sb. definuje „Zapojený porost dřevin“ následujícím způsobem:

§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zapojeným porostem dřevin porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v porostu přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

V případech porostů s významně odlišným charakterem skladby (věkové, druhové, prostorové, pěstební apod.) je třeba provádět popis a ocenění porostů po částech, odpovídajících si hlavními znaky. Totéž pravidlo platí v případech, kdy se v porostu nachází individuální dřeviny, které svým vzrůstem (dendrometrickými dimenzemi) významně převyšují okolní porost.

Stromy s obvodem kmene >80 cm rostoucí v porostu se oceňují individuálně metodickým postupem pro ocenění solitérních stromů. Pozor na případy, kdy může docházet k odstraňování i stromů tohoto typu v rámci pěstebních opatření (probírek) – v takových případech ovšem neprobíhá povolování kácení dle §8 odst 1. zákona č. 114/1992 Sb. a oceňování společenské/ekologické újmy není proto relevantní.

Stromy ve skupinách dřevin s menším průměrem než 80 cm se preferenčně oceňují jako porost dřevin. Individuální ocenění takovýchto stromů je ale možné jako alternativní postup ve zvláště

opodstatněných případech. Dřeviny rostoucí v porostu oproti soliterám vykazují celou řadu specifických parametrů (redukovaný průmět koruny, zvýšená výška nasazení koruny, zástin části koruny okolními jedinci apod.), které při srovnávacích studiích ve většině případů vyrovnávají hodnotu jednotlivě oceňovaných stromů s odstraněním plochy porostu v m² dané průmětem jejich korun.

Zjišťování taxačních a dendrometrických parametrů porostů dřevin se řídí ustanoveními Standardu péče o přírodu a krajinu A02 008 – Zakládání a péče o porosty dřevin. Dále jsou uvedena pouze základní pravidla a specifické postupy, týkající se konkrétně metodiky oceňování dřevin.

Krok 1: Určení základní hodnoty porostu

Vstupní parametry

Charakter porostu dřevin a taxonomická skladba

Taxonem je míněn druh dřeviny včetně kultivarů. Pro účely metodiky oceňování není nutné stanovovat konkrétní taxonomickou skladbu oceňovaného porostu, ale pouze jeho převažující charakter. Zastoupení dřevin s invazivním charakterem má vliv na zařazení do kategorie Vhodnosti porostu.

Keře nízké

Porost dřevin tvořený druhy keřů s výškou v dospělosti dosahující přibližně do 1 m.



Obr. 36: Keře nízké.

Keře střední a vysoké


Porost dřevin tvořený druhy keřů s výškou v dospělosti dosahující větších rozměrů než je výška 1 m.



Obr. 37: Keře střední a vysoké.

Liány

Porost tvořený dřevitými liánami (popínavkami) bez dalšího rozlišení.



Obr. 38: Liány.

Porost stromů

- **Mladý porost** – zahrnuje fázi kultury, náletu/nárostu, mlaziny a tyčkoviny. V této vývojové fázi probíhají především ochranné a výchovné zásahy.
- **Porost středního věku** – zahrnuje fáze tyčoviny a nastávající kmenoviny, tedy stromy s výčetní tloušťkou 7–25 cm (tj. s obvodem cca do 80 cm).
- **Dospívající a dospělý porost** – je vývojová fáze, kdy v porostu začínají převládat jedinci s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
- **Věkově a prostorově diferencovaný porost** – představuje porost s výraznou porostní stratifikací s přítomností více vývojových fází; zahrnuje také porosty s vysokou biologickou hodnotou (senescentní).

Pozn. V případě porostu dřevin s rozdílným charakterem v jednotlivých částech je vhodné porost rozdělit na homogenní části a tyto ocenit zvlášť. Celková hodnota porostu dřevin bude potom dána součtem hodnot jednotlivých částí.



Obr. 39: Mladý porost.



Obr. 40: Porost středního věku.



Obr. 41: Dospívající a dospělý porost.



Obr. 42: Věkově a prostorově diferencovaný porost.

Postup výpočtu

Pro daný charakter porostu dřevin se z tabulky č. 10 odečte základní hodnota za 1 m².

V případě, že je porost na zájmové ploše tvořen různými typy dřevin, je vhodné jej rozdělit na části se shodným charakterem a tyto potom ocenit zvlášť. Hodnota porostu bude potom dána součtem hodnot jeho jednotlivých částí.

Grafika 12: Tabulka č. 10 „Základní hodnota porostu dřevin“ uvedená v příloze

Charakter porostu dřevin	Doplňková charakteristika	Základní hodnota za 1 m ²
Keře nízké		810
Keře vysoké		520
Liány		650
Porost stromů	mladý porost	430
	porost středního věku	600
	dospívající a dospělý porost	810
	věkově a prostorově diferencovaný porost	650

Krok 2: Zohlednění vhodnosti a pěstebního stavu porostu

Vstupní parametry

Vhodnost porostu

Vyjadřuje hodnotu porostu zejména z pohledu jeho druhové skladby, vhodnosti a nahraditelnosti na daném stanovišti¹³.

Porost invazivních dřevin – Porost dřevin s dominancí (početní či strukturální) invazivních druhů. Příměs ostatních dřevin je buď prostorově nevýznamná nebo se jedná o dřeviny zastíněné v podrostu bez předpokladu možného rozvoje po odstranění zástupců invazivních druhů. Cíleně založené a pravidelně udržované porosty s dominantním zastoupením dřevin, které patří mezi taxony s invazivním potenciálem (tab. 11) lze v opodstatněných případech – zejména porostů v zastavěném a zastavitelném území – označit jako „ostatní“.

Nežádoucí – porost tvořený dřevinami, které nejsou na daném stanovišti vhodné s ohledem na jejich ekologické optimum či lokalizaci a funkci, často s příměsí druhů s invazivním charakterem.

Vhodný – porost dřevin, často záměrně vysázen, s vhodnou druhovou skladbou, tvořený převážně původními dřevinami nebo dřevinami vhodnými vzhledem k jejich ekologickému optimu i jejich lokalizaci a funkci. Dále sem řadíme porosty, které mají ochranný charakter (např. porosty se zvýšenou půdoochrannou, vodoochrannou a klimatickou funkcí, porosty potřebné pro zachování biologické rozmanitosti).

Ostatní – porost dřevin, který svou povahou nespadá do žádné z obou extrémních kategorií

Jako invazivní jsou označovány následující taxony dřevin¹⁴:

Grafika 13: Tab. č. 11 „Seznam invazivních dřevin“ uvedená v příloze

Odborný název	Český název
<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý
<i>Ailanthus altissima</i>	pajasan žláznatý
<i>Amorpha fruticosa</i>	netvařec křovitý
<i>Fallopia aubertii</i>	opletka čínská
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský
<i>Lycium barbarum</i>	kustovnice cizí

¹³ Při ojedinělém výskytu významných stromů v porostu oceňování těchto stromů probíhá individuálním způsobem.

¹⁴ Výběr druhů do seznamu invazivních dřevin vychází z dřevin uvedených v kategorii *BL 2 BLACKLISTU* (Pergl a kol., 2016), s výjimkou dřevin, které se běžně uplatňují v zahradní a krajinářské architektuře. Podrobnosti viz technická zpráva k této metodice (Kaprová a kol., 2021), kapitola 10.1.1. „Kategorizace druhů stromů a jejich základní hodnota“ a tabulky 10.2. a 10.3. tamtéž.

Pergl, J. a kol. (2016). Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. *NeoBiota* 28, p. 1-37.

Kaprová, K. a kol. (2021). *Technická zpráva k Metodice Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR (verze 2021)*. Praha: COŽP UK, ATEM a SAFE TREES.“

Odborný název	Český název
<i>Parthenocissus inserta</i>	loubinec popínavý
<i>Populus balsamifera</i>	topol balzámový
<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní
<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová
<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát
<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý

Pěstební stav porostu dřevin

Vyjadřuje úroveň pěstební péče, která byla prováděná v porostu dřevin v minulosti a aktuální stav vývojové fáze porostu ve vztahu k jeho lokalizaci a funkci.

Pěstebně zanedbaný – porost dřevin, evidentně bez dlouhodobě prováděných pěstebních zásahů. Porost destabilizovaný (přeštíhlený), s nadměrným výskytem dřevin pěstebně nevhodných (z pohledu jejich pěstebního tvaru a přítomnosti růstových defektů). Jako porost zanedbaný není vnímán porost, kde v důsledku přirozeně rozvolněné struktury není nutná realizace pěstebních zásahů.

Průběžně nevychovávaný – porost dřevin, kde v minulosti byl proveden jeden nebo více zásahů, které však vlivem nedostatečné intenzity nebo zanedbáním jejich opakování nevedly k zachování, resp. zlepšení stability porostu, optimální druhové skladby nebo pěstební kvality porostu.

Vychovávaný – porost dřevin, kde byly pravidelně prováděny pěstební zásahy, jejichž účelem je zachování, resp. zlepšení stability porostu, optimální druhové skladby a pěstební kvality porostu.

Postup výpočtu

Pro daný porost dřevin se z tabulky č. 12 odečte koeficient dle pěstebního stavu porostu a jeho vhodnosti na daném místě.

Základní hodnota zjištěna v předchozím kroku se vynásobí koeficientem zjištěným z tabulky č. 12.

Grafika 14: Tab č. 12 „Koeficient zohledňující pěstební stav porostu a vhodnost porostu“ uvedená v příloze

Vhodnost porostu	Pěstební stav porostu dřevin		
	Pěstebně zanedbaný	Průběžně nevychovávaný	Porost vychovávaný
Porost invazivních dřevin	0	0	0
Porost nežádoucí	0,3	0,4	0,5
Porosty ostatní	0,5	0,6	0,7
Porost vhodné skladby	0,7	0,9	1

Krok 3: Zohlednění biologické hodnoty a atraktivity umístění porostu

Vstupní parametry

Biologická hodnota porostu dřevin

Charakterizuje porost z pohledu rozsahu speciálních typů biotopů, důležitých zejména pro vývoj ohrožených a chráněných druhů organismů.

Vysoká – porost tvořený více etážemi, často pěstebně nevychovávaný s podílem odumřelého dřeva, které poskytuje odpovídající životní prostor rostlinám a živočichům vč. druhů chráněných dle zvláštních předpisů.

Střední – smíšený porost a porost tvořený dvěma a více etážemi, kde mohly probíhat pěstební zásahy.

Nízká – monokultura a porost zejména geograficky nepůvodních dřevin, tvořený zpravidla jen jednou etáží.

Atraktivita umístění porostu dřevin

Atraktivitou umístění porostu dřevin zohledňujeme místo, na kterém se porost nachází, včetně způsobu, jakým ovlivňuje charakter širšího stanoviště. V úvahu je brána frekvence pohybu osob a význam porostu jako estetického či prostorotvorného (kompozičního) prvku na daném místě včetně jeho vizuálního působení.

Vysoká – prostorově či vizuálně významné porosty dřevin ve frekventovaném veřejném prostoru měst a obcí, v historických a kulturních objektech, významné krajinné dominanty a porosty významně se uplatňující ve struktuře krajiny.

Střední – porost dřevin situovaný v méně přístupných či frekventovaných lokalitách nebo na lokalitách, které jsou v rámci širšího okolního prostoru z větší míry pohledově uzavřené, porost dřevin s menším prostorovým či vizuálním uplatněním v krajině.

Méně významná – porost se zanedbatelným prostorovým či vizuálním uplatněním a významem, např. v rámci pohledově uzavřených areálů, součást větších stejnorodých prvků zeleně apod.

Postup výpočtu

Z tabulky č. 13 se odečte koeficient popisující atraktivitu umístění porostu dřevin a jeho biologickou hodnotu.

Grafika 15: Tabulka č. 13 „Koeficient zohledňující atraktivitu umístění porostu dřevin a jeho biologickou hodnotu“ uvedená v příloze

Biologická hodnota	Atraktivita umístění porostu dřevin		
	Méně významná	Střední	Vysoká
Nízká	0,2	0,4	0,7
Střední	0,4	0,6	0,9
Vysoká	0,7	0,9	1

Základní hodnota z předchozího kroku (kroku 2) se vynásobí koeficientem z tabulky č. 13.

Krok 4: Výpočet hodnoty porostu dřevin v korunách

Hodnota porostu dřevin v peněžních jednotkách je určena vynásobením základní hodnoty inflačním koeficientem platným pro daný rok (detaily viz postup oceňování solitérních stromů, krok 9). Výsledná hodnota se matematicky zaokrouhlí na celé koruny.

5 PŘÍPADOVÁ STUDIE K OCEŇOVÁNÍ POROSTŮ



Ukázka 2: Porost dospívajících a dospělých dřevin

Porost stromů lemující potok, který je tvořen převážně dospělými a dospívajícími stromy. V druhové skladbě převládají původní druhy, zejména olše, lípy a topoly. V porostu neprobíhají žádné pěstební zásahy, přesto je však porost významný z biologického hlediska a významně se uplatňuje ve struktuře krajiny. Rozloha zájmového porostu je 3 m x 20 m.

Krok 1: Určení základní hodnoty porostu dřevin

Z tab. 10: pro porost dospívající a dospělý – 810 bodů za 1 m²

- pro rozlohu porostu 60 m² (3–20 m) je základní hodnota $60 \cdot 810 = 48\,600$

Krok 2: Zohlednění vhodnosti a pěstebního stavu porostu

Z tab. 12: pro porost vhodné skladby, pěstebně zanedbaný je koeficient 0,7

$$48\,600 \cdot 0,7 = 34\,020$$

Krok 3: Zohlednění biologické hodnoty a atraktivity umístění

Z tab. 13: pro porost s vysokou biologickou hodnotou a vysokou atraktivitou umístění je koeficient 1

$$34\ 020 \cdot 1 = 34\ 020$$

Krok 4: Výpočet hodnoty porostu dřevin v korunách

Hodnota porostu dřevin v peněžních jednotkách je určena vynásobením základní hodnoty z kroku 3 inflačním koeficientem platným pro daný rok.

Hodnota stromu v peněžních jednotkách platná k roku 2021 i 2022 je přímo rovna výše vypočtené hodnotě z kroku 3, tzn. 34 020 Kč. Jedná se o hodnotu stromu v cenové úrovni roku 2020¹⁵.

¹⁵ Pro současnou verzi metodiky z roku 2021 se bude s inflačním koeficientem počítat až od roku 2023, kdy bude k dispozici inflační koeficient pro přepočet na cenovou úroveň roku 2021.

6 KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

Do výpočtu kompenzačních opatření vstupuje výsledná hodnota vypočtená jako výsledek kalkulace hodnoty soliterního stromu či skupiny dřevin¹⁶.

Vzhledem k aktuálnímu rozsahu možných kompenzačních opatření může orgán ochrany přírody při výpočtu kompenzačního opatření za kácené dřeviny **na základě správního uvážení učinit následující výjimku v postupu:**

V případech, kdy oceněný strom vyniká zvýšenou biologickou hodnotou, tedy přítomností biologicky hodnotných prvků (mikrohabitátů), které **nelze běžnými kompenzačními opatřeními plnohodnotně nahradit**, může být tato část výsledné hodnoty stromu (tj. složka hodnoty vypočtená na základě kroku 6 a 7 této metodiky) odečtena a při výpočtu adekvátního kompenzačního opatření tedy neuplatněna. **Pokud orgán ochrany přírody tuto výjimku uplatní, musí vždy své rozhodnutí řádně slovně zdůvodnit.** Upozorňujeme, že rozhodnutím orgánu ochrany přírody o (ne)uplatnění této výjimky není nijak zpětně dotčen zákonný postup v rámci správní úvahy rozhodnout, zda zájem na pokácení dřeviny převyšuje veřejný zájem na jejím zachování a zda by případným kácením nemohlo dojít k ohrožení jiných zájmů chráněných podle ZOPK¹⁷.

Tuto výjimku nelze aplikovat při použití této metodiky pro určení výše pokut za nezákonné kácení dřevin.

Krok 1: Určení výše korekčního rámce

Uložení výše kompenzačních opatření v přesné výši základní hodnoty vznikající ekologické újmy může být zásadní problém z důvodu různých realizačních cen navrhovaných zásahů. Proto orgán ochrany přírody může využít korekční rámec – tedy zvýšení či snížení ceny kompenzačních opatření v definovaném rozsahu daném tabulkou 14. Korekčního rámce je možné využít pouze v případě, že rozsah kalkulovaného kompenzačního opatření právě překračuje jeho minimální hranici – není ho tedy možné využívat pro umělé zvýšení výše ukládaných kompenzačních opatření o nové položky.

Stanovení výše korekčního rámce (Xc) probíhá následujícím způsobem:

- pro rozmezí komp. opatření 0-300 000 bodů je výše komp. rámce $\pm 10\%$,
- pro rozmezí komp. opatření 300 001-600 000 bodů je výše komp. rámce $\pm 5\%$,
- pro rozmezí komp. opatření 600 000 a více bodů je výše komp. rámce $\pm 2\%$.

¹⁶ Hodnota ekologické újmy i hodnota kompenzačních opatření musí být v cenové úrovni stejného roku, aby byly porovnatelné. Hodnoty kompenzačních opatření uvedené níže v textu metodiky jsou vyjádřeny v cenové úrovni roku 2020. Proto se pro uložení kompenzačních opatření použije hodnota ekologické újmy (vypočtená jako výsledek kalkulace hodnoty soliterního stromu či skupiny dřevin) bez přepočtu inflačním koeficientem zmíněném v posledním kroku oceňování.

¹⁷ Více k zákonnému postupu viz kapitola Úvod - Agenda OOP při rozhodování o povolení kácení dřevin.

Krok 2: Volba typu kompenzačního opatření

Ve stávající verzi výpočtu je možné provést volbu mezi následujícími typy kompenzačních opatření, vedoucími k eliminaci ekologické újmy:

Výsadby

- stromů
- keřů
- popínavých či ovíjivých dřevin

Pěstební opatření

Řez stromů

- výchovný (S-RV)
- zdravotní (S-RZ)
- lokální redukce (S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV)
- obvodová redukce (S-RO)

Instalace bezp. vazby

- dynamické
- statické (vrtané)

Struktura následujícího zadání informací pro vlastní výpočet základní hodnoty kompenzačních opatření se liší podle jeho typu (viz dále).

Případu, kdy je zvoleno kompenzační opatření – výsadba se týkají následně kroky 3–5, pěstebních opatření se týká krok 6

Jednotlivé typy kompenzačních opatření je možné kombinovat až do výše dosažení celkové základní hodnoty řešené ekologické újmy. Kompenzační opatření je možné realizovat na pozemcích:

- žadatele o pokácení dřevin (příp. subjektu, který provedl poškození dřeviny),
- jiných vlastníků s podmínkou jejich souhlasu.

Krok 3: Výsadby - volba počtu a velikosti vysazovaných rostlin

Výsadba dřevin je definovaná Standardy péče o přírodu a krajinu:

- A02 001 – Výsadba stromů,
- A02 003 – Výsadba a řez keřů a lián.

Aktuální verze oborových standardů lze nalézt na www.standardy.nature.cz.

Podle stanovištních poměrů a účelu výsadby je zvolena velikost vysazovaných rostlin. K dispozici jsou následující velikostní kategorie¹⁸ běžně prodáváného rostlinného materiálu:

- listnaté stromy: 100/150, 150/200, 200/250, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 18/20, 20/25,
- jehličnaté stromy: 100/125, 125/150, 150/175, 175/200, 200/225, 225/250, 250/300.

Současně se provede i volba počtu vysazovaných stromů/keřů. Počet lze následovně korigovat tak, aby nebyla překročena základní hodnota celkového objemu ukládaných kompenzačních opatření se zohledněním korekčního rámce.

Krok 4: Výsadby – volba taxonu a délky povýsadbové péče

Taxon dřevin pro výsadbu se volí jednak konkrétně (jako druh, příp. kultivar zvolený pro dané podmínky) a jednak z hlediska příslušnosti do konkrétní skupiny pro případ nutné volby alternativy, v případě jeho nedostupnosti.

Rozložení taxonů stromů do jednotlivých taxonomických skupin se provádí (obdobně jako ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., příloha č. 40) pomocí tabulky 14a–14e (Listnaté stromy I, II, III, jehličnaté stromy I, II,). Keře byly rozděleny na jehličnaté a listnaté.

Pozn. Náhradní výsadbu nelze realizovat taxony, které jsou v tabulce č. 11 označeny jako invazivní. Výjimkou je trnovník akát (*Robinia pseudoacacia*), který lze jako kompenzační výsadbu použít ve specifických případech, např. pokud je vyžádán pracovištěm NPÚ z kulturně historického hlediska apod. Tyto specifické případy jsou vždy na uvážení příslušného orgánu ochrany přírody.

¹⁸ Špičáky/pyramidy jsou udávány výškou v cm (např. 100/150), listnaté stromy se zapěstovanou korunou jsou udávány obvodem kmene ve výšce 1 m (např. 14/16).

Grafika 16: Tab. 14 a Listnaté stromy I

Mezinárodní název	Český název
<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá
<i>Alnus incana</i>	olše šedá
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá
<i>Betula pubescens</i>	bříza pýřitá
<i>Populus × berolinensis</i>	topol berlínský
<i>Populus × canadensis</i>	topol kanadský
<i>Populus × canescens</i>	topol šedavý
<i>Populus alba</i>	topol bílý
<i>Populus nigra</i>	topol černý
<i>Populus simonii</i>	topol Simonův
<i>Populus tremula</i>	topol osika
<i>Populus trichocarpa</i>	topol chlupatoplodý
<i>Salix alba</i>	vrba bílá
<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká

Grafika 17: Tab. 14 b Listnaté stromy II

Mezinárodní název	Český název
<i>Acer platanoides</i>	javor mlč
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen
<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný
<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal
<i>Betula ermanii</i>	bříza Ermanova
<i>Betula jacquemontii</i>	bříza Jacquemontova
<i>Betula lenta</i>	bříza tuhá
<i>Betula papyrifera</i>	bříza papírovitá
<i>Castanea sativa</i>	kaštanovník jedlý
<i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa trubačovitá
<i>Celtis occidentalis</i>	břestovec západní
<i>Cerasus (Prunus) avium</i>	třešeň ptačí
<i>Cerasus (Prunus) mahaleb</i>	mahalebka obecná
<i>Cerasus (Prunus) sargentii</i>	třešeň Sargentova
<i>Cercidophyllum japonicum</i>	zmarličník japonský
<i>Crataegus</i> sp.	hloh – všechny druhy
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
<i>Fraxinus ornus</i>	jasan zimnář

Mezinárodní název	Český název
<i>Gymnocladus dioica</i>	nahověvec dvoudomý
<i>Juglans cinerea</i>	orešák popelavý
<i>Juglans nigra</i>	orešák černý
<i>Juglans regia</i>	orešák královský
<i>Magnolia tripetala</i>	magnolie (šácholán) trojplátečná
<i>Magnolia acuminata</i>	magnolie (šácholán) přišpičatělá
<i>Magnolia denudata</i>	magnolie (šácholán) obnažená
<i>Magnolia kobus</i>	magnolie (šácholán) kobus
<i>Malus</i> sp.	jabloň – botanické a okrasné druhy
<i>Morus alba</i>	morušovník bílý
<i>Morus nigra</i>	morušovník černý
<i>Morus rubra</i>	morušovník červený
<i>Padus avium (Prunus padus)</i>	střemcha obecná
<i>Paulownia tomentosa</i>	paulownie plstnatá
<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrabolán
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	pterokarye jasanolistá
<i>Pyrus</i> sp.	hrušeň – botanické a okrasné druhy
<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí
<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední
<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský
<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz
<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý

Grafika 18: Tab. 14 c Listnaté stromy III

Mezinárodní název	Český název
<i>Acer campestre</i>	javor babyka
<i>Acer rubrum</i>	javor červený
<i>Aesculus × carnea</i>	jírovec pletový
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný
<i>Carya ovata</i>	orechovec vejčitý
<i>Cerasus (Prunus) fruticosa</i>	třešeň křovitá
<i>Cerasus (Prunus) serrulata</i>	třešeň sakura
<i>Cerasus (Prunus) subhirtella</i>	třešeň (višeň) chloupkatá
<i>Corylus colurna</i>	líška turecká
<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní
<i>Gleditsia triacanthos</i>	dřezovec trojtrnný
<i>Koelreuteria paniculata</i>	svitel latnatý

Mezinárodní název	Český název
<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambroň západní
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý
<i>Phellodendron amurense</i>	korkovník amurský
<i>Platanus × acerifolia (hispanica)</i>	platan javorolistý
<i>Quercus cerris</i>	dub cer
<i>Quercus coccinea</i>	dub šarlatový
<i>Quercus frainetto</i>	dub uherský
<i>Quercus macranthera</i>	dub velkokvětý
<i>Quercus palustris</i>	dub bahenní
<i>Quercus petraea</i>	dub zimní
<i>Quercus pubescens</i>	dub pýřitý
<i>Quercus robur</i>	dub letní
<i>Quercus rubra</i>	dub červený
<i>Sophora japonica</i>	jerlín japonský
<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk
<i>Sorbus domestica</i>	jeřáb oskeruše
<i>Sorbus torminalis</i>	jeřáb břek
<i>Tilia americana</i>	lípa americká
<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá
<i>Tilia euchlora</i>	lípa krymská
<i>Tilia petiolaris</i>	lípa řapíkatá
<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá
<i>Tilia tomentosa</i>	lípa plstnatá
<i>Tilia vulgaris (× europaea)</i>	lípa obecná
<i>Ulmus × hollandica</i>	jilm holandský
<i>Zelkova carpiniifolia</i>	zelkova habrolistá

Grafika 19: Tab. 14 d Jehličnaté stromy I

Mezinárodní název	Český název
<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá
<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cypřišek Lawsonův
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	cypřišek nutka
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	cypřišek hrachonosný
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý
<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní

Mezinárodní název	Český název
<i>Pinus uncinata</i>	borovice pyrenejská
<i>Platycladus (Thuja) orientalis</i>	zeravec východní
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá
<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní
<i>Thuja plicata</i>	zerav obrovský

Grafika 20: Tab. 14 e Jehličnaté stromy II

Mezinárodní název	Český název
<i>Abies amabilis</i>	jedle nádherná
<i>Abies balsamea</i>	jedle balzámová
<i>Abies cephalonica</i>	jedle řecká
<i>Abies concolor</i>	jedle ojíňená
<i>Abies homolepis</i>	jedle nikko
<i>Abies koreana</i>	jedle korejská
<i>Abies lasiocarpa</i>	jedle subalpinská
<i>Abies magnifica</i>	jedle nádherná
<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská
<i>Abies numidica</i>	jedle numidská
<i>Abies pinsapo</i>	jedle španělská
<i>Abies procera</i>	jedle vznešená
<i>Abies sibirica</i>	jedle sibiřská
<i>Abies veitchii</i>	jedle Veitchova
<i>Calocedrus decurens</i>	pazerav cedrový
<i>Cedrus atlantica</i>	cedr atlantský
<i>Cedrus deodara</i>	cedr himalájský
<i>Cedrus libani</i>	cedr libanonský
<i>Cryptomeria japonica</i>	kryptomerie japonská
<i>Ginkgo biloba</i>	jinan dvojlaločný
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	cypřišek tupolistý
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	cypřišek zeravovitý
<i>Juniperus chinensis</i>	jalovec čínský
<i>Juniperus scopulorum</i>	jalovec skalní
<i>Juniperus virginiana</i>	jalovec viržinský
<i>Larix kaempferi</i>	modřín japonský
<i>Larix laricina</i>	modřín americký
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje tisovcovitá
<i>Picea breweriana</i>	smrk Brewerův

Mezinárodní název	Český název
<i>Picea engelmannii</i>	smrk Engelmannův
<i>Picea glauca</i>	smrk sivý
<i>Picea jezoensis</i>	smrk ajanský
<i>Picea mariana</i>	smrk černý
<i>Picea omorika</i>	smrk omorika
<i>Picea orientalis</i>	smrk východní
<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý
<i>Picea sitchensis</i>	smrk sitka
<i>Pinus aristata</i>	borovice osinatá
<i>Pinus armandii</i>	borovice Armandova
<i>Pinus banksiana</i>	borovice Banksova
<i>Pinus cembra</i>	borovice limba
<i>Pinus contorta</i>	borovice pokroucená
<i>Pinus densiflora</i>	borovice hustokvětá
<i>Pinus flexilis</i>	borovice ohebná
<i>Pinus heldreichii</i>	borovice Heldreichova
<i>Pinus jeffreyi</i>	borovice Jeffreyova
<i>Pinus koraiensis</i>	borovice korejská
<i>Pinus monticola</i>	borovice pohorská
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá
<i>Pinus parviflora</i>	borovice drobnokvětá
<i>Pinus peuce</i>	borovice rumelská
<i>Pinus ponderosa</i>	borovice žlutá
<i>Pinus pungens</i>	borovice pichlavá
<i>Pinus resinosa</i>	borovice smolná
<i>Pinus rigida</i>	borovice tuhá
<i>Pinus rotundata</i>	borovice blatka
<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka
<i>Pinus wallichiana</i>	borovice himalájská
<i>Pseudolarix amabilis</i>	pamodřín líbezný
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	sekvojovec obrovský
<i>Taxodium distichum</i>	tisovec dvouřadý
<i>Taxus baccata</i>	tis červený
<i>Taxus cuspidata</i>	tis japonský
<i>Thuja standishii</i>	zerav japonský
<i>Thujopsis dolabrata</i>	zeravinec japonský
<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský
<i>Tsuga caroliniana</i>	jedlovec karolínský

Mezinárodní název	Český název
<i>Tsuga diversifolia</i>	jedlovec různolistý
<i>Tsuga heterophylla</i>	jedlovec západoamerický
<i>Tsuga mertensiana</i>	jedlovec Mertensův

Současně se provede volba délky doby povýsadbové péče. Tu je možné uložit do maximální délky 5 let s následujícím doporučením:

- výsadba keřů – doporučená délka povýsadbové péče 3 roky,
- výsadba stromů s velikostí 100/150 – 250/300 – doporučená délka povýsadbové péče 3 roky,
- výsadba stromů s velikostí 10/12 – 20/25 – doporučená délka povýsadbové péče 5 let.

Krok 5: Výsadby – výpočet hodnoty kompenzačních opatření

Výpočet hodnoty kompenzačního opatření – výsadby – je násobkem počtu vysazovaných rostlin s základní hodnotou rostlinného materiálu dané velikosti z tabulky č. 15.¹⁹

Grafika 21: Tab. 15: Základní hodnota výsadby

	Velikostní kategorie dřeviny	Základní hodnota
1. skupina listnaté stromy	100/150	7 694
	150/200	8 516
	200/250	10 102
	10/12	12 085
	12/14	15 155
	14/16	18 723
	16/18	20 861
	18/20	25 717
	20/25	31 314

¹⁹ Výpočet hodnoty kompenzačních výsadeb byl zjednodušený oproti minulé verzi metodiky. V této verzi je místo tří původních tabulek uvedena jedna souhrnná tabulka s celkovou hodnotou kompenzačního opatření pro jednotlivé skupiny a velikostní kategorie dřevin. Jedná se o součet cen rostlinného materiálu, cen výsadby i povýsadbové péče po doporučený počet let péče pro danou kategorii dřevin. Podrobnosti viz Technická zpráva k Metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR (verze 2021) - Kaprová a kol. (2021).

	Velikostní kategorie dřeviny	Základní hodnota
2. skupina listnaté stromy	100/150	7 754
	150/200	8 659
	200/250	10 261
	10/12	12 523
	12/14	15 909
	14/16	19 354
	16/18	21 767
	18/20	27 310
	20/25	32 143
3. skupina listnaté stromy	100/150	7 938
	150/200	8 926
	200/250	10 773
	10/12	12 674
	12/14	15 898
	14/16	19 174
	16/18	21 276
	18/20	26 355
	20/25	30 513
4. skupina jehličnaté stromy	100/125	6 952
	125/150	7 819
	150/175	8 475
	175/200	9 525
	200/225	9 966
	225/250	10 220
	250/300	12 501
5. skupina jehličnaté stromy	100/125	6 666
	125/150	7 107
	150/175	7 691
	175/200	8 359
	200/225	9 371
	225/250	9 669
	250/300	12 739
6. skupina listnaté keře	Kontejner 1l	988
	Kontejner 2l	2 048
	Kontejner 3l	3 398
7. skupina jehličnaté keře	Kontejner 1l	980
	Kontejner 2l	2 042
	Kontejner 3l	3 402

Krok 6: Výpočet hodnoty kompenzačních opatření zahrnující pěstební opatření

Na volbě typu pěstební opatření, navrhovaného jako součást kompenzačních opatření, závisí i typ dendrometrických a dalších údajů, které je třeba zadat pro možný výpočet jeho základní hodnoty.

Definice náplně pěstebních opatření vychází ze Standardů péče o přírodu a krajinu:

- A02 002 – Řez stromů,
- A02 007 – Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Aktuální verze oborových standardů lze nalézt na www.standardy.nature.cz.

Výchovný řez (S-RV)

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- výška stromu V_s
- počet stromů P_s

Základní hodnota kompenzačního opatření – výchovného řezu – se zjišťuje z následující tabulky 16:

Grafika 21: Tab. 16: Základní hodnota kompenzačních opatření - výchovný řez

Výšková kategorie (V_s)	Základní hodnota
stromy do 4 m výšky	221
stromy 4–6 m vysoké	386
stromy 6–9 m vysoké	771

Zdravotní řez (S-RZ)

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- výška stromu V_s
- průměr koruny stromu S_k
- počet stromů P_s

Průměr koruny je definovaný jako součet největšího a nejmenšího poloměru průmětu koruny na vodorovnou plochu. Výška stromu je svislá vzdálenost paty kmene od nejvyššího bodu v koruně.

Ideální plocha stromu (I_{ps}) pro odečet z tabulky 17 se vypočítá jako:

$$I_{ps} = V_s * S_k$$

Základní hodnota kompenzačního opatření – zdravotního řezu – se zjišťuje z následující tabulky 17:

Grafika 22: Tab. 17: Základní hodnota kompenzačního opatření – zdravotní řez

Ideální plocha stromu (Ips)	Základní hodnota
do 30 m ²	930
přes 30 m ² do 60 m ²	1 859
přes 60 m ² do 90 m ²	2 789
přes 90 m ² do 120 m ²	2 972
přes 120 m ² do 150 m ²	3 718
přes 150 m ² do 180 m ²	4 642
přes 180 m ² do 210 m ²	5 015
přes 210 m ² do 240 m ²	5 760
přes 240 m ² do 270 m ²	6 317
přes 270 m ² do 300 m ²	7 058
přes 300 m ² do 330 m ²	7 246
přes 330 m ² do 360 m ²	7 986
přes 360 m ² do 390 m ²	8 732
přes 390 m ² do 420 m ²	9 289
přes 420 m ² do 450 m ²	10 030
přes 450 m ² do 480 m ²	10 586
přes 480 m ² do 510 m ²	11 331
přes 510 m ² do 540 m ²	12 072
přes 540 m ² do 570 m ²	12 633
přes 570 m ² do 600 m ²	13 190

Bezpečnostní řez (S-RB)

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- výška stromu V_s
- průměr koruny stromu S_k
- počet stromů P_s

Průměr koruny je definovaný jako součet největšího a nejmenšího poloměru průmětu koruny na vodorovnou plochu. Výška stromu je svislá vzdálenost paty kmene od nejvyššího bodu v koruně.

Ideální plocha stromu (I_{ps}) pro odečet z tabulky 18 se vypočítá jako:

$$I_{ps} = V_s * S_k$$

Základní hodnota kompenzačního opatření – bezpečnostního řezu – se zjišťuje z následující tabulky 18:

Grafika 23: Tab. 18: Základní hodnota kompenzačního opatření – bezpečnostní řez

Ideální plocha stromu (Ips)	Základní hodnota
do 30 m ²	746
přes 30 m ² do 60 m ²	1 486
přes 60 m ² do 90 m ²	2 232
přes 90 m ² do 120 m ²	2 415
přes 120 m ² do 150 m ²	2 972
přes 150 m ² do 180 m ²	3 718
přes 180 m ² do 210 m ²	4 086
přes 210 m ² do 240 m ²	4 642
přes 240 m ² do 270 m ²	5 199
přes 270 m ² do 300 m ²	5 944
přes 300 m ² do 330 m ²	6 128
přes 330 m ² do 360 m ²	6 690
přes 360 m ² do 390 m ²	7 246
přes 390 m ² do 420 m ²	7 614
přes 420 m ² do 450 m ²	8 176
přes 450 m ² do 480 m ²	8 739
přes 480 m ² do 510 m ²	9 289
přes 510 m ² do 540 m ²	10 030
přes 540 m ² do 570 m ²	10 401
přes 570 m ² do 600 m ²	10 958

Lokální redukce (S-RLLR, S-RLSP, S-RLPV)

Vzhledem k rozdílné realizační hodnotě jsou souhrnně kalkulované lokální redukce:

- S-RLLR – lokální redukce z důvodu stabilizace,
- S-RLSP – lokální redukce směrem k překážce,
- S-RLPV – lokální redukce za účelem zajištění podchodné/podjezdné výšky.

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- výška stromu V_s
- průměr koruny stromu S_k
- počet čtvrtin koruny zahrnutých do redukce Q_k
- počet stromů P_s

Průměr koruny je definovaný jako součet největšího a nejmenšího poloměru průmětu koruny na vodorovnou plochu. Výška stromu je svislá vzdálenost paty kmene od nejvyššího bodu v koruně.

Ideální plocha stromu (I_{ps}) pro odečet z tabulky 19 se vypočítá jako:

$$I_{ps} = V_s * S_k$$

Základní hodnota (ZH) redukce ¼ koruny redukčním řezem stranovým se zjišťuje z následující tabulky 19:

Grafika 23: Tab. 19: Základní hodnota kompenzačního opatření – lokální redukce

Ideální plocha stromu (Ips)	Základní hodnota
do 30 m²	311
přes 30 m² do 60 m²	558
přes 60 m² do 90 m²	867
přes 90 m² do 120 m²	930
přes 120 m² do 150 m²	1 115
přes 150 m² do 180 m²	1 300
přes 180 m² do 210 m²	1 486
přes 210 m² do 240 m²	1 672
přes 240 m² do 270 m²	1 858
přes 270 m² do 300 m²	2 044
přes 300 m² do 330 m²	2 230
přes 330 m² do 360 m²	2 353
přes 360 m² do 390 m²	2 600
přes 390 m² do 420 m²	2 786
přes 420 m² do 450 m²	2 972
přes 450 m² do 480 m²	3 158
přes 480 m² do 510 m²	3 344
přes 510 m² do 540 m²	3 530
přes 540 m² do 570 m²	3 715
přes 570 m² do 600 m²	3 901

Obvodová redukce (S-RO)

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- výška stromu V_s
- průměr koruny stromu S_k
- počet stromů P_s

Průměr koruny je definovaný jako součet největšího a nejmenšího poloměru průmětu koruny na vodorovnou plochu. Výška stromu je svislá vzdálenost paty kmene od nejvyššího bodu v koruně.

Ideální plocha stromu (I_{ps}) pro odečet z tabulky 20 se vypočítá jako:

$$I_{ps} = V_s * S_k$$

Základní hodnota kompenzačního opatření – redukčního řezu obvodového – se zjišťuje z následující tabulky 20:

Grafika 24: Tab. 20: Základní hodnota kompenzačního opatření – obvodová redukce

Ideální plocha stromu (Ips)	Základní hodnota
do 30 m²	1 114
přes 30 m² do 60 m²	2 232
přes 60 m² do 90 m²	3 345
přes 90 m² do 120 m²	3 530
přes 120 m² do 150 m²	4 458
přes 150 m² do 180 m²	5 387
přes 180 m² do 210 m²	5 944
přes 210 m² do 240 m²	6 690
přes 240 m² do 270 m²	7 614
přes 270 m² do 300 m²	8 359
přes 300 m² do 330 m²	8 549
přes 330 m² do 360 m²	9 289
přes 360 m² do 390 m²	10 218
přes 390 m² do 420 m²	10 958
přes 420 m² do 450 m²	11 704
přes 450 m² do 480 m²	12 444
přes 480 m² do 510 m²	13 373
přes 510 m² do 540 m²	14 119
přes 540 m² do 570 m²	14 859
přes 570 m² do 600 m²	15 605

Instalace bezpečnostní vazby – statické (S–VSH, S–USD)

Statická – vrtaná – bezpečnostní vazba se instaluje ve spodní ½ koruny v případě, že v místě instalace nejsou zřejmé symptomy infekce vnitřní části kmene některou z dřevokazných hub.

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- počet instalovaných vazeb

Základní hodnota kompenzačního opatření – instalace statické bezpečnostní vazby – se zjišťuje z následující tabulky 21:

Grafika 25: Tab. 21: Základní hodnota kompenzačního opatření – instalace statické bezpečnostní vazby

Počet instalovaných vazeb	Základní hodnota
1	3 621
2	6 470
3	9 320
4	12 169
5	15 019
6	17 869
7	20 718
8	23 566
9	26 416
10	29 266

Instalace bezpečnostní vazby – dynamické (S–VDD, S–VDH)

Dynamická bezpečnostní vazba se instaluje ve vrchní ½ koruny (event. jako vazba dvouúrovňová přibližně v ½ koruny a ve vrchní třetině) v případě, že defekt dosud nevykazuje takový rozsah, kdy by hrozilo akutní riziko selhání a trvalého napnutí vazby. Vazba se nesmí instalovat jako předepjatá.

Údaje nutné pro definici základní hodnoty:

- počet instalovaných vazeb

Základní hodnota kompenzačního opatření – instalace dynamické bezpečnostní vazby – se zjišťuje z následující tabulky 22:

Grafika 26: Tab. 22: Základní hodnota kompenzačního opatření – instalace dynamické bezpečnostní vazby

Počet instalovaných vazeb	Základní hodnota
1	2 050
2	3 770
3	5 490
4	7 209
5	8 928
6	10 648
7	12 367
8	14 087
9	15 807
10	17 416

Celková hodnota kompenzačních opatření

Celková hodnota ukládaných kompenzačních opatření (kompenzačních výsadeb i pěstebních opatření) se následně vypočítá jako:

$$KO = (P_1 * B_1) + (P_2 * B_2) + \dots + (P_n * B_n)$$

kde: KO je celková výše ukládaných kompenzačních opatření

B_1 až B_n je základní hodnota jednotlivých typů uložených kompenzačních opatření

P_1 až P_n je počet uložených kompenzačních opatření jednoho typu

Hodnota kompenzačních opatření je v cenové úrovni stejného roku, jako u ocenění kácených/poškozených dřevin.

Krok 7: Kontrola využití korekčního rámce

Po součtu celkové základní hodnoty navržených kompenzačních opatření proběhne kontrola využití korekčního rámce. Korekčního rámce je možné využít pouze v případě, že rozsah kalkulovaného kompenzačního opatření právě překračuje jeho minimální hranici – není ho tedy možné využívat pro umělé zvýšení výše ukládaných kompenzačních opatření o nové položky.

V případě, že dosavadním výpočtem získaná suma základních hodnot kompenzačních opatření právě zasáhne do oblasti definované korekčním rámcem, je možné akceptovat i kompenzační opatření, ale další položky již není možné přidávat, a to i v případě, že by stále ještě vyhovovalo maximální hranici dané korekčním rámcem.

V případě, že poslední přidané kompenzační opatření přesáhne celkový plněný objem ekologické újmy, ale stále se ještě pohybuje v oblasti definované korekčním rámcem, je možné ho akceptovat.

Krok 8: Kontrola realizovaných kompenzačních opatření

U provedených kompenzačních opatření je nutná zevrubná kontrola kvalitně provedených parametrů pro jednotlivé typy opatření. Kontrolu musí provádět pracovník s odpovídající odbornou kvalifikací.

Kontrola probíhá na základě kritérií jednotlivých pěstebních opatření, definovaných ve Standardech péče o přírodu a krajinu:

- A02 001 – Výsadba stromů,
- A02 003 – Výsadba a řez keřů a lián,
- A02 002 – Řez stromů,
- A02 007 – Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

Aktuální verze oborových standardů lze nalézt na www.standardy.nature.cz.

7 PŘÍLOHY

Tab 1: Seznam taxonů listnatých a jehličnatých stromů

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
ambroň	<i>Liquidambar sp.</i>	A	nízká		nízký
ambroň západní	<i>Liquidambar styraciflua</i>	A	nízká		nízký
borovice	<i>Pinus sp.</i>	A	nízká		nízký
borovice Banksova	<i>Pinus banksiana</i>	A	nízká		nízký
borovice bělokorá	<i>Pinus leucodermis</i>	A	nízká		nízký
borovice blatka	<i>Pinus rotundata</i>	A	nízká		nízký
borovice Bungeova	<i>Pinus bungeana</i>	A	nízká		nízký
borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	B	nízká		nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora</i>	A	nízká		nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora 'Glaucua'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora 'Negishi'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice drobnokvětá	<i>Pinus parviflora 'Tempelhof'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice himálajská	<i>Pinus wallichiana</i>	B	nízká		nízký
borovice hustokvětá	<i>Pinus densiflora</i>	A	nízká		nízký
borovice Jeffreyova	<i>Pinus jeffreyi</i>	B	nízká		nízký
borovice korejská	<i>Pinus koraiensis</i>	A	nízká		nízký
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	A	nízká		nízký
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris 'Aurea'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris 'Fastigiata'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice limba	<i>Pinus cembra</i>	A	nízká		nízký
borovice ohebná	<i>Pinus flexilis</i>	A	nízká		nízký
borovice ohebná	<i>Pinus flexilis 'Temple'</i>	A	nízká	jiný	nízký
borovice osinatá	<i>Pinus aristata</i>	A	nízká		nízký
borovice pokroucená	<i>Pinus contorta</i>	A	nízká		nízký
borovice pyrenejská	<i>Pinus uncinata</i>	A	nízká		nízký
borovice rumelská	<i>Pinus peuce</i>	A	nízká		nízký
borovice Schwerinova	<i>Pinus × schwerinii</i>	B	nízká		nízký
borovice těžká	<i>Pinus ponderosa</i>	B	nízká		nízký
borovice Thunbergova	<i>Pinus thunbergii</i>	A	nízká		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
borovice tuhá	<i>Pinus rigida</i>	A	nízká		nízký
borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i>	A	nízká		nízký
borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i> 'Contorta'	A	nízká	jiný	nízký
borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i> 'Fastigiata'	A	nízká	jiný	nízký
borovice vejmutovka	<i>Pinus strobus</i> 'Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
borovice zakrslá	<i>Pinus pumila</i>	A	nízká		nízký
broskvoň	<i>Prunus</i> sp.	B	střední		nízký
broskvoň obecná	<i>Prunus persica</i>	B	střední		nízký
břestovec	<i>Celtis</i> sp.	A	střední		nízký
břestovec jižní	<i>Celtis australis</i>	A	střední		nízký
břestovec západní	<i>Celtis occidentalis</i>	A	střední		nízký
bříza	<i>Betula</i> sp.	B	nízká		nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	B	nízká		nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Dalecarlica'	B	nízká	jiný	nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Fastigiata'	B	nízká	jiný	nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Laciniata'	B	nízká	jiný	nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Purpurea'	B	nízká		nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Tristis'	C	nízká	jiný	nízký
bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i> 'Youngii'	C	nízká	jiný	nízký
bříza černá	<i>Betula nigra</i>	B	nízká		nízký
bříza Ermanova	<i>Betula ermanii</i>	B	nízká		nízký
bříza Jacquemontova	<i>Betula jacquemontii</i>	B	nízká		nízký
bříza Maximovičova	<i>Betula maximowicziana</i>	B	nízká		nízký
bříza ojcovská	<i>Betula oycoviensis</i>	B	nízká		nízký
bříza papírovitá	<i>Betula papyrifera</i>	B	nízká		nízký
bříza pyřitá	<i>Betula pubescens</i>	B	nízká		nízký
bříza tmavá	<i>Betula obscura</i>	B	nízká		nízký
bříza tuhá	<i>Betula lenta</i>	B	nízká		nízký
bříza žlutá	<i>Betula alleghaniensis</i>	B	nízká		nízký
buk	<i>Fagus</i> sp.	A	nízká		vysoký
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i>	A	nízká		vysoký
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Ansorgei'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Aspleniifolia'	A	nízká		střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	A	nízká		střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Cochleata'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Cristata'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Laciniata'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Luteovariegata'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Miltonensis'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purple Fountain'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Nana'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Tricolor'	A	nízká		střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Quercifolia'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Riversii'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Gold'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohan Obelisk'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rohani'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Rotundifolia'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Spaethiana'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Magret'	A	nízká		střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Tortuosa'	A	nízká	jiný	střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Tricolor'	A	nízká		střední
buk lesní	<i>Fagus sylvatica</i> 'Zlatia'	A	nízká	jiný	střední
cedr	<i>Cedrus</i> sp.	A	nízká		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
cedr atlaský	<i>Cedrus atlantica</i>	A	nízká		nízký
cedr atlaský	<i>Cedrus atlantica</i> 'Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
cedr himalajský	<i>Cedrus deodara</i>	A	nízká		nízký
cedr libanonský	<i>Cedrus libani</i>	A	nízká		nízký
cedr libanonský	<i>Cedrus libani</i> 'Glauca'	A	nízká		nízký
cedr libanonský	<i>Cedrus libani</i> 'Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
cypřišek	<i>Chamaecyparis</i> sp.	B	střední		nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	B	střední		nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Aurea'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Plumosa Aurea'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek hrachonosný	<i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Squarrosa'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	B	střední		nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Alumii'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Erecta Viridis'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Filifera'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Fletcheri'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Glauca'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Golden Wonder'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Ivonne'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lane'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lombartsii'	B	střední	jiný	nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Lutescens'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Plumosa'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Silver Queen'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Spek'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stardust'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stewartii'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Triomf van Boskoop'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek Lawsonův	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Wisselii'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek nootecký	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	B	střední	jiný	nízký
cypřišek nootecký	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Glauca'	B	střední	jiný	nízký
cypřišek nootecký	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
cypřišek tupolistý	<i>Chamaecyparis obtusa</i>	A	střední		nízký
cypřišek zeravovitý	<i>Chamaecyparis thyoides</i>	A	střední		nízký
cypřišovec Leylandův	× <i>Cupressocyparis leylandii</i>	B	střední		nízký
davidie listenová	<i>Davidia involucrata</i>	A	střední		nízký
douglaska	<i>Pseudotsuga</i> sp.	B	nízká		nízký
douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	B	nízká		nízký
douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glauca Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i>	B	nízká		nízký
dřezovec	<i>Gleditsia</i> sp.	B	střední		nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i>	B	střední		nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Bujoti'	B	střední	jiný	nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Elegantissima'	B	střední	jiný	nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> f. <i>inermis</i>	B	střední		nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Shademaster'	B	střední	jiný	nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Skyline'	B	střední	jiný	nízký
dřezovec trojtrnný	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Sunburst'	B	střední	jiný	nízký
dub	<i>Quercus</i> sp.	A	vysoká		vysoký
dub bahenní	<i>Quercus palustris</i>	A	vysoká		vysoký
dub bílý	<i>Quercus alba</i>	A	vysoká		střední
dub celokrajný	<i>Quercus imbricaria</i>	A	vysoká		střední
dub cer	<i>Quercus cerris</i>	A	vysoká		vysoký
dub čárkolistý	<i>Quercus phellos</i>	A	vysoká		střední
dub červený	<i>Quercus rubra</i>	B	vysoká		střední
dub jadranský	<i>Quercus virgiliana</i>	A	vysoká		střední
dub letní	<i>Quercus robur</i>	A	vysoká		vysoký
dub letní	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'	A	vysoká	jiný	vysoký
dub letní	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster'	A	vysoká	jiný	vysoký
dub mnohoplodý	<i>Quercus polycarpa</i>	A	vysoká		střední
dub pýřitý	<i>Quercus pubescens</i>	A	vysoká		vysoký
dub Sargentův	<i>Quercus × sargentii</i>	A	vysoká		střední
dub sivozelený	<i>Quercus pedunculiflora</i>	A	vysoká		střední
dub šarlatový	<i>Quercus coccinea</i>	A	vysoká		střední
dub Turnerův	<i>Quercus × turneri</i> 'Pseudoturneri'	A	vysoká		střední
dub uherský	<i>Quercus frainetto</i>	A	vysoká		střední
dub velkokvětý	<i>Quercus macranthera</i>	A	vysoká		střední
dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	A	vysoká		vysoký
dub žlutavý	<i>Quercus dalechampii</i>	A	vysoká		střední
habr	<i>Carpinus</i> sp.	A	vysoká		střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	A	vysoká		střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Columnaris'	A	vysoká	jiný	střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'	A	vysoká	jiný	střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine'	A	vysoká	jiný	střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Pendula'	C	vysoká	jiný	střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Purpurea'	A	vysoká	jiný	střední
habr obecný	<i>Carpinus betulus</i> 'Quercifolia'	A	vysoká	jiný	střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
habrovec habrolistý	<i>Ostrya carpinifolia</i>	A	střední		nízký
hlavotis peckovicový	<i>Cephalotaxus harringtonia</i>	A	vysoká		nízký
hloh	<i>Crataegus</i> sp.	C	střední		střední
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	C	střední		střední
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>	C	střední		střední
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	C	střední		střední
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i> 'Rubra Plena'	C	střední		střední
hlošina úzkolistá	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	B	střední		nízký
hrušeň	<i>Pyrus</i> sp.	B	nízká		střední
hrušeň Calleryova	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	C	nízká		nízký
hrušeň Calleryova	<i>Pyrus calleryana</i> 'Redspire'	C	nízká		nízký
hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>	B	nízká		střední
hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'	B	nízká	jiný	střední
hrušeň polnička	<i>Pyrus pyraeaster</i>	B	nízká		střední
jabloň	<i>Malus</i> sp.	B	střední		nízký
jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	B	střední		nízký
jabloň lesní	<i>Malus sylvestris</i>	B	střední		nízký
jabloň vznešená	<i>Malus spectabilis</i>	C	střední		nízký
jabloň Zumova	<i>Malus × zumi</i>	C	střední		nízký
jalovec	<i>Juniperus</i> sp.	A	nízká		nízký
jalovec obecný	<i>Juniperus communis</i>	A	nízká		střední
jalovec skalní	<i>Juniperus scopulorum</i>	A	nízká		nízký
jalovec skalní	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	C	nízká	jiný	nízký
jalovec viržinský	<i>Juniperus virginiana</i>	A	nízká		nízký
jalovec viržinský	<i>Juniperus virginiana</i> 'Glauc'	A	nízká		nízký
jalovec viržinský	<i>Juniperus virginiana</i> 'Kosteri'	A	nízká	jiný	nízký
jasan	<i>Fraxinus</i> sp.	A	vysoká		střední
jasan americký	<i>Fraxinus americana</i>	A	vysoká		nízký
jasan manový	<i>Fraxinus ornus</i>	A	vysoká		střední
jasan pensylvánský	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	D/B	vysoká		nízký
jasan pensylvánský	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> 'Aucubifolia'	B	vysoká		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
jasan úzkolistý	<i>Fraxinus angustifolia</i>	A	vysoká		střední
jasan úzkolistý	<i>Fraxinus angustifolia</i> 'Raywood'	A	vysoká		střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	A	vysoká		střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Allgold'	A	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Altena'	A	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Atlas'	A	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea'	A	vysoká		střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Aurea Pendula'	A	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Crispa'	A	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Diversifolia'	A	vysoká		střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Globosa'	C	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Heterophylla Pendula'	C	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Jaspidea'	A	vysoká		střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Nana'	C	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Pendula'	C	vysoká	jiný	střední
jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Westhofs Glorie'	A	vysoká		střední
javor	<i>Acer</i> sp.	A	střední		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i>	A	vysoká		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	C	vysoká	jiný	střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Nanum'	C	vysoká	jiný	střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Postelense'	A	vysoká		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Pulverulentum'	A	vysoká		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Queen Elizabeth'	A	vysoká		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Red Shine'	A	vysoká		střední
javor babyka	<i>Acer campestre</i> 'Royal Ruby'	A	vysoká		střední
javor cukrový	<i>Acer saccharum</i>	B	střední		nízký
javor červený	<i>Acer rubrum</i>	B	vysoká		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
javor červený	<i>Acer rubrum</i> 'Armstrong'	B	vysoká	jiný	nízký
javor červený	<i>Acer rubrum</i> 'October Glory'	B	vysoká		nízký
javor červený	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset'	B	vysoká		nízký
javor červený	<i>Acer rubrum</i> 'Scanlon'	B	vysoká	jiný	nízký
javor francouzský	<i>Acer monspessulanum</i>	C	střední		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i>	D/B	vysoká		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> 'Aureo-marginatum'	B	vysoká		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> 'Aureo-variegatum'	B	vysoká		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> 'Flamingo'	B	vysoká		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> 'Odessanum'	B	vysoká		nízký
javor jasanolistý	<i>Acer negundo</i> 'Variegatum'	B	vysoká		nízký
javor kapadocký	<i>Acer cappadocicum</i>	C	střední		nízký
javor kapadocký	<i>Acer cappadocicum</i> 'Aureum'	C	střední		nízký
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	A	střední		střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	A	střední		střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Brilliantissimum'	A	střední	jiný	střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Erectum'	A	střední	jiný	střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Leopoldii'	A	střední		střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Negenia'	A	střední	jiný	střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Rotterdam'	A	střední	jiný	střední
javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Worley'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Cleveland'	A	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	A	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson Sentry'	A	střední	jiný	střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Deborah'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Drummondii'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Emerald Queen'	A	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Faassen's Black'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	C	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Olmsted'	A	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Palmatifidum'	A	střední	jiný	střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Schwedleri'	A	střední		střední
javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Summershade'	A	střední	jiný	střední
javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i>	B	vysoká		nízký
javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i> 'Asplenifolium'	B	vysoká	jiný	nízký
javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i> 'Laciniatum Wieri'	B	vysoká	jiný	nízký
javor stříbrný	<i>Acer saccharinum</i> 'Pyramidale'	B	vysoká	jiný	nízký
jedle	<i>Abies</i> sp.	A	nízká		nízký
jedle balzamová	<i>Abies balsamea</i>	A	nízká		nízký
jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>	A	nízká		nízký
jedle bělokorá	<i>Abies alba</i> 'Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
jedle bělokorá	<i>Abies alba</i> 'Pyramidalis'	A	nízká	jiný	nízký
jedle jehlicovitá	<i>Abies holophylla</i>	A	nízká		nízký
jedle kavkazská	<i>Abies nordmanniana</i>	B	nízká		nízký
jedle korejská	<i>Abies koreana</i>	A	nízká		nízký
jedle nikko	<i>Abies homolepis</i>	A	nízká		nízký
jedle numidská	<i>Abies numidica</i>	A	nízká		nízký
jedle obrovská	<i>Abies grandis</i>	B	nízká		nízký
jedle ojíňená	<i>Abies concolor</i>	B	nízká		nízký
jedle řecká	<i>Abies cephalonica</i>	B	nízká		nízký
jedle sibiřská	<i>Abies sibirica</i>	A	nízká		nízký
jedle subalpínská	<i>Abies lasiocarpa</i>	A	nízká		nízký
jedle španělská	<i>Abies pinsapo</i>	A	nízká		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
jedle tuhá	<i>Abies firma</i>	A	nízká		nízký
jedle Veitchova	<i>Abies veitchii</i>	A	nízká		nízký
jedle vznešená	<i>Abies procera</i>	B	nízká		nízký
jedlovec	<i>Tsuga</i> sp.	A	nízká		nízký
jedlovec japonský	<i>Tsuga diversifolia</i>	A	nízká		nízký
jedlovec kanadský	<i>Tsuga canadensis</i>	A	nízká		nízký
jedlovec Mertensův	<i>Tsuga mertensiana</i>	A	nízká		nízký
jedlovec různolistý	<i>Tsuga heterophylla</i>	A	nízká		nízký
jedlovec Sieboldův	<i>Tsuga sieboldii</i>	A	nízká		nízký
jerlín	<i>Sophora</i> sp.	A	vysoká		nízký
jerlín japonský	<i>Sophora japonica</i>	A	vysoká		nízký
jerlín japonský	<i>Sophora japonica</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
jerlín japonský	<i>Sophora japonica</i> 'Regent'	A	vysoká	jiný	nízký
jeřáb	<i>Sorbus</i> sp.	A	nízká		střední
jeřáb břek	<i>Sorbus torminalis</i>	A	střední		nízký
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i>	C	nízká		střední
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i> 'Aurea'	C	nízká		střední
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i> 'Lutescens'	C	nízká		střední
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'	C	nízká	jiný	střední
jeřáb muk	<i>Sorbus aria</i> 'Majestica'	C	nízká	jiný	střední
jeřáb oskeruše	<i>Sorbus domestica</i>	A	nízká		střední
jeřáb prostřední	<i>Sorbus intermedia</i>	C	nízká		střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	C	střední		střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'	C	střední	jiný	střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Rossica Major'	C	střední	jiný	střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Sheerwater Seedling'	C	střední	jiný	střední
jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'	C	střední		střední
jeřáb zvrhlý	<i>Sorbus</i> × <i>hybrida</i>	C	nízká		nízký
jilm	<i>Ulmus</i> sp.	A	střední		střední
jilm čínský	<i>Ulmus parvifolia</i>	A	střední		nízký
jilm čínský	<i>Ulmus parvifolia</i> 'Geisha'	C	střední	jiný	nízký
jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	A	střední		střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i> 'Dampieri Aurea'	A	střední	jiný	střední
jilm holandský	<i>Ulmus</i> × <i>hollandica</i>	A	střední		nízký
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i>	A	střední		střední
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i> 'Camperdownii'	A	střední	jiný	střední
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i> 'Exoniensis'	A	střední	jiný	střední
jilm horský	<i>Ulmus glabra</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	střední
jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	A	střední		střední
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i>	A	střední		nízký
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i> 'Autumn Gold'	A	střední	jiný	nízký
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i> 'Fastigiata'	A	střední	jiný	nízký
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i> 'Horizontalis'	C	střední	jiný	nízký
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i> 'Mariken'	C	střední	jiný	nízký
jinan dvoulaločný	<i>Ginkgo biloba</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
jírovec	<i>Aesculus</i> sp.	A	střední		střední
jírovec červený	<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i>	A	střední		střední
jírovec červený	<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> 'Briotii'	A	střední		střední
jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	A	střední		střední
jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Baumannii'	A	střední		střední
jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Fastigiata'	A	střední	jiný	střední
jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Laciniata'	A	střední	jiný	střední
jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i> 'Pyramidalis'	A	střední	jiný	střední
jírovec pávie	<i>Aesculus pavia</i>	A	nízká		nízký
jírovec žlutý	<i>Aesculus flava</i>	A	nízká		nízký
kaštanovník jedlý	<i>Castanea sativa</i>	A	vysoká		střední
katalpa	<i>Catalpa</i>	B	střední		nízký
katalpa červenající	<i>Catalpa</i> × <i>erubescens</i>	B	střední		nízký
katalpa nádherná	<i>Catalpa speciosa</i>	B	střední		nízký
katalpa obecná	<i>Catalpa bignonioides</i>	B	střední		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
katalpa obecná	<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'	C	nízká	jiný	nízký
katalpa vejčitá	<i>Catalpa ovata</i>	B	střední		nízký
korkovník amurský	<i>Phellodendron amurense</i>	A	nízká		nízký
kryptomérie	<i>Cryptomeria</i> sp.	B	nízká		nízký
kryptomérie japonská	<i>Cryptomeria japonica</i>	B	nízká		nízký
kryptomérie japonská	<i>Cryptomeria japonica</i> 'Araucarioides'	B	nízká	jiný	nízký
kryptomérie japonská	<i>Cryptomeria japonica</i> 'Cristata'	B	nízká	jiný	nízký
liliovník	<i>Liriodendron</i> sp.	B	střední		nízký
liliovník tulipánokvětý	<i>Liriodendron tulipifera</i>	B	střední		nízký
liliovník tulipánokvětý	<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Aureomarginatum'	B	střední		nízký
liliovník tulipánokvětý	<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum'	B	střední	jiný	nízký
lípa	<i>Tilia</i> sp.	A	vysoká		vysoký
lípa americká	<i>Tilia americana</i>	A	vysoká		nízký
lípa americká	<i>Tilia americana</i> 'Nova'	A	vysoká	jiný	nízký
lípa americká	<i>Tilia americana</i> 'Redmond'	A	vysoká	jiný	nízký
lípa evropská	<i>Tilia</i> × <i>vulgaris</i>	A	vysoká		vysoký
lípa evropská	<i>Tilia</i> × <i>vulgaris</i> 'Pallida'	A	vysoká		vysoký
lípa evropská	<i>Tilia</i> × <i>vulgaris</i> 'Zwarte Linde'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa řapíkatá	<i>Tilia petiolaris</i>	A	vysoká		nízký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	A	vysoká		vysoký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i> 'Green Globe'	C	vysoká	jiný	vysoký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i> 'Roelvo'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i> 'Winter Orange'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	A	vysoká		nízký
lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'	A	vysoká	jiný	nízký
lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	A	vysoká		vysoký
lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Laciniata'	A	vysoká	jiný	vysoký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Örebro'	A	vysoká	jiný	vysoký
lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra'	A	vysoká		vysoký
lípa zelená	<i>Tilia × euchlora</i>	A	vysoká		vysoký
líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	A	střední		střední
magnolie	<i>Magnolia</i> sp.	A	nízká		nízký
magnolie japonská	<i>Magnolia kobus</i>	C	nízká		nízký
magnolie obvejčitá	<i>Magnolia hypoleuca</i>	C	nízká		nízký
magnolie přišpicatělá	<i>Magnolia acuminata</i>	A	nízká		nízký
mahalebka obecná	<i>Prunus mahaleb</i>	B	střední		nízký
mandlobroskvoň obecná	<i>Prunus × amygdalo-persica</i>	C	střední		nízký
meruňka	<i>Prunus</i> sp.	C	střední		nízký
meruňka obecná	<i>Prunus armeniaca</i>	C	střední		nízký
metasekvoje tisovcovitá	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	B	nízká		nízký
modřín	<i>Larix</i> sp.	A	střední		nízký
modřín americký	<i>Larix laricina</i>	A	střední		nízký
modřín daurský	<i>Larix gmelini</i>	A	střední		nízký
modřín japonský	<i>Larix kaempferi</i>	A	střední		nízký
modřín japonský	<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Rabbit'	C	střední	jiný	nízký
modřín japonský	<i>Larix kaempferi</i> 'Diana'	A	střední	jiný	nízký
modřín japonský	<i>Larix kaempferi</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
modřín sibiřský	<i>Larix sibirica</i>	A	střední		nízký
modřín západní	<i>Larix occidentalis</i>	A	střední		nízký
modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	A	střední		nízký
modřín opadavý	<i>Larix decidua</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
moruše černá	<i>Morus nigra</i>	A	střední		střední
morušovník	<i>Morus</i> sp.	A	střední		střední
morušovník bílý	<i>Morus alba</i>	A	střední		střední
morušovník bílý	<i>Morus alba</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	střední
myrobalán třešňový	<i>Prunus cerasifera</i>	B	střední		střední
nahovětvec kanadský	<i>Gymnocladus dioicus</i>	B	střední		nízký
olše	<i>Alnus</i> sp.	B	vysoká		střední
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	B	vysoká		střední
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> 'Aurea'	B	vysoká		střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'	B	vysoká	jiný	střední
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i> 'Laciniata'	B	vysoká	jiný	střední
olše Spaethova	<i>Alnus × spaethii</i>	B	střední		nízký
olše srdčitá	<i>Alnus cordata</i>	A	vysoká		nízký
olše šedá	<i>Alnus incana</i>	B	střední		střední
olše šedá	<i>Alnus incana</i> 'Aurea'	B	střední		střední
olše šedá	<i>Alnus incana</i> 'Laciniata'	B	střední	jiný	střední
olše šedá	<i>Alnus incana</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	střední
ořechovec vejčitý	<i>Carya ovata</i>	A	nízká		nízký
ořešák	<i>Juglans</i> sp.	A	střední		střední
ořešák černý	<i>Juglans nigra</i>	A	střední		střední
ořešák mandžuský	<i>Juglans mandshurica</i>	A	střední		nízký
ořešák popelavý	<i>Juglans cinerea</i>	A	střední		nízký
ořešák Sieboldův	<i>Juglans ailanthifolia</i>	A	střední		nízký
ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	A	střední		střední
ostolistec kopinatý	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	A	nízká		nízký
pajasan	<i>Ailanthus</i> sp.	D/B	nízká		nízký
pajasan žláznatý	<i>Ailanthus altissima</i>	D/B	nízká		nízký
pajehličník přeslenitý	<i>Sciadopitys verticillata</i>	A	nízká		nízký
pamodřín líbezný	<i>Pseudolarix amabilis</i>	A	nízká		nízký
paořech jasanolistý	<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	A	střední		nízký
parocie perská	<i>Parrotia persica</i>	A	střední		nízký
paulovnie plstnatá	<i>Paulownia tomentosa</i>	B	střední		nízký
pazerav	<i>Calocedrus</i> sp.	A	nízká		nízký
pazerav sbíhavý	<i>Calocedrus decurrens</i>	A	nízká		nízký
pazerav sbíhavý	<i>Calocedrus decurrens</i> 'Aureovariegata'	A	nízká		nízký
platan	<i>Platanus</i> sp.	A	střední		nízký
platan javorolistý	<i>Platanus × hispanica</i>	A	vysoká		střední
platan východní	<i>Platanus orientalis</i>	A	střední		nízký
platan západní	<i>Platanus occidentalis</i>	A	střední		nízký
pomeračovka jablkovitá	<i>Maclura pomifera</i>	A	střední		nízký
sakura	<i>Prunus</i> sp.	C	střední		nízký
sakura ozdobná	<i>Prunus serrulata</i>	C	střední		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
sakura ozdobná	<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'	C	střední	jiný	nízký
sakura ozdobná	<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'	C	střední	jiný	nízký
sakura ozdobná	<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-Shidare- Sakura'	C	střední	jiný	nízký
sakura ozdobná	<i>Prunus serrulata</i> 'Ukon'	C	střední	jiný	nízký
sekvojovec obrovský	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	A	střední		nízký
sekvojovec obrovský	<i>Sequoiadendron giganteum</i> 'Pendula'	C	střední	jiný	nízký
slivoň	<i>Prunus</i> sp.	C	střední		střední
slivoň domácí	<i>Prunus domestica</i>	C	střední		střední
slivoň kurilská	<i>Prunus kurilensis</i> 'Brillant'	C	střední		nízký
slivoň obecná	<i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i>	C	střední		střední
smrk	<i>Picea</i> sp.	B	nízká		nízký
smrk ajanský	<i>Picea jezoensis</i>	A	nízká		nízký
smrk Brewerův	<i>Picea breweriana</i>	A	nízká		nízký
smrk černý	<i>Picea mariana</i>	A	nízká		nízký
smrk černý	<i>Picea mariana</i> 'Beissneri'	C	nízká	jiný	nízký
smrk červený	<i>Picea rubens</i>	A	nízká		nízký
smrk drsný	<i>Picea asperata</i>	A	nízká		nízký
smrk dvojbarevný	<i>Picea alcoquiana</i>	A	nízká		nízký
smrk Engelmannův	<i>Picea engelmannii</i>	A	nízká		nízký
smrk lesklý	<i>Picea torano</i>	A	nízká		nízký
smrk li-ťiangský	<i>Picea likiangensis</i>	A	nízká		nízký
smrk omorika	<i>Picea omorika</i>	B	nízká		nízký
smrk omorika	<i>Picea omorika</i> 'Pendula'	C	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i>	A	nízká		nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Edith'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Endtz'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Erich Frahm'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Fat Albert'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Fürst Bismarck'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Glaucia'	A	nízká		nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Hoopsii'	A	nízká	jiný	nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Koster'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Moerheim'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Montgomery'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Oldenburg'	A	nízká	jiný	nízký
smrk pichlavý	<i>Picea pungens</i> 'Spek'	A	nízká	jiný	nízký
smrk Schrenkův	<i>Picea schrenkiana</i>	A	nízká		nízký
smrk sitka	<i>Picea sitchensis</i>	B	nízká		nízký
smrk sivý	<i>Picea glauca</i>	A	nízká		nízký
smrk východní	<i>Picea orientalis</i>	A	nízká		nízký
smrk východní	<i>Picea orientalis</i> 'Aureospica'	A	nízká		nízký
smrk východní	<i>Picea orientalis</i> 'Atrovirens'	A	nízká		nízký
smrk východní	<i>Picea orientalis</i> 'Aurea'	A	nízká		nízký
smrk východní	<i>Picea orientalis</i> 'Gracilis'	C	nízká	jiný	nízký
smrk Wilsonův	<i>Picea wilsonii</i>	A	nízká		nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	B	nízká		nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Argenteospica'	B	nízká		nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Aurea'	B	nízká		nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Aurea Magnifica'	B	nízká		nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Cinnamata'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Columnaris'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Cranstonii'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Cupressina'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Inversa'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Pendula Major'	C	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Rothenhaus'	B	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Viminalis'	C	nízká	jiný	nízký
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i> 'Virgata'	B	nízká	jiný	nízký
střemcha	<i>Padus</i> sp.	C	střední		střední
střemcha obecná	<i>Padus avium</i>	C	střední		střední
střemcha obecná	<i>Padus avium</i> 'Albertii'	C	střední	jiný	nízký
střemcha obecná	<i>Prunus padus</i> 'Colorata'	C	střední		nízký
střemcha pozdní	<i>Prunus serotina</i>	D/B	střední		střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
střemcha viržinská	<i>Prunus virginiana</i>	C	střední		nízký
svitel	<i>Koelreuteria</i> sp.	A	střední		nízký
svitel latnatý	<i>Koelreuteria paniculata</i>	A	střední		nízký
svitel latnatý	<i>Koelreuteria paniculata</i> 'Fastigiata'	A	střední	jiný	nízký
tis	<i>Taxus</i> sp.	A	vyšoká		nízký
tis červený	<i>Taxus baccata</i>	A	vyšoká		nízký
tis japonský	<i>Taxus cuspidata</i>	A	vyšoká		nízký
tisovec	<i>Taxodium</i> sp.	B	nížká		nízký
tisovec dvouřadý	<i>Taxodium distichum</i>	B	nížká		nízký
tisovec dvouřadý	<i>Taxodium distichum</i> 'Cascade Falls'	B	nížká	jiný	nízký
tisovec dvouřadý	<i>Taxodium distichum</i> 'Nutans'	B	nížká	jiný	nízký
tisovec dvouřadý	<i>Taxodium distichum</i> 'Pendens'	B	nížká	jiný	nízký
tisovec dvouřadý	<i>Taxodium distichum</i> 'Secrest'	B	nížká	jiný	nízký
tisovec vystoupavý	<i>Taxodium ascendens</i>	A	nížká		nízký
topol	<i>Populus</i> sp.	B	vyšoká		vyšoký
topol balzámový	<i>Populus balsamifera</i>	D/B	střední		nízký
topol berlínský	<i>Populus × berolinensis</i>	B	střední		nízký
topol bílý	<i>Populus alba</i>	B	vyšoká		vyšoký
topol bílý	<i>Populus alba</i> 'Nivea'	B	vyšoká		vyšoký
topol bílý	<i>Populus alba</i> 'Pyramidalis'	B	vyšoká	jiný	vyšoký
topol černý	<i>Populus nigra</i>	B	vyšoká		vyšoký
topol černý	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	B	vyšoká	jiný	nízký
topol chlupatoplodý	<i>Populus trichocarpa</i>	B	vyšoká		nízký
topol chlupatý	<i>Populus lasiocarpa</i>	B	střední		nízký
topol kanadský	<i>Populus × canadensis</i>	B	vyšoká		střední
topol osika	<i>Populus tremula</i>	B	vyšoká		vyšoký
topol osika	<i>Populus tremula</i> 'Erecta'	B	vyšoká	jiný	vyšoký
topol osika	<i>Populus tremula</i> 'Pendula'	C	vyšoká	jiný	vyšoký
topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	B	vyšoká		nízký
topol Simonův	<i>Populus simonii</i> 'Fastigiata'	B	vyšoká	jiný	nízký
topol Simonův	<i>Populus simonii</i> 'Pendula'	C	vyšoká	jiný	nízký
topol šedavý	<i>Populus × canescens</i>	B	vyšoká		střední

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
toreja californská	<i>Torreya californica</i>	A	střední		nízký
toreja japonská	<i>Torreya nucifera</i>	A	střední		nízký
trnovník	<i>Robinia</i> sp.	D/B	vyšoká		střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	D/B	vyšoká		střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Bessoniana'	B	vyšoká		střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'	B	vyšoká		střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pyramidalis'	B	vyšoká	jiný	střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Semperflorens'	B	vyšoká	jiný	střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Tortuosa'	C	vyšoká	jiný	střední
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'	C	vyšoká	jiný	střední
trnovník lepkavý	<i>Robinia viscosa</i>	B	střední		nízký
trnovník novomexický	<i>Robinia luxurians</i>	A	střední		nízký
třešeň	<i>Prunus</i> sp.	B	střední		střední
třešeň Hillierova	<i>Prunus hillieri</i> 'Spire'	C	střední		nízký
třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	B	střední		střední
třešeň obecná	<i>Prunus avium</i> 'Plena'	B	střední	jiný	střední
třešeň tibetská	<i>Prunus serrula</i>	C	střední		nízký
višeň	<i>Prunus</i> sp.	B	střední		střední
višeň chloupkatá	<i>Prunus subhirtella</i>	C	střední		nízký
višeň chloupkatá	<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis'	C	střední		nízký
višeň chloupkatá	<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis Rosea'	C	střední		nízký
višeň chloupkatá	<i>Prunus subhirtella</i> 'Fukubana'	C	střední	jiný	nízký
višeň chloupkatá	<i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula Plena Rosea'	C	střední	jiný	nízký
višeň jedoská	<i>Prunus × yedoensis</i>	C	střední		nízký
višeň jedoská	<i>Prunus × yedoensis</i> 'Ivensii'	C	střední	jiný	nízký
višeň jedoská	<i>Prunus × yedoensis</i> 'Shidare Yoshino'	C	střední	jiný	nízký
višeň obecná	<i>Prunus cerasus</i>	B	střední		střední
višeň Sargentova	<i>Prunus sargentii</i>	C	střední		nízký
višeň Sargentova	<i>Prunus sargentii</i> 'Rancho'	C	střední	jiný	nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
vrba	<i>Salix</i> sp.	B	vysoká		vysoký
vrba babylónská	<i>Salix babylonica</i>	B	vysoká		střední
vrba bílá	<i>Salix alba</i>	B	vysoká		vysoký
vrba bílá	<i>Salix alba</i> 'Liempde'	B	vysoká	jiný	vysoký
vrba bílá	<i>Salix alba</i> 'Sericea'	B	vysoká	jiný	vysoký
vrba bílá	<i>Salix alba</i> ssp.vitellina	B	vysoká	jiný	vysoký
vrba dlouholistá	<i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa'	C	vysoká		střední
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	B	vysoká		vysoký
vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	B	vysoká		vysoký
vrba lýkocová	<i>Salix daphnoides</i>	B	vysoká		střední
vrba načervenalá	<i>Salix × rubens</i>	B	vysoká		střední
vrba náhrobní	<i>Salix × sepulcralis</i>	B	vysoká		vysoký
vrba sachalinská	<i>Salix udensis</i>	B	vysoká		střední
zelkova	<i>Zelkova</i> sp.	A	střední		střední
zelkova habrolistá	<i>Zelkova carpinifolia</i>	A	střední		střední
zelkova ostrolistá	<i>Zelkova serrata</i>	A	střední		střední
zerav	<i>Thuja</i> sp.	B	střední		nízký
zerav japonský	<i>Thuja standishii</i>	A	střední		nízký
zerav korejský	<i>Thuja koraiensis</i>	A	střední		nízký
zerav obrovský	<i>Thuja plicata</i>	B	střední		nízký
zerav obrovský	<i>Thuja plicata</i> 'Atrovirens'	B	střední		nízký
zerav obrovský	<i>Thuja plicata</i> 'Zebrina'	B	střední		nízký
zerav východní	<i>Thuja orientalis</i>	B	střední		nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i>	B	střední		nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Alba'	B	střední	jiný	nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Brabant'	B	střední	jiný	nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Malonyana'	B	střední	jiný	nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	B	střední	jiný	nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Spiralis'	B	střední	jiný	nízký
zerav západní	<i>Thuja occidentalis</i> 'Wareana'	B	střední	jiný	nízký
zeravinec japonský	<i>Thujopsis dolabrata</i>	B	střední		nízký
zeravinec japonský	<i>Thujopsis dolabrata</i> 'Variegata'	B	střední		nízký
zmarličník	<i>Cercidiphyllum</i> sp.	C	střední		nízký

Český název druhu	Latinský název	Kategorie	Regenerovatelnost	Tvar koruny	Biologický význam taxonu
zmarličník japonský	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	C	střední		nízký
zmarličník japonský	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> 'Pendulum'	C	střední	jiný	nízký

Tab 2: Základní hodnota stromů

Průměr kmene (cm)	Obvod kmene (cm)	Kategorie A (ZBHs)	Kategorie B (ZBHs)	Kategorie C (ZBHs)	Kategorie D (ZBHs)
5	16	3 030	1 780	4 090	180
6	19	4 360	2 560	5 890	260
7	22	5 940	3 490	8 010	350
8	25	7 750	4 560	10 480	450
9	28	9 820	5 770	13 250	570
10	31	12 130	7 120	16 360	710
11	35	14 670	8 620	19 800	860
12	38	17 460	10 260	23 570	1 030
13	41	20 490	12 030	27 650	1 200
14	44	23 760	13 950	32 080	1 390
15	47	27 280	16 030	36 820	1 600
16	50	31 040	18 230	41 900	1 830
17	53	35 040	20 590	47 300	2 060
18	57	39 280	23 080	53 020	2 310
19	60	43 650	25 700	59 070	2 570
20	63	48 490	28 490	65 450	2 850
21	66	53 460	31 410	72 160	3 140
22	69	58 680	34 470	79 200	3 450
23	72	64 130	37 670	86 560	3 770
24	75	69 830	41 020	94 250	4 100
25	79	75 770	44 510	102 280	4 450
26–30	82–96	95 290	55 980	128 610	5 590
31–35	97–111	132 030	77 560	128 610	7 750
36–40	112–127	175 070	102 840	128 610	10 280
41–45	128–142	224 170	131 670	128 610	13 170
46–50	143–158	279 330	164 080	128 610	16 400
51–55	159–174	340 550	200 050	128 610	20 010
56–60	175–189	407 840	239 570	128 610	23 960
61–65	190–205	481 180	239 570	128 610	23 960
66–70	206–221	560 600	239 570	128 610	23 960
71–75	222–237	646 070	239 570	128 610	23 960
76–80	238–252	737 610	239 570	128 610	23 960
81–85	253–268	835 200	239 570	128 610	23 960
86–90	269–284	938 840	239 570	128 610	23 960
91–95	285–299	1 048 560	239 570	128 610	23 960
96 a více	300 a více	1 164 350	239 570	128 610	23 960

Tab. 3 a: Skutečný objem koruny – listnaté stromy (1. část tabulky)

Výška koruny (m)	Průměr koruny (m)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		14	25	39	57	77	101	127	157	190	226	265
4		19	34	52	75	103	134	170	209	253	302	354
5		24	42	65	94	128	168	212	262	317	377	442
6		28	50	79	113	154	201	254	314	380	452	531
7		33	59	92	132	180	235	297	367	443	528	619
8		38	67	105	151	205	268	339	419	507	603	708
9		42	75	118	170	231	302	382	471	570	679	796
10		47	84	131	188	257	335	424	524	634	754	885
11		52	92	144	207	282	369	467	576	697	829	973
12		57	101	157	226	308	402	509	628	760	905	1 062
13		78	109	170	245	334	436	551	681	824	980	1 150
14		84	117	183	264	359	469	594	733	887	1 056	1 239
15		90	126	196	283	385	503	636	785	950	1 131	1 327
16		96	134	209	302	411	536	679	838	1 014	1 206	1 416
17		102	182	223	320	436	570	721	890	1 077	1 282	1 504
18		108	192	236	339	462	603	763	942	1 140	1 357	1 593
19		114	203	249	358	487	637	806	995	1 204	1 433	1 681
20		120	214	262	377	513	670	848	1 047	1 267	1 508	1 770
21		126	224	350	396	539	704	891	1 100	1 330	1 583	1 858
22		132	235	367	415	564	737	933	1 152	1 394	1 659	1 947
23		138	246	384	434	590	771	975	1 204	1 457	1 734	2 035
24		144	256	401	452	616	804	1 018	1 257	1 521	1 810	2 124
25		150	267	417	601	641	838	1 060	1 309	1 584	1 885	2 212
26		156	278	434	625	667	871	1 103	1 361	1 647	1 960	2 301
27		162	288	451	649	693	905	1 145	1 414	1 711	2 036	2 389
28		168	299	467	673	718	938	1 188	1 466	1 774	2 111	2 478
29		174	310	484	697	949	972	1 230	1 518	1 837	2 187	2 566
30		180	320	501	721	981	1 005	1 272	1 571	1 901	2 262	2 655
31		186	331	517	745	1 014	1 039	1 315	1 623	1 964	2 337	2 743
32		192	342	534	769	1 047	1 072	1 357	1 676	2 027	2 413	2 832
33		198	352	551	793	1 079	1 410	1 400	1 728	2 091	2 488	2 920

Tab. 3 a: Skutečný objem koruny – listnaté stromy (2. část tabulky)

	Průměr koruny (m)											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	308	353	402	454	509	567	628	693	760	831	905	982
4	411	471	536	605	679	756	838	924	1014	1108	1206	1309
5	513	589	670	757	848	945	1047	1155	1267	1385	1508	1636
6	616	707	804	908	1018	1134	1257	1385	1521	1662	1810	1963
7	718	825	938	1059	1188	1323	1466	1616	1774	1939	2111	2291
8	821	942	1072	1211	1357	1512	1676	1847	2027	2216	2413	2618
9	924	1060	1206	1362	1527	1701	1885	2078	2281	2493	2714	2945
10	1026	1178	1340	1513	1696	1890	2094	2309	2534	2770	3016	3272
11	1129	1296	1474	1665	1866	2079	2304	2540	2788	3047	3318	3600
12	1232	1414	1608	1816	2036	2268	2513	2771	3041	3324	3619	3927
13	1334	1532	1743	1967	2205	2457	2723	3002	3294	3601	3921	4254
14	1437	1649	1877	2118	2375	2646	2932	3233	3548	3878	4222	4581
15	1539	1767	2011	2270	2545	2835	3142	3464	3801	4155	4524	4909
16	1642	1885	2145	2421	2714	3024	3351	3695	4055	4432	4825	5236
17	1745	2003	2279	2572	2884	3213	3560	3925	4308	4709	5127	5563
18	1847	2121	2413	2724	3054	3402	3770	4156	4562	4986	5429	5890
19	1950	2238	2547	2875	3223	3591	3979	4387	4815	5263	5730	6218
20	2053	2356	2681	3026	3393	3780	4189	4618	5068	5540	6032	6545
21	2155	2474	2815	3178	3563	3969	4398	4849	5322	5817	6333	6872
22	2258	2592	2949	3329	3732	4158	4608	5080	5575	6094	6635	7199
23	2360	2710	3083	3480	3902	4347	4817	5311	5829	6371	6937	7527
24	2463	2827	3217	3632	4072	4536	5027	5542	6082	6648	7238	7854
25	2566	2945	3351	3783	4241	4725	5236	5773	6336	6925	7540	8181
26	2668	3063	3485	3934	4411	4914	5445	6004	6589	7202	7841	8508
27	2771	3181	3619	4086	4580	5104	5655	6234	6842	7479	8143	8836
28	2874	3299	3753	4237	4750	5293	5864	6465	7096	7756	8445	9163
29	2976	3416	3887	4388	4920	5482	6074	6696	7349	8033	8746	9490
30	3079	3534	4021	4540	5089	5671	6283	6927	7603	8310	9048	9817
31	3181	3652	4155	4691	5259	5860	6493	7158	7856	8586	9349	10145
32	3284	3770	4289	4842	5429	6049	6702	7389	8109	8863	9651	10472
33	3387	3888	4423	4994	5598	6238	6912	7620	8363	9140	9953	10799

Vysvětlivky:



sloupovitá koruna
kulovitá koruna
zaoblená koruna

Tab. 3 b: Skutečný objem koruny – jehličnaté stromy (1. část tabulky)

	Průměr koruny (m)											
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Výška koruny (m)	3	7	13	20	28	38	50	64	79	95	113	133
	4	9	17	26	38	51	67	85	105	127	151	177
	5	12	21	33	47	64	84	106	131	158	188	221
	6	14	25	39	57	77	101	127	157	190	226	265
	7	16	29	46	66	90	117	148	183	222	264	310
	8	19	34	52	75	103	134	170	209	253	302	354
	9	21	38	59	85	115	151	191	236	285	339	398
	10	24	42	65	94	128	168	212	262	317	377	442
	11	26	46	72	104	141	184	233	288	348	415	487
	12	28	50	79	113	154	201	254	314	380	452	531
	13	31	54	85	123	167	218	276	340	412	490	575
	14	33	59	92	132	180	235	297	367	443	528	619
	15	35	63	98	141	192	251	318	393	475	565	664
	16	38	67	105	151	205	268	339	419	507	603	708
	17	40	71	111	160	218	285	360	445	539	641	752
	18	42	75	118	170	231	302	382	471	570	679	796
	19	45	80	124	179	244	318	403	497	602	716	841
	20	47	84	131	188	257	335	424	524	634	754	885
	21	49	88	137	198	269	352	445	550	665	792	929
	22	52	92	144	207	282	369	467	576	697	829	973
	23	54	96	151	217	295	385	488	602	729	867	1 018
	24	57	101	157	226	308	402	509	628	760	905	1 062
	25	59	105	164	236	321	419	530	654	792	942	1 106
	26	61	109	170	245	334	436	551	681	824	980	1 150
	27	64	113	177	254	346	452	573	707	855	1 018	1 195
	28	66	117	183	264	359	469	594	733	887	1 056	1 239
	29	68	121	190	273	372	486	615	759	919	1 093	1 283
	30	71	126	196	283	385	503	636	785	950	1 131	1 327
	31	73	130	203	292	398	519	657	812	982	1 169	1 372
	32	75	134	209	302	411	536	679	838	1 014	1 206	1 416
	33	78	138	216	311	423	553	700	864	1 045	1 244	1 460

Tab. 3 b: Skutečný objem koruny – jehličnaté stromy (2. část tabulky)

	Průměr koruny (m)											
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	154	177	201	227	254	284	314	346	380	415	452	491
4	205	236	268	303	339	378	419	462	507	554	603	654
5	257	295	335	378	424	473	524	577	634	692	754	818
6	308	353	402	454	509	567	628	693	760	831	905	982
7	359	412	469	530	594	662	733	808	887	969	1 056	1 145
8	411	471	536	605	679	756	838	924	1 014	1 108	1 206	1 309
9	462	530	603	681	763	851	942	1 039	1 140	1 246	1 357	1 473
10	513	589	670	757	848	945	1 047	1 155	1 267	1 385	1 508	1 636
11	564	648	737	832	933	1 040	1 152	1 270	1 394	1 523	1 659	1 800
12	616	707	804	908	1 018	1 134	1 257	1 385	1 521	1 662	1 810	1 963
13	667	766	871	984	1 103	1 229	1 361	1 501	1 647	1 800	1 960	2 127
14	718	825	938	1 059	1 188	1 323	1 466	1 616	1 774	1 939	2 111	2 291
15	770	884	1 005	1 135	1 272	1 418	1 571	1 732	1 901	2 077	2 262	2 454
16	821	942	1 072	1 211	1 357	1 512	1 676	1 847	2 027	2 216	2 413	2 618
17	872	1 001	1 139	1 286	1 442	1 607	1 780	1 963	2 154	2 354	2 564	2 782
18	924	1 060	1 206	1 362	1 527	1 701	1 885	2 078	2 281	2 493	2 714	2 945
19	975	1 119	1 273	1 438	1 612	1 796	1 990	2 194	2 408	2 631	2 865	3 109
20	1 026	1 178	1 340	1 513	1 696	1 890	2 094	2 309	2 534	2 770	3 016	3 272
21	1 078	1 237	1 407	1 589	1 781	1 985	2 199	2 425	2 661	2 908	3 167	3 436
22	1 129	1 296	1 474	1 665	1 866	2 079	2 304	2 540	2 788	3 047	3 318	3 600
23	1 180	1 355	1 541	1 740	1 951	2 174	2 409	2 655	2 914	3 185	3 468	3 763
24	1 232	1 414	1 608	1 816	2 036	2 268	2 513	2 771	3 041	3 324	3 619	3 927
25	1 283	1 473	1 676	1 892	2 121	2 363	2 618	2 886	3 168	3 462	3 770	4 091
26	1 334	1 532	1 743	1 967	2 205	2 457	2 723	3 002	3 294	3 601	3 921	4 254
27	1 385	1 590	1 810	2 043	2 290	2 552	2 827	3 117	3 421	3 739	4 072	4 418
28	1 437	1 649	1 877	2 118	2 375	2 646	2 932	3 233	3 548	3 878	4 222	4 581
29	1 488	1 708	1 944	2 194	2 460	2 741	3 037	3 348	3 675	4 016	4 373	4 745
30	1 539	1 767	2 011	2 270	2 545	2 835	3 142	3 464	3 801	4 155	4 524	4 909
31	1 591	1 826	2 078	2 345	2 630	2 930	3 246	3 579	3 928	4 293	4 675	5 072
32	1 642	1 885	2 145	2 421	2 714	3 024	3 351	3 695	4 055	4 432	4 825	5 236
33	1 693	1 944	2 212	2 497	2 799	3 119	3 456	3 810	4 181	4 570	4 976	5 400

Tab. 4: Tabulkový objem koruny

Průměr kmene [cm]	Obvod kmene [cm]	Objem koruny [m³]			
		Kuželovitá koruna	Sloupovitá koruna	Zaoblená koruna	Kulovitá koruna
25–30	79–96	39	110	148	153
31–35	97–111	58	132	203	188
36–40	112–127	83	152	267	229
41–45	128–142	115	169	338	278
46–50	143–158	157	186	415	336
51–55	159–174	209	202	498	407
56–60	175–189	272	219	586	494
61–65	190–205	346	237	676	602
66–70	206–221	428	257	769	734
71–75	222–237	513	279	861	895
76–80	238–252	594	303	952	1 086
81–85	253–268	663	331	1 038	1 303
86–90	269–284	713	363	1 119	1 525
91–95	285–299	741	399	1 193	1 717
96–100	301–314	749	442	1 257	1 830

Tab. 5: Koefficienty pro zhodnocení stavu stromu

		Zdravotní stav				
		1	2	3	4	5
Fyziologická vitalita	1	1	0,8	0,6	0,4	x
	2	0,8	0,7	0,5	0,3	0,01
	3	0,6	0,5	0,4	0,2	0,01
	4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,01
	5	x	0,01	0,01	0,01	0,01

Tab. 6: Koefficienty pro zhodnocení nevhodného řezu

Stupeň regenerovatelnosti	Fyziologická vitalita				
	1	2	3	4	5
vysoký	0,2	0,3	0,4	0,5	–
střední	0,6	0,7	0,8	0,9	–
nízký	0,9	0,9	1	1	–

Tab. 7: Koeficienty pro zhodnocení polohy umístění stromu

Růstové podmínky	Atraktivita umístění stromu				
	vysoká	střední	méně významná	nízká	velmi nízká
neovlivněné	0,8	0,6	0,4	0,2	0,03
dobré	0,85	0,7	0,5	0,3	0,05
zhoršené	0,9	0,8	0,6	0,4	0,1
extrémní	1	0,85	0,7	0,5	0,2

Tab. 8: Koeficienty pro zhodnocení počtu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem

Součet bodů dle výskytu prvků se zvýšeným biologickým potenciálem	Koeficient
2 až 3	0,1
4 až 6	0,2
7 a více	0,3

Tab. 9: Koeficienty pro zhodnocení biologického významu taxonu

Biologický význam taxonu		
Nízký	Střední	Vysoký
0,6	0,8	1

Tab. 10: Základní hodnota porostu dřevin

Charakter porostu dřevin	Doplňková charakteristika	Základní hodnota za 1 m ²
Keře nízké		810
Keře vysoké		520
Liány		650
Porost stromů	kultura	430
	mlazina	600
	dospívající a dospělý porost	810
	věkově diferencovaný porost	650

Tab. 11: Seznam invazivních dřevin

Odborný název	Český název
<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý
<i>Ailanthus altissima</i>	pajasan žláznatý
<i>Amorpha fruticosa</i>	netvařec křovitý
<i>Fallopia aubertii</i>	opletko čínská
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jasan pensylvánský
<i>Lycium barbarum</i>	kustovnice cizí
<i>Parthenocissus inserta</i>	loubinec popínavý
<i>Populus balsamifera</i>	topol balzámový
<i>Prunus serotina</i>	střemcha pozdní
<i>Rhus typhina</i>	škumpa orobincová
<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát
<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý

Tab. 12: Koeficienty pro úpravu porostu dřevin podle pěstebního stavu a vhodnosti

Vhodnost porostu	Pěstební stav porostu dřevin		
	Pěstebně zanedbaný	Průběžně nevychovávaný	Porost vychovávaný
Porost invazivních dřevin	0	0	0
Porost nežádoucí	0,3	0,4	0,5
Porosty ostatní	0,5	0,6	0,7
Porost vhodné skladby	0,7	0,9	1

Tab. 13: Koeficienty pro úpravu porostu dřevin podle umístění a biologické hodnoty

Biologická hodnota	Atraktivita umístění porostu dřevin		
	Méně významná	Střední	Vysoká
Nízká	0,2	0,4	0,7
Střední	0,4	0,6	0,9
Vysoká	0,7	0,9	1

Tab. 14 a: Listnaté stromy I

Mezinárodní název	Český název
<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá
<i>Alnus incana</i>	olše šedá
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá
<i>Betula pubescens</i>	bříza pýřitá
<i>Populus × berolinensis</i>	topol berlínský
<i>Populus × canadensis</i>	topol kanadský
<i>Populus × canescens</i>	topol šedavý
<i>Populus alba</i>	topol bílý
<i>Populus nigra</i>	topol černý
<i>Populus simonii</i>	topol Simonův
<i>Populus tremula</i>	topol osika
<i>Populus trichocarpa</i>	topol chlupatoplodý
<i>Salix alba</i>	vrba bílá
<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká

Tab. 14 b: Listnaté stromy II

Mezinárodní název	Český název
<i>Acer platanoides</i>	javor mlč
<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen
<i>Acer saccharinum</i>	javor stříbrný
<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal
<i>Betula ermanii</i>	bříza Ermanova
<i>Betula jacquemontii</i>	bříza Jacquemontova
<i>Betula lenta</i>	bříza tuhá
<i>Betula papyrifera</i>	bříza papírovitá
<i>Castanea sativa</i>	kaštanovník jedlý
<i>Catalpa bignonioides</i>	katalpa trubačovitá
<i>Celtis occidentalis</i>	břestovec západní
<i>Cerasus (Prunus) avium</i>	třešeň ptačí
<i>Cerasus (Prunus) mahaleb</i>	mahalebka obecná
<i>Cerasus (Prunus) sargentii</i>	třešeň Sargentova
<i>Cercidophyllum japonicum</i>	zmarličník japonský
<i>Crataegus sp.</i>	hloh – všechny druhy
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
<i>Fraxinus ornus</i>	jasan zimnář

Mezinárodní název	Český název
<i>Gymnocladus dioica</i>	nahovětvec dvoudomý
<i>Juglans cinerea</i>	orešák popelavý
<i>Juglans nigra</i>	orešák černý
<i>Juglans regia</i>	orešák královský
<i>Magnolia tripetala</i>	magnolie (šácholán) trojplátečná
<i>Magnolia acuminata</i>	magnolie (šácholán) přišpičatělá
<i>Magnolia denudata</i>	magnolie (šácholán) obnažená
<i>Magnolia kobus</i>	magnolie (šácholán) kobus
<i>Malus sp.</i>	jabloň – botanické a okrasné druhy
<i>Morus alba</i>	morušovník bílý
<i>Morus nigra</i>	morušovník černý
<i>Morus rubra</i>	morušovník červený
<i>Padus avium (Prunus padus)</i>	střemcha obecná
<i>Paulownia tomentosa</i>	paulovnie plstnatá
<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrabolán
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	pterokarye jasanolistá
<i>Pyrus sp.</i>	hrušeň – botanické a okrasné druhy
<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí
<i>Sorbus intermedia</i>	jeřáb prostřední
<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský
<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz
<i>Ulmus minor</i>	jilm habrolistý

Tab. 14 c: Listnaté stromy III

Mezinárodní název	Český název
<i>Acer campestre</i>	javor babyka
<i>Acer rubrum</i>	javor červený
<i>Aesculus × carnea</i>	jírovec pleťový
<i>Carpinus betulus</i>	habr obecný
<i>Carya ovata</i>	orechovec vejčitý
<i>Cerasus (Prunus) fruticosa</i>	třešeň křovitá
<i>Cerasus (Prunus) serrulata</i>	třešeň sakura
<i>Cerasus (Prunus) subhirtella</i>	třešeň (višeň) chloupkatá
<i>Corylus colurna</i>	líška turecká
<i>Fagus sylvatica</i>	buk lesní
<i>Gleditsia triacanthos</i>	dřezovec trojtrnný

Mezinárodní název	Český název
<i>Koelreuteria paniculata</i>	svitel latnatý
<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambroň západní
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liliovník tulipánokvětý
<i>Phellodendron amurense</i>	korkovník amurský
<i>Platanus × acerifolia (hispanica)</i>	platan javorolistý
<i>Quercus cerris</i>	dub cer
<i>Quercus coccinea</i>	dub šarlatový
<i>Quercus frainetto</i>	dub uherský
<i>Quercus macranthera</i>	dub velkokvětý
<i>Quercus palustris</i>	dub bahenní
<i>Quercus petraea</i>	dub zimní
<i>Quercus pubescens</i>	dub pýřitý
<i>Quercus robur</i>	dub letní
<i>Quercus rubra</i>	dub červený
<i>Sophora japonica</i>	jerlín japonský
<i>Sorbus aria</i>	jeřáb muk
<i>Sorbus domestica</i>	jeřáb oskeruše
<i>Sorbus torminalis</i>	jeřáb břek
<i>Tilia americana</i>	lípa americká
<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá
<i>Tilia euchlora</i>	lípa krymská
<i>Tilia petiolaris</i>	lípa řapíkatá
<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá
<i>Tilia tomentosa</i>	lípa plstnatá
<i>Tilia vulgaris (× europaea)</i>	lípa obecná
<i>Ulmus × hollandica</i>	jilm holandský
<i>Zelkova carpinifolia</i>	zelkova habrolistá

Tab. 14 d: Jehličnaté stromy I

Mezinárodní název	Český název
<i>Abies alba</i>	jedle bělokorá
<i>Abies grandis</i>	jedle obrovská
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	cypřišek Lawsonův
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	cypřišek nutka
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	cypřišek hrachonosný
<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý

Mezinárodní název	Český název
<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý
<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní
<i>Pinus uncinata</i>	borovice pyrenejská
<i>Platycladus (Thuja) orientalis</i>	zeravec východní
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	douglaska tisolistá
<i>Thuja occidentalis</i>	zerav západní
<i>Thuja plicata</i>	zerav obrovský

Tab. 14 e: Jehličnaté stromy II

Mezinárodní název	Český název
<i>Abies amabilis</i>	jedle nádherná
<i>Abies balsamea</i>	jedle balzámová
<i>Abies cephalonica</i>	jedle řecká
<i>Abies concolor</i>	jedle ojíňená
<i>Abies homolepis</i>	jedle nikko
<i>Abies koreana</i>	jedle korejská
<i>Abies lasiocarpa</i>	jedle subalpínská
<i>Abies magnifica</i>	jedle nádherná
<i>Abies nordmanniana</i>	jedle kavkazská
<i>Abies numidica</i>	jedle numidská
<i>Abies pinsapo</i>	jedle španělská
<i>Abies procera</i>	jedle vznešená
<i>Abies sibirica</i>	jedle sibiřská
<i>Abies veitchii</i>	jedle Veitchova
<i>Calocedrus decurrens</i>	pazerav cedrový
<i>Cedrus atlantica</i>	cedr atlantský
<i>Cedrus deodara</i>	cedr himalájský
<i>Cedrus libani</i>	cedr libanonský
<i>Cryptomeria japonica</i>	kryptomerie japonská
<i>Ginkgo biloba</i>	jinan dvojlaločný
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	cypřišek tupolistý
<i>Chamaecyparis thyoides</i>	cypřišek zeravovitý
<i>Juniperus chinensis</i>	jalovec čínský
<i>Juniperus scopulorum</i>	jalovec skalní
<i>Juniperus virginiana</i>	jalovec viržinský
<i>Larix kaempferi</i>	modřín japonský

Mezinárodní název	Český název
<i>Larix laricina</i>	modřín americký
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekvoje tisovcovitá
<i>Picea breweriana</i>	smrk Brewerův
<i>Picea engelmannii</i>	smrk Engelmannův
<i>Picea glauca</i>	smrk sivý
<i>Picea jezoensis</i>	smrk ajanský
<i>Picea mariana</i>	smrk černý
<i>Picea omorika</i>	smrk omorika
<i>Picea orientalis</i>	smrk východní
<i>Picea pungens</i>	smrk pichlavý
<i>Picea sitchensis</i>	smrk sitka
<i>Pinus aristata</i>	borovice osinatá
<i>Pinus armandii</i>	borovice Armandova
<i>Pinus banksiana</i>	borovice Banksova
<i>Pinus cembra</i>	borovice limba
<i>Pinus contorta</i>	borovice pokroucená
<i>Pinus densiflora</i>	borovice hustokvětá
<i>Pinus flexilis</i>	borovice ohebná
<i>Pinus heldreichii</i>	borovice Heldreichova
<i>Pinus jeffreyi</i>	borovice Jeffreyova
<i>Pinus koraiensis</i>	borovice korejská
<i>Pinus monticola</i>	borovice pohorská
<i>Pinus nigra</i>	borovice černá
<i>Pinus parviflora</i>	borovice drobnokvětá
<i>Pinus peuce</i>	borovice rumelská
<i>Pinus ponderosa</i>	borovice žlutá
<i>Pinus pungens</i>	borovice pichlavá
<i>Pinus resinosa</i>	borovice smolná
<i>Pinus rigida</i>	borovice tuhá
<i>Pinus rotundata</i>	borovice blatka
<i>Pinus strobus</i>	borovice vejmutovka
<i>Pinus wallichiana</i>	borovice himalájská
<i>Pseudolarix amabilis</i>	pamodřín líbezný
<i>Sequoiadendron giganteum</i>	sekvojovec obrovský
<i>Taxodium distichum</i>	tisovec dvouřadý
<i>Taxus baccata</i>	tis červený
<i>Taxus cuspidata</i>	tis japonský

Mezinárodní název	Český název
<i>Thuja standishii</i>	zerav japonský
<i>Thujopsis dolabrata</i>	zeravinec japonský
<i>Tsuga canadensis</i>	jedlovec kanadský
<i>Tsuga caroliniana</i>	jedlovec karolínský
<i>Tsuga diversifolia</i>	jedlovec různolistý
<i>Tsuga heterophylla</i>	jedlovec západoamerický
<i>Tsuga mertensiana</i>	jedlovec Mertensův

Tab. 15: Kompenzační opatření – výsadby

	Velikostní kategorie dřeviny	Základní hodnota
1. skupina listnaté stromy	100/150	7 694
	150/200	8 516
	200/250	10 102
	10/12	12 085
	12/14	15 155
	14/16	18 723
	16/18	20 861
	18/20	25 717
	20/25	31 314
2. skupina listnaté stromy	100/150	7 754
	150/200	8 659
	200/250	10 261
	10/12	12 523
	12/14	15 909
	14/16	19 354
	16/18	21 767
	18/20	27 310
	20/25	32 143

	Velikostní kategorie dřeviny	Základní hodnota
3. skupina listnaté stromy	100/150	7 938
	150/200	8 926
	200/250	10 773
	10/12	12 674
	12/14	15 898
	14/16	19 174
	16/18	21 276
	18/20	26 355
	20/25	30 513
4. skupina jehličnaté stromy	100/125	6 952
	125/150	7 819
	150/175	8 475
	175/200	9 525
	200/225	9 966
	225/250	10 220
	250/300	12 501
5. skupina jehličnaté stromy	100/125	6 666
	125/150	7 107
	150/175	7 691
	175/200	8 359
	200/225	9 371
	225/250	9 669
	250/300	12 739
6. skupina listnaté keře	Kontejner 1l	988
	Kontejner 2l	2 048
	Kontejner 3l	3 398
7. skupina jehličnaté keře	Kontejner 1l	980
	Kontejner 2l	2 042
	Kontejner 3l	3 402

Tab. 16: Kompenzační opatření – výchovný řez

Výšková kategorie (V_v)	Základní hodnota
stromy do 4 m výšky	221
stromy 4–6 m vysoké	386
stromy 6–9 m vysoké	771

Tab. 17: Kompenzační opatření – zdravotní řez

Ideální plocha stromu (I_{ps})	Základní hodnota
do 30 m ²	930
přes 30 m ² do 60 m ²	1 859
přes 60 m ² do 90 m ²	2 789
přes 90 m ² do 120 m ²	2 972
přes 120 m ² do 150 m ²	3 718
přes 150 m ² do 180 m ²	4 642
přes 180 m ² do 210 m ²	5 015
přes 210 m ² do 240 m ²	5 760
přes 240 m ² do 270 m ²	6 317
přes 270 m ² do 300 m ²	7 058
přes 300 m ² do 330 m ²	7 246
přes 330 m ² do 360 m ²	7 986
přes 360 m ² do 390 m ²	8 732
přes 390 m ² do 420 m ²	9 289
přes 420 m ² do 450 m ²	10 030
přes 450 m ² do 480 m ²	10 586
přes 480 m ² do 510 m ²	11 331
přes 510 m ² do 540 m ²	12 072
přes 540 m ² do 570 m ²	12 633
přes 570 m ² do 600 m ²	13 190

Tab. 18: Kompenzační opatření – bezpečnostní řez

Ideální plocha stromu (I_{ps})	Základní hodnota
do 30 m ²	746
přes 30 m ² do 60 m ²	1 486
přes 60 m ² do 90 m ²	2 232
přes 90 m ² do 120 m ²	2 415
přes 120 m ² do 150 m ²	2 972
přes 150 m ² do 180 m ²	3 718
přes 180 m ² do 210 m ²	4 086
přes 210 m ² do 240 m ²	4 642
přes 240 m ² do 270 m ²	5 199
přes 270 m ² do 300 m ²	5 944
přes 300 m ² do 330 m ²	6 128
přes 330 m ² do 360 m ²	6 690

Ideální plocha stromu (I_{ps})	Základní hodnota
přes 360 m ² do 390 m ²	7 246
přes 390 m ² do 420 m ²	7 614
přes 420 m ² do 450 m ²	8 176
přes 450 m ² do 480 m ²	8 739
přes 480 m ² do 510 m ²	9 289
přes 510 m ² do 540 m ²	10 030
přes 540 m ² do 570 m ²	10 401
přes 570 m ² do 600 m ²	10 958

Tab. 19: Kompenzační opatření – lokální redukce

Ideální plocha stromu (I_{ps})	Základní hodnota
do 30 m ²	311
přes 30 m ² do 60 m ²	558
přes 60 m ² do 90 m ²	867
přes 90 m ² do 120 m ²	930
přes 120 m ² do 150 m ²	1 115
přes 150 m ² do 180 m ²	1 300
přes 180 m ² do 210 m ²	1 486
přes 210 m ² do 240 m ²	1 672
přes 240 m ² do 270 m ²	1 858
přes 270 m ² do 300 m ²	2 044
přes 300 m ² do 330 m ²	2 230
přes 330 m ² do 360 m ²	2 353
přes 360 m ² do 390 m ²	2 600
přes 390 m ² do 420 m ²	2 786
přes 420 m ² do 450 m ²	2 972
přes 450 m ² do 480 m ²	3 158
přes 480 m ² do 510 m ²	3 344
přes 510 m ² do 540 m ²	3 530
přes 540 m ² do 570 m ²	3 715
přes 570 m ² do 600 m ²	3 901

Tab. 20: Kompenzační opatření – obvodová redukce

Ideální plocha stromu (I_{ps})	Základní hodnota
do 30 m ²	1 114
přes 30 m ² do 60 m ²	2 232
přes 60 m ² do 90 m ²	3 345
přes 90 m ² do 120 m ²	3 530
přes 120 m ² do 150 m ²	4 458
přes 150 m ² do 180 m ²	5 387
přes 180 m ² do 210 m ²	5 944
přes 210 m ² do 240 m ²	6 690
přes 240 m ² do 270 m ²	7 614
přes 270 m ² do 300 m ²	8 359
přes 300 m ² do 330 m ²	8 549
přes 330 m ² do 360 m ²	9 289
přes 360 m ² do 390 m ²	10 218
přes 390 m ² do 420 m ²	10 958
přes 420 m ² do 450 m ²	11 704
přes 450 m ² do 480 m ²	12 444
přes 480 m ² do 510 m ²	13 373
přes 510 m ² do 540 m ²	14 119
přes 540 m ² do 570 m ²	14 859
přes 570 m ² do 600 m ²	15 605

Tab. 21: Kompenzační opatření – statické vazby

Počet instalovaných vazeb	Základní hodnota
1	3 621
2	6 470
3	9 320
4	12 169
5	15 019
6	17 869
7	20 718
8	23 566
9	26 416
10	29 266

Tab. 22: Kompenzační opatření – dynamické vazby

Počet instalovaných vazeb	Základní hodnota
1	2 050
2	3 770
3	5 490
4	7 209
5	8 928
6	10 648
7	12 367
8	14 087
9	15 807
10	17 416

V METODICKÉ ŘADĚ AOPK ČR BYLO DOSUD VYDÁNO:

Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody – 2021

Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování – 2021

Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků – 2020

Doprava a ochrana fauny v České republice – 2020

Biologické hodnocení rybích přechodů – 2020

Jak značit exempláře CITES? – 2019

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na evropskou unii – 2018

Jak pastevečtí psi chrání stáda – 2018

Metodika monitoringu návštěvnosti v chráněných územích – 2017

Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav – 2016

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality – 2014

Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu – 2014

Metodika pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině – 2013

Oceňování dřevin rostoucích mimo les – 2013

Jak značit exempláře CITES? – 2011

Vydra a doprava – 2011

Metodika péče o lokality vybraných druhů ohrožených rostlin

- vstavač trojzubý – 2011
- kuřička hadcová – 2011
- sinokvět chrpovitý – 2011
- hořeček mnohotvarý český – 2011

Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů, II. aktualizované vydání – 2010

Oceňování dřevin rostoucích mimo les – 2009

Raci v České republice – 2009

Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 – 2008

Památné stromy – 2008

Hodnocení fragmentace krajiny dopravou – 2005

Revitalizace vodního prostředí – 2003

Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční – 2003

Metodika pro zpracování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin a živočichů – 2002

Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd, III. vydání – 2002

Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy – 2001

Rez dřevin ve městě a krajině – 2000

Péče o chráněná území II. – 1999

Péče o chráněná území I. – 1999

Metodika přípravy plánů péče – 1999

Monitorování ekologických změn – 1995

Metodika monitoringu zdravotního stavu dřevin – 1995

Metodika sledování výskytu vážek – 1995

Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů – 1995

Ochrana plazů – 1995

Grafióza dubu – 1994

www.jednapriroda.cz

Autoři textu:

Jaroslav Kolařík

Andrea Szórádová, Hana Holešová, Jiří Mikulášek, Kateřina Kaprová, Jan Karel, Eva Smolová, Radek
Jareš

Autoři fotografií:

snímek na obálce – Libor Sedláček

snímky v publikaci – Jaroslav Kolařík, Andrea Szórádová

Grafické zpracování: Jan Mastný

Vydání: čtvrté

Vydala:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11–Chodov

email: **aopkcr@nature.cz**, distribuce publikací: **knihovna@nature.cz**

© AOPK ČR, 2022

ISBN 978-80-7620-099-9 (brožováno)

NEPRODEJNÉ

