

# 강의 15: 최단 경로 I: 도입

## 강의 개요

- 가중 그래프
- 일반적인 접근
- 음의 간선
- 최적 부분 구조

## 읽을 거리

CLRS, Sections 24 (Intro)

일반적으로  $E \propto V^2$

## 동기:

$A$ 에서  $B$ 로 가는 가장 짧은 거리 구글 지도의 “길 찾기”

공식화: 가중 그래프  $G(V, E)$   $W : E \rightarrow R$ 의 문제

두 알고리즘: 다익스트라  $O(V \lg V + E)$ 는 음이 아닌 가중치를 가정

벨만-포드  $O(VE)$ 는 일반적인 알고리즘  $O(V^2)$

## 적용

- 칼텍에서 MIT까지의 최단 경로 찾기
  - web.mit.edu에서 “CalTech Cannon Hack” 사진을 보세요
  - 칼텍에서 MIT까지 구글맵을 보세요
- 가중 그래프  $G(V, E)$ ,  $W : E \rightarrow R$ 의 모델
  - $V$  = 정점 (도로의 교차점)
  - $E$  = 간선 (거리, 도로); 방향 간선 (일반통행 도로)
  - $W(U, V)$  = 간선  $(u, v)$ 의 가중치 (거리, 통행료)

벨만-포드  $O(V^3)$

일반적인

다익스트라

$$\begin{aligned} \text{path } p &= \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle \\ (v_i, v_{i+1}) &\in E \text{ for } 0 \leq i < k \\ w(p) &= \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1}) \end{aligned}$$

가중 그래프:

표기:

$\overset{p}{v_0 \longrightarrow v_k}$  는  $v_0$  에서  $v_k$  까지의 경로  $p$  를 의미한다.  $(v_0)$  는  $v_0$  에서  $v_0$  까지의 가중치 0인 경로를 의미한다.

정의:

$u$  에서  $v$  까지 최단 경로의 가중치를 다음과 같이 정의한다.

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min \left\{ w(p) : \overset{p}{u \longrightarrow v} \right\} & \text{if } \exists \text{ any such path} \\ \infty & \text{otherwise (} v \text{ unreachable from } u \text{)} \end{cases}$$

단일 출발 최단 경로:

$G(V, E), w$  와 시작 정점  $s$  가 주어져 있을 때,  $s$  부터 각각의  $v \in V$  까지의  $\delta(s, v)$  [와 최단 경로]를 찾아라.

자료 구조:

$$\begin{aligned} d[v] &= \text{value inside circle} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{if } v = s \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases} \longleftarrow \text{initially} \\ &= \delta(s, v) \longleftarrow \text{at end} \\ d[v] &\geq \delta(s, v) \quad \text{at all times} \end{aligned}$$

$d[v]$  는  $v$  로 가는 더 좋은 경로를 찾을 때 마다 줄어든다, [그림 1](#)을 보아라.

$\Pi[v] = v$  로 가는 최적 경로의 선행자,  $\Pi[s] = \text{NIL}$

예:




그림 1: 최단 경로 예시: 두꺼운 간선으로부터 선행 관계  $\Pi$ 를 알 수 있다.

### 음의 가중치 간선:

- 몇몇 적용에는 자연스럽다 (예, 가중치로 로그가 쓰이는 경우)
- 몇몇 알고리즘은 음의 가중치를 갖는 간선을 허용하지 않는다. (예, 다익스트라)
- 음의 가중치를 갖는 간선이 있으면, 음의 사이클이 있을 수도 있다.  
 $\Rightarrow$  최단 경로가 없을 수도 있다!

예:

그림 2를 보자

$B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B$  (원점)은  $-6 + 2 + 3 = -1 < 0$ 의 가중치를 갖는다! 최단 경로  $S \rightarrow C$  (또는  $B, D, E$ )는 정의되지 않는다.  $B \rightarrow D \rightarrow C$ 를 원하는 만큼 반복할 수 있기 때문이다.




그림 2: 음의 가중치를 갖는 간선.

최단 경로  $S \rightarrow A$ 는 정의되고 가중치 2를 갖는다

음의 간선이 있는 경우, 최단 경로 알고리즘은 음의 사이클을 찾을 수 있어야 한다.  
(예, 벨만-포드)

최단 경로 알고리즘의 일반적인 구조 (음의 사이클이 없는 경우)

```

Initialize:      for  $v \in V$ :  $d[v] \leftarrow \infty$ 
                   $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$ 
                   $d[S] \leftarrow 0$ 
Main:            repeat
                  select edge  $(u, v)$  [somehow]
                  [ if  $d[v] > d[u] + w(u, v)$  :
                     $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$ 
                     $\pi[v] \leftarrow u$ 
                  ]
                  until all edges have  $d[v] \leq d[u] + w(u, v)$ 
  
```

"Relax" edge  $(u, v)$   
relaxation

**복잡도:**

종료 조건? (음의 사이클이 없다고 해도 보여야 한다)  
간선을 잘못 선택하는 경우 지수 시간이 될 수 있다.




그림 3: 일반적인 알고리즘의 실행 과정.  $v_0$  과  $v_1$  에서 나가는 간선들은 4,  $v_2$  와  $v_3$  에서 나가는 간선들은 2,  $v_4$  와  $v_5$  에서 나가는 간선들은 1의 가중치를 갖는다.

그림 3의 예에서 더 일반화하면,  $n$ 개의 간선이 있고 첫 세 개의 간선이  $2^{n/2}$ 의 가중치를 갖고, 두 번째 간선들은  $2^{n/2-1}$ 의 가중치를 갖는 식으로 된다. 경로적으로 간선을 선택하면  $d(v_{n-1})$ 의 첫 값이  $(2^{n/2} + 2^{(n/2)-1} + \dots + 4 + 2 + 1)$ 이 될 것이다. 이 순서로,  $v_{n-3}$ 과  $v_{n-1}$ 을 연결하는 가중치가 1인 간선을 완화할 수 있을 것이다. 그러면,  $d(v_{n-1})$ 는 1이 줄어들 것이다. 그리고  $v_{n-5}$ 와  $v_{n-3}$ 을 연결하는 가중치 2인 간선에 대해 완화하면,  $d(v_{n-2})$ 가 2만큼 줄어들 것이다. 그 후로,  $d(v_{n-1})$ 을 1만큼 줄이기 위해 간선  $(v_{n-3}, v_{n-2})$ 와  $(v_{n-2}, v_{n-1})$ 에 대해 완화할 수 있다. 그리고, 또 간선  $(v_{n-3}, v_{n-1})$ 에 대해 완화한다. 이런 식으로,  $d(v_{n-1})$ 를 한 번 완화할 때마다 1씩 줄이면서  $2^{n/2} + 2^{(n/2)-1} + \dots + 4 + 2 + 1$ 까지 줄일 수 있을 것이다. 이는  $O(2^{n/2})$  시간이 걸린다.

**최적 부분 구조:** Optimum substructure property

**정리:** 최단 경로의 부분 경로는 최단 경로이다.

$p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$  를 최단 경로라고 하고  
 $p_{ij} = \langle v_0, v_{i+1}, \dots, v_j \rangle$   $0 \leq i \leq j \leq k$  라고 하면

$p_{ij}$  는 최단 경로이다.

**Proof:**  $p = v_0 \xrightarrow{p_{0,i}} v_i \xrightarrow[p'_{ij}]{p_{ij}} v_j \xrightarrow{p_{j,k}} v_k$

만약  $p'_{ij}$  가  $p_{ij}$  보다 작다고 하면,  $p_{ij}$  대신  $p'_{ij}$  를 사용하게 되면  $p$  보다 작아진다.  
**모순.**

삼각 부등식:

정리: 모든  $u, v, x \in X$  에 대해,

$$\delta(u, v) \leq \delta(u, x) + \delta(x, v)$$

이다.

증명:




그림 4: 삼각 부등식

MIT OpenCourseWare

<http://ocw.mit.edu>

6.006 Introduction to Algorithms

Fall 2011

For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: <http://ocw.mit.edu/terms>.