

Cinzas do Brasil

Análise Multidimensional de Dados de Queimadas

Projeto final da Disciplina Processamento Analítico de Dados

Realizado por:

Felipe Carneiro Machado - 14569373

Lívia Lelis - 12543822

Clara Ernesto de Carvalho - 14559479

Contexto do Problema

30,8 milhões de hectares queimados no Brasil em 2024

- Área maior que toda a Itália

Objetivo: Criar um Data Warehouse para análise de:

- Correlações entre queimadas e clima
- Padrões espaciais e temporais
- Impactos na qualidade do ar

Fontes de Dados

Queimadas - INPE

- Focos de incêndio detectados por satélite
- Localização geográfica (lat/long), bioma
- FRP, dias sem chuva, risco de fogo

Clima - SISAM/INPE

- Dados meteorológicos e qualidade do ar
- Temperatura, umidade, precipitação
- Poluentes: PM2.5, CO, NO₂, O₃, SO₂

Fontes de Dados


Geográficos - IBGE

- Diretórios de UFs e municípios
- Hierarquias administrativas e regiões

Objetivo

- Consolidação de dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) relativos a focos de queimadas e clima
- Criação de um Data Warehouse com dados históricos (desde 2003 (alguém corrige essa data))
- Geração de visualizações baseadas em consultas analíticas para tomada estratégica de decisões


Visão geral da Arquitetura



Organização do Data Warehouse

Constelação de fatos corrigida

- Tabela bridge
- Dimensão Data unificada
- Dimensões do esquema Queimada possuem Chaves Estrangeiras para as mesmas dimensões no esquema Clima




Organização do Data Warehouse

Queimadas

Esquema estrela corrigido

- Dessa vez, fizemos o esquema estrela sem pensar na posterior unificação




Organização do Data Warehouse

Clima

Esquema estrela corrigido

- Dessa vez, fizemos o esquema estrela sem pensar na posterior unificação




Infraestrutura

Provisionamento com Terraform

Provisionamos com Terraform:


- Base de dados PostgreSQL
- Jobs Spark para ETL
- Superset para visualização dos dados



Infraestrutura

Google Cloud Platform

Tava de graça 🙏 (Deram 1800 reais de crédito pra gente)



Extração dos Dados

Foram utilizadas 4 fontes:

- Dataset de focos de queimadas do INPE -> extraído diretamente do BigQuery
- Dataset de dados climáticos do SISAM -> extraído diretamente do BigQuery
- Relação de municípios e seus códigos pelo IBGE -> CSV obtido de fontes públicas
- Relação de estados e as regiões às quais pertencem -> CSV obtido de fontes públicas

Transformação

Pré-processamento dos dados:

- Tratamento de valores faltantes
- Computação de atributos derivados (ex: estação do ano)
- Atribuição de tipos de dados corretos

Transformação

Criação de dimensões e tabelas de fatos:

- Dimensão Data gerada a partir de união e projeção das tabelas de Queimadas e Clima
- Dimensões Local geradas a partir da junção e projeção de cada tabela com as relações de Municípios e regiões
- Dimensão Horário preenchida proceduralmente com todos os valores de horas e minutos
- Chaves Estrangeiras das tabelas de fatos preenchidas através de junção com as tabelas de dimensões

Carregamento

Dados carregados em um RSGBD (PostgreSQL)

Índices criados para colunas de frequente acesso:

- Chaves estrangeiras nas tabelas de fatos e dimensões do esquema Queimadas
- Timestamp, Mes e ano para Data
- Hora para Horário
- UF e município para Local

Consultas analíticas e visualização


- Consultas implementadas em SQL
- Visualizações construídas com Apache Superset

Queimadas por Estado e Municipio

```
SELECT DISTINCT
    dim_local_queimada.nome_uf,
    dim_local_queimada.nome_municipio,
    count(*) OVER (PARTITION BY nome_municipio) as count_focus_municipio,
    count(*) OVER (PARTITION BY nome_uf) as count_focus_uf
FROM fct_queimada
    INNER JOIN dim_local_queimada ON fct_queimada.id_local = dim_local_queimada.id_local;
```

Queimadas por Estado e Município

Contagem de queimadas por estado e município




Risco de Fogo por Bioma e Estado

```
SELECT
    dd.ano,
    dlq.bioma,
    dlq.nome_uf,
    avg(fct_queimada.risco_fogo) as media_risco_fogo
FROM fct_queimada
    INNER JOIN dim_data dd on fct_queimada.id_data = dd.id_data
    INNER JOIN dim_local_queimada dlq on fct_queimada.id_local = dlq.id_local
WHERE fct_queimada.risco_fogo is not null
GROUP BY dd.ano, CUBE (dlq.nome_uf, dlq.bioma)
```

Risco de Fogo por Bioma e Estado



Risco de Fogo por Estado e Bioma



```


WITH joined_clima AS
    (SELECT
        dlc.nome_municipio,
        dhc.hora,
        avg(fct_clima.temperatura) as media_temperature,
        avg(pm25_ugm3) as media_pm25_ugm3
    FROM fct_clima
        INNER JOIN public.dim_local_clima dlc on dlc.id_local = fct_clima.id_local
        INNER JOIN public.dim_horario_clima dhc on dhc.id_horario = fct_clima.id_horario
    GROUP BY dlc.nome_municipio, dhc.hora
    ),
joined_queimada AS
    (SELECT
        dhq.hora,
        dlq.nome_municipio,
        Count(*) as count_focus
    from fct_queimada
        INNER JOIN public.dim_horario_queimada dhq on fct_queimada.id_horario = dhq.id_horario
        INNER JOIN public.dim_local_queimada dlq on dlq.id_local = fct_queimada.id_local
    GROUP BY dhq.hora, dlq.nome_municipio
    )
SELECT
    jc.hora,
    jc.nome_municipio,
    jq.count_focus,
    jc.media_pm25_ugm3,
    jc.media_temperature
FROM joined_clima jc
    INNER JOIN joined_queimada jq ON jc.hora = jq.hora AND jc.nome_municipio = jq.nome_municipio;

```


Focos de Incêndio relacionados à poluição e temperatura, por hora do dia

Análise da contagem de focos e poluição agregada por município e hora

Contagem de focos de queimada por PM2.5 e colorido por hora




Contagem de focos por Temperatura e colorido por hora




```
WITH joined_clima AS
(
    SELECT
        dlc.regiao_uf,
        dd.trimestre,
        avg(fct_clima.umidade_relativa) media_umidade_relativa
    FROM fct_clima
    INNER JOIN public.dim_local_clima dlc on dlc.id_local = fct_clima.id_local
    INNER JOIN public.dim_data dd on fct_clima.id_data = dd.id_data
    GROUP BY dlc.regiao_uf, dd.trimestre
),
joined_queimada AS
(
    SELECT
        d.trimestre,
        dlq.regiao_uf,
        avg(fct_queimada.potencia_radiativa_fogo) as media_potencia_radiativa_fogo
    from fct_queimada
    INNER JOIN public.dim_data d on d.id_data = fct_queimada.id_data
    INNER JOIN public.dim_local_queimada dlq on dlq.id_local = fct_queimada.id_local
    GROUP BY d.trimestre, dlq.regiao_uf
)
SELECT
    jc.regiao_uf,
    jc.trimestre,
    jq.media_potencia_radiativa_fogo,
    jc.media_umidade_relativa
FROM joined_clima jc
    INNER JOIN joined_queimada jq ON jc.regiao_uf = jq.regiao_uf AND jc.trimestre = jq.trimestre
```


Potência Radiativa média por Umidade média para os Estados, com Região indicada



Potência Radiativa média e Umidade média por Trimestre e Região




Potência Radiativa por Mês e Estado

```
SELECT
    dl.nome_uf,
    dd.mes,
    avg(fct_queimada.potencia_radiativa_fogo) as media_potencia
FROM fct_queimada
    INNER JOIN public.dim_local_queimada dl ON fct_queimada.id_local = dl.id_local
    INNER JOIN public.dim_data dd ON fct_queimada.id_data = dd.id_data
WHERE fct_queimada.potencia_radiativa_fogo is not null
GROUP BY (dl.nome_uf, dd.mes);
```


Potência Radiativa por Mês com filtro para Estado

Análise da Potência Radiativa por Mês e Estado

Potência Radiativa por Mês, com seleção de Estado




Potência Radiativa por Estado com filtro para Mês



Precipitação por Estado no Mês de Setembro

```
SELECT
    dd.mes,
    dlc.nome_uf,
    avg(fct_clima.precipitacao_dia) as media_precipitacao
FROM fct_clima
    INNER JOIN public.dim_data dd on dd.id_data = fct_clima.id_data
    INNER JOIN public.dim_local_clima dlc on dlc.id_local = fct_clima.id_local
WHERE dd.mes = 9
GROUP BY (dd.mes, dlc.nome_uf)
ORDER BY media_precipitacao DESC;
```

Precipitação por Estado no Mês de Setembro




Qualidade do ar na região Norte na época de secas

```
SELECT
    dd.dia_ano,
    dlc.nome_municipio,
    avg(fct_clima.co_ppb) as media_co_ppb,
    avg(fct_clima.pm25_ugm3) as media_pm25_ugm3,
    avg(fct_clima.o3_ppb) as media_o3_ppb
FROM fct_clima
    JOIN public.dim_data dd on dd.id_data = fct_clima.id_data
    JOIN public.dim_local_clima dlc on fct_clima.id_local = dlc.id_local
WHERE dd.mes > 6 AND dd.mes < 10 AND regioao_uf = 'Norte'
GROUP BY dd.dia_ano, dlc.nome_municipio;
```


Qualidade do ar na região Norte na época de secas

Qualidade do ar da Região Norte na Época da Seca

Qualidade do ar na região Norte, na Época da Seca (Julho a Setembro)



RollUp Precipitação média por Ano, Região, mês e Estado

```
SELECT
    dd.ano,
    dd.mes,
    dl.nome_uf,
    dl.regiao_uf,
    avg(fct_clima.precipitacao_dia) as media_precipitacao

FROM fct_clima
    INNER JOIN dim_data dd on dd.id_data = fct_clima.id_data
    INNER JOIN dim_local_clima dl on dl.id_local = fct_clima.id_local
GROUP BY ROLLUP
    ((dd.ano, dl.regiao_uf),(dl.nome_uf, dd.mes))
```

Conclusões

- Correlações identificadas entre dados de queimadas e clima (Ex: FRP x Umidade)
- Identificação de biomas e estado em maior risco de focos de incêndios, além de estados e cidades com maior incidência
- Análise de comportamentos específicos para cada estado quanto a intensidade de queimadas

Referências

- Google Cloud Platform
- Terraform

Código Fonte

Github



Perguntas?

UwU