2,4 D + PICLORAM

Marcas comerciales: TORDON D 30.

Nomenclatura Química:
2,4 D: sal tri-isopropanolamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético
picloram: sal triisopropanolamina del ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido aril oxi alcanoico + ácido piridincarboxílico.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alpiste Avena común Cebada Centeno Trigo	Abrepuños (*Centaurea spp.)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Biznaga (*Ammi visnaga)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Hinojo (*Foeniculum vulgare)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Revienta caballo o Tutía (*Solanum spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus)* Yuyo de San Vicente (*Artemisia verlotorum)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*	0,3 a 0,5 l/ha	20	Durante pleno macollaje, hasta aparición del primer nudo de encañazón. En tiempo húmedo y nuboso prolongado utilizar las dosis mínimas. En presencia de malezas crucíferas (bolsa de pastor, mostacilla, nabo, nabón) se recomienda mezclar con 2,4 D (EB 797 g equivalente ácido/litro) 120 cm3/ha o con 170 cm3/ha de 2,4-D sal amina (683 - 700 g equivalente ácido/litro) o + 500 cm3/ha de MCPA (250 g equivalente ácido/litro) El tiempo de carencia indicado de 20 días es para la cosecha de grano. Utilizados como forraje el tiempo de carencia es de 7 días.
Caña de azúcar	Abrojo chico (*Xanthium spinosum)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Biznaga (*Ammi visnaga)*	1,0 a 2,0 l/ha	7	Aplicación dirigida: desde 1a hoja hasta inicios de macollaje y en el período de encañazón. Aplicación en cobertura total: durante macollaje. Aplicaciones terrestres: usar 250-400 l/ha de agua + humectante 0,05 % (50 cm3/100 litros de agua). Aplicaciones aéreas: usar 35-40 l/ha de agua + humectante 0,2-0,4 % (200-400 cm3/100 litros de agua).

	Cardo (*Carduus acanthoides)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Hinojo (*Foeniculum vulgare)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Revienta caballo o Tutía (*Solanum spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo de San Vicente (*Artemisia verlotorum)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*			En mezclas con ametrina, efectuar únicamente aplicaciones dirigidas.
Herbáceas en pastizales naturales subtropicales y pasturas megatérmicas	Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*	Cobertura total: 2,0 - 3,0 litros/ha Mochila: (1-1,5 %) 1,0 - 1,5 litros en 100 litros de agua		Cardo de Castilla: a partir del otoño, cuando se haya generalizado el desarrollo foliar y durante el invierno. Yuyo sapo: a fin de primavera y verano, cuando la planta esté creciendo activamente con buena humedad en el suelo. Salvo indicaciones, pulverizar siempre cuando la maleza se encuentre en activo crecimiento.
Maíz	Abrepuños (*Centaurea spp.)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Biznaga (*Ammi visnaga)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla	0,4 a 0,5 l/ha	(*)	Cobertura total, de 2 a 8 hojas. Aplicación dirigida con más de 8 hojas. En presencia de malezas crucíferas (bolsa de pastor, mostacilla, nabo, nabón) se recomienda mezclar con 2,4 D(EB 797 g equivalente ácido./litro) 120 cm3/ha o con 170 cm3/ha de 2,4-D sal amina (683 - 700 g equivalente ácido/litro) o + 500 cm3/ha de MCPA (250 g equivalente ácido/litro). (*) Tiempo de carencia para grano: 20, para forraje: 7.

	(*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Hinojo (*Foeniculum vulgare)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Revienta caballo o Tutía (*Solanum spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo de San Vicente (*Artemisia verlotorum)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*			
Renovales en pasturas implantadas y pastizales naturales	No Corresponde (*No corresponde)*	Mochila: 3% (3,0 litros en 100 litros de agua).		Follaje: Durante los meses de verano, cuando las plantas se encuentren en activo crecimiento. Pulverizar el follaje desde lados opuestos para obtener una cobertura total de hojas y ramas.
Sorgo	Abrepuños (*Centaurea spp.)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Biznaga (*Ammi visnaga)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cardo asnal (*Silybum marianum)* Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus)* Cardo pampa (*Onopordon acanthium)* Cardo pendiente (*Carduus nutans)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Hinojo (*Foeniculum vulgare)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Morenita (*Kochia scoparia)* Ortiga mansa	0,4 a 0,5 l/ha	(*)	Cobertura total, de 4 a 8 hojas. Aplicación dirigida con más de 8 hojas. En presencia de malezas crucíferas (bolsa de pastor, mostacilla, nabo, nabón) se recomienda mezclar con 2,4 D(EB 797 g equivalente ácido/litro) 120 cm3/ha, o con 170 cm3/ha de 2,4-D sal amina (683 - 700 g equivalente ácido/litro) o + 500 cm3/ha de MCPA (250 g equivalente ácido/litro). (*) Tiempo de carencia para grano: 20, para forraje: 7.

	(*Lamium amplexicaule)* Quínoa (*Chenopodium quinoa)* Revienta caballo o Tutía (*Solanum spp.)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)* Yuyo de San Vicente (*Artemisia verlotorum)* Yuyo sapo (*Wedelia glauca)*			

Información General:

Herbicida de penetración foliar y radicular, sistémico, se traslada por floema y xilema, actúa sobre zonas de crecimiento. Formulación sal tri-isopropanolamina. Soluble en agua, forma solución estable.

Equipos y volumen de aplicación: en aplicaciones terrestres utilizar 60 - 80 l/ha de agua y con equipos aéreos más de 12 l/ha. En caña de azúcar, con equipo terrestre de barra, 250 - 400 l/ha, y con equipo de manguera y lanza cubrir uniformemente todo el follaje y ramas de la superficie a tratar.
Aplicar 20-30 gotas/cm2

No mezclar con gasoil o kerosene.

Restricciones de uso: dejar transcurrir:
a) entre aplicación y cosecha: trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, maíz y sorgo: 20 días.
b) entre aplicación y pastoreo: trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, maíz y sorgo: 7 días; campos naturales y praderas de gramíneas 7 días.
Sin restricciones: caña de azúcar, áreas forestales y parques.
En aplicaciones a cultivos de cereales deben transcurrir aproximadamente 80 días, para sembrar en rotación cultivos susceptibles, tales como girasol, hortalizas, legumbres, papa y soja.

Ver restricción de uso y medida de mitigación para 2,4D y picloram.

NOTA:
Según la resolución 466/19 y su rectificativa 875/19, ambas de SENASA, a partir del mes de mayo de 2021 se prohíbe la comercialización y uso de los productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D.
A partir de esa fecha, se producirá la baja automática de dichos productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos dependiente de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC) + 4 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado.
Botas de goma.
Camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas.
Delantal
Antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del principio activo picloram:
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50: 4012 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: > 2000 mg/kg

Del principio activo 2,4-D:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 699 mg/kg

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 2598 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL50: 2000 mg/kg

En caso de ingestión: no inducir el vómito. Llamar a un médico. Antídoto: no posee antídoto específico.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Evitar contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
TORDON D 30	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	30735	SL	24% + 6,41%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.