ACETAMIPRID

Marcas comerciales: ASSAIL - CLARTEX XTRA - MOSPILAN.

Nomenclatura Química:
acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: neonicotinoide.
Acción: sistémica.

Uso: insecticida (foliar 20% SP, 70% WP).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*	100 - 125 g/ha	14	Aplicar el producto al observar los primeros pulgones. Repetir el tratamiento según recomendación de un Ingeniero Agrónomo.
Duraznero	Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*	25 g/hl 250 g/ha (*)	7	Aparición de la hembra fundatriz o aparición de las primeras colonias. (*) Concentración mínima.
Manzano	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	PC 20%: 12,5 g/hl PC 70%: 3,5 a 5 g/hl	PC 20%: 7 PC 70%: 1	PC 20%: Realizar los tratamientos de acuerdo al Servicio de Alarma, o desde la caída de pétalos, cada 12 días. Aplicar con bajas poblaciones de la plaga hasta 3 veces por temporada en un plan de rotación de productos. Se recomienda aplicar en las primeras generaciones. PC 70%: Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	Chicharrita o Cotorrita (*Edwardsiana crataegi)*	PC 20%: 12,5 g/hl PC 70%: 3,5 g/hl		Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su ingeniero agrónomo.
Peral	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	PC 20%: 12,5 g/hl PC 70%: 3,5 a 5 g/hl	PC 20%: 20 PC 70%: 1	Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien en base a los planes de cura previamente establecidos, con un intervalo de 14 días. Utilizar la dosis alta cuando la presión de la plaga sea alta.
	Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)*	PC 20%: 12,5 g/hl PC 70%: 3,5 g/hl		Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.
Pimiento Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca (*Trialeurodes spp.)* Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*	50 - 100 g/hl	1	Aplicar cuando se observen los primeros ataques de la plaga.
Poroto	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)*	100 - 125 g/ha	14	Aplicar el producto en forma preventiva, a partir del estado fenológico vegetativo del cultivo conocido como V3, es decir cuando se produce la emisión y completa elongación de la primera hoja trifoliolada. Se recomienda cubrir el período comprendido entre la emergencia del cultivo y primera hoja trifoliada, con el uso de insecticidas eficaces, los cuales pueden aplicarse tanto a la semilla (tratamiento de semilla), al suelo o directamente al follaje.

(*) Se recomienda agregar un coadyuvante no iónico a razón de 150 cm3/hl.

Información General:

El acetamiprid presenta una acción rápida y de efecto residual prolongado; tiene alta acción sistémica y translaminar (sistémica dentro de las hojas) y es absorbido muy bien por el follaje (aplicación foliar) y por las raíces (en tratamiento de semilla).
Actúa sobre los organismos nocivos por ingestión y por contacto. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, como un análogo de la acetilcolina (Ach), que es un transmisor químico natural de los impulsos. Ataca una proteína receptora de la acetilcolina (Ach) en la membrana de post-sinapsis.
Es ideal para ser utilizado cuando existen problemas de resistencia a otras familias químicas o en "Programas de Manejo Integrado de Plagas".

Compatibilidad: es compatible con todos los insecticidas y fungicidas de uso corriente en los cultivos recomendados, salvo aquellos que posean metales pesados en su composición o productos químicos alcalinos fuertes como el caldo bordelés. De todas formas se recomienda una prueba de compatibilidad previa y la consulta con un Ingeniero Agrónomo.

Métodos de aplicación:
Poroto y manzano: aplicar con equipos terrestres como mochilas manuales o a motor, o aéreos procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de cubrir hojas, frutos y ramas, y respetando los siguientes parámetros.
Cobertura: PC 20% 30 - 40 gotas/cm2; PC 70% 50 - 70 gotas/cm2.
Tamaño de gota: 200 - 400 micrones.
Uniformidad: 10 - 20% coeficiente de variación.
Algodón: aplicar con equipos terrestres o aéreos en el follaje en forma homogénea.
Llenar el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de agua. Agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase). Completar el faltante del tanque de con agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación.

Tiempo de reingreso al área tratada 24hs, para aplicaciones de 20% y 70%.

Para aplicaciones de 70%, para garantizar los Límites Máximos de Residuos (LMR) de 0.7 ppm, se recomienda realizar solo una aplicación en el último día previo a la cosecha.

Uso: curasemillas (ST).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Hormigas cortadoras (*Atta spp.)* Hormigas podadoras (*Acromyrmex spp.)*	200 - 300 g/qq		Tratamiento a las semillas. El producto no produce mortandad en la plaga, sino solamente efecto de repelencia o no preferencia al corte de las plantas desarrolladas a partir de semillas tratadas. El efecto del producto se circunscribe a las primeras etapas el desarrollo del cultivo; cotiledones (VE) y primer par de hojas (V1).
Maíz	Gusano blanco (*Diloboderus abderus)*	75 - 100 g/qq		
Soja	Picudo de la soja (*Promecops carinicollis)*	50 g/qq		

Información General:

El acetamiprid es un insecticida de la familia de las nitroguanidinas (neonicotinoide) que cuando es administrado como tratamiento a la semilla de algunos cultivos es capaz de generar un efecto de repelencia o no preferencia al consumo por ciertas especies de insectos, tanto de la semilla como de las plántulas originadas a partir de ella.

Instrucciones de uso: pesar la cantidad de producto necesaria y agregar agua pura hasta un volumen de caldo final entre 1,5 a 2,0 litros/100 kg de semilla. Agitar permanentemente el caldo de aplicación, para mantener el producto en suspensión.

Equipo y volumen de aplicación: el producto debe ser aplicado a la semilla en forma de "slurry", es decir como tratamiento en húmedo (en mezcla con agua). Para ello puede utilizarse tambores rotativos de eje excéntrico, mezcladoras tipo hormigonera, elemento mezcladores a base de sinfines, o bien cualquier equipo de tratamiento continuo. Se recomienda no aplicar el producto directamente a semillas ubicadas dentro de la sembradora.

Recomendaciones de uso: el producto no afecta la germinación, ni el vigor de semillas, pero igualmente se recomienda tratar una muestra de semillas y efectuar los análisis correspondientes, antes de proceder a tratar la totalidad del lote.
NO aplicar el producto a semillas con valores de germinación y vigor por debajo de los estándares establecidos por las empresas de semilla. El producto es compatible con la mayoría de los productos utilizados en tratamiento de semilla, principalmente fungicidas ditiocarbamatos y benzimidazoles. En caso de utilizar algún producto específico con características químicas diferentes a los mencionados anteriormente, se recomienda testear previamente la compatibilidad de la mezcla en pequeña escala (muestra), sobre todo en los aspectos referidos a la selectividad sobre la semilla (poder germinativo y vigor). La semilla tratada debe ser destinada exclusivamente para siembra; nunca utilizar la misma para la alimentación húmeda y/o animal, ni tampoco destinada a la industria.

Restricciones de uso: tiempo de reingreso al área tratada: no corresponde, uso posicionado.
Período de carencia: no corresponde, uso posicionado.

Compatibilidad: se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

Tratamiento de remanentes y envases vacíos: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El agua del lavado de los equipos debe aplicarse en zonas que no afecten la biodiversidad como en los cultivos ya tratados, cercos, caminos, áreas no cultivadas ni pastoreadas) ni en cursos de agua, para proteger la salud humana.
Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

Almacenamiento: mantener el producto alejado del calor y las llamas. Conservar el envase bien cerrado y etiquetado en un lugar seco, fresco y ventilado.

Derrames: en caso de derrames, cubra el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín). Barrer y recoger con una pala el material impregnado. Para neutralizar el producto utilice una solución al 5% de soda cáustica o al 20% de bicarbonato de sodio.

Precauciones: mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.
NO transportar ni almacenar con alimentos. Destruya los envases vacíos.

Método de destrucción de envases vacíos: para eliminar los envases se debe verificar que estén vacíos. Los envases vacíos nunca deben ser reutilizados y enviarlos a centros de acopio para su disposición final.

Uso: crustacicida (cebo granulado al 1,6%).

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo, colza	Bicho bolita *(Armadillidium vulgare)*	3-5 kg/ha (*)	Previo a la siembra o al momento de realizar la misma

(*) Se recomienda el uso de las dosis mayores en caso de altas poblaciones de "bicho bolita", condiciones del lote y/o ambientales predisponentes, o toda otra situación que haga más agresiva la presencia de la plaga sobre el cultivo.
Para obtener los mejores resultados con Clartex Xtra se recomienda efectuar el monitoreo de los lotes previo a la siembra para determinar la dosis correcta de producto y así lograr un adecuado control de Bichos Bolita (Armadillidium vulgare) y mantener el nivel de los mismos por debajo del umbral de daño económico.

Información General:

CLARTEX Xtra es un cebo granulado de última generación especialmente formulado en base a Acetamiprid, que actúa por ingestión, para el control de BICHO BOLITA (Armadillidium vulgare) en cultivos de soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo y colza, especialmente recomendado para situaciones de cultivos realizados bajo la modalidad de SIEMBRA DIRECTA.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Modo de aplicación: Se recomienda realizar la aplicación al voleo con esparcidoras centrífugas especialmente diseñadas para este uso, que permitan distribuir la dosis recomendada en forma pareja y uniforme en todo el lote. El momento de aplicación y la dosis a utilizar dependerán de los datos recolectados durante el monitoreo. Los mejores resultados se han obtenido con la aplicación previa a la siembra o al momento de realizar la misma, para lograr de esta forma un excelente control de la plaga antes de la germinación, lo que es considerado un punto crítico para el correcto establecimiento del cultivo y la obtención de la densidad adecuada de plantas en el lote.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Dar aviso al personal técnico de la empresa para determinar su destino. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa. Retirar los envases dañados.
Los derrames de productos líquidos se deben contener y adsorber empleando tierra, arena o aserrín. El material adsorbido deberá barrerse y colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4A (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del Equipo: usar protección respiratoria y ocular, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.

Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: > 217 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 3,0 mg/l

Del producto formulado al 20%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1.065 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 3,5 mg/l

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

No contaminar cursos de agua naturales y/o artificiales. Evitar la deriva durante las aplicaciones

En casos de intoxicación este producto causa apatía, pérdida de tono muscular, problemas respiratorios y sólo en casos severos puede causar temblores y fuertes calambres.
Acetamiprid no tiene antídoto por lo que todo el tratamiento debe ser sintomático.

Del producto formulado al 70%:
Toxicidad oral aguda (rata hembra): DL50: 182 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata macho): DL50: 240-280 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 2,5 mg/kg

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos: Prácticamente no tóxico

Del producto formulado al 1,6 %:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: >5.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: >0,51mg/l

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

Peligroso si se ingiere o inhala, debiendo evitarse el contacto del producto con la piel y la contaminación de alimentos. Durante su aplicación usar caretas, antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavarse con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Lavar los utensilios y la indumentaria no deberá usarse sin previo lavado.
En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua o solución fisiológica por espacio de 10 a 15 minutos. Mantener los párpados separados durante el procedimiento y consultar inmediatamente a un oftalmólogo.
En caso de ingestión se aconseja consultar inmediatamente a un médico, el cual decidirá si es conveniente proceder a rescatar el material desde el estómago mediante inducción del vómito (o efectuando una aspiración o lavado gástrico), teniendo en cuenta la cantidad ingerida, el tiempo transcurrido desde el accidente y las condiciones clínicas del accidentado.
La administración de una suspensión de carbón activado y un purgante salino pueden favorecer la eliminación del producto y limitar su absorción desde el tracto digestivo.
NO administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ASSAIL	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	35990	WP	70%	II
CLARTEX XTRA	RIZOBACTER ARGENTINA S.A.	40451	GB	1,6%	IV
MOSPILAN	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	33353	SP	20%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.