ACIFLUORFEN

Nomenclatura Química:
acifluorfen: 5-2-cloro-4-(trifluorometil) fenoxinitrobenzoato de sodio.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: difenil éter.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Saetilla (*Bidens pilosa)* Zapallito amargo (*Cucurbita andreana)*	1,0 l/ha	50	Cuando la altura de la maleza sea menor o igual a 5 cm.
	Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Bejucos (*Ipomoea spp.)* Chamico (*Datura ferox)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Espina colorada (*Solanum sisymbrifolium)* Estramonio (*Datura stramonium)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	1,0 - 1,5 l/ha		De acuerdo a la altura de la maleza (variando la dosis de acuerdo a esta): cuando la altura de la maleza sea de hasta 5 cm la dosis a aplicar será de 1 l/ha, cuando sea de hasta 10 cm la dosis a aplicar será de 1,0 - 1,25 l/ha, cuando sea de hasta 15 cm la dosis a aplicar será de 1,25 - 1,50 l/ha. Para el control de bejucos aplicar antes que comiencen a emitir las guías.

Información General:

Herbicida selectivo post-emergente que actúa por contacto para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de soja. El producto actúa mejor cuando las malezas están en activo crecimiento no aconsejando pulverizar bajo condiciones de sequía; no aplicar si en los últimos 8 a 10 días anteriores al tratamiento no se produjeron lluvias, obteniéndose los mejores resultados con humedad relativa alta. No pulverizar cuando hay amenazas de lluvia. No deberá llover durante las 4 horas posteriores a la aplicación.

Compatibilidad: puede mezclarse con insecticidas como clorpirifós, carbaril y piretroides.

Aplicar con equipos provistos de pico tipo herbicida que arrojen un caudal entre 200 a 300 l/ha, con una presión de 100 - 150 lb/pulg2.
Agregar en todos los casos un coadyuvante a razón del 0,25%.

Por la forma de actuar es necesario mojar bien las hojas y tallos de las malezas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Del principio activo:	Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: 1.300 mg/kg.	DL 50 oral aguda en rata: 3.300 mg/kg
DL 50 dermal aguda en conejo: 3.540 mg/kg.	DL 50 dermal aguda en conejo: 5.000 mg/kg

Riesgos ambientales: no tóxico para abejas. No tóxico para peces ni fauna silvestre.
Es inocuo para el ganado.

Aplicar tratamiento sintomático.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.