Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

ALACLOR

Nomenclatura Química:
2-cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N-(metoximetil)acetamida ó 2-cloro-2,6-dietil-N-metoximetil acetanilida.
Clasificación Química: cloroacetamida.
Acción: residual.

Uso: herbicida (preemergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Algodón	Cadillo (*Cenchrus echinatus)* Camalote (*Panicum elephantipes)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quinoa (*Chenopodium quinoa)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	3 a 4 l/ha		Pre emergencia: Aplicación invernal, combinado con atrazina 50%.
Caña de azúcar Tabaco		2 a 3 l/ha		Después del último aporque.
Girasol Maíz Soja		2,5 a 6 l/ha (*)		Pre emergencia: (*) La dosis varía según el tipo de suelo y contenido de materia orgánica. Pampa Húmeda; Liviano con menos de 3% M.O.: 3 l/ha. Liviano con más de 3% M.O.: 4 l/ha. Mediano con menos de 3% M.O.: 4 l/ha. Mediano con más de 3% M.O.: 5 l/ha. Pesado con menos de 3% M.O.: 5 l/ha. Pesado con más de 3% M.O.: 6 l/ha. Noroeste; Liviano con menos de 3% M.O.: 2,5 l/ha. Liviano con más de 3% M.O.: 3 l/ha. Mediano con menos de 3% M.O.: 3 l/ha. Mediano con más de 3% M.O.: 3,5 l/ha. Pesado con menos de 3% M.O.: 3,5 l/ha. Pesado con más de 3% M.O.: 4 l/ha.
Poroto		1,5 a 3 l/ha (*)		Solo para poroto blanco, tipo alubia pre emergencia: (*) La dosis varía según el tipo de suelo y contenido de materia orgánica. Liviano con menos de 3% M.O.: 1,5 l/ha. Liviano con más de 3% M.O.: 2 l/ha. Mediano con menos de 3% M.O.: 2 l/ha. Mediano con más de 3% M.O.: 2,5 l/ha. Pesado con menos de 3% M.O.: 2,5 l/ha. Pesado con más de 3% M.O.: 3 l/ha.

Información General:

Herbicida pre emergente, residual, para el control de la mayoría de las gramíneas anuales y de algunas latifoliadas. Los cultivos tolerantes son: maíz (todos), soja, sorgo granífero, poroto blanco, maní, algodón, girasol y otras especies hortícolas y ornamentales.
I) (*) Aplicación: pre emergencia, presiembra incorporado.
Realizar la última labor de preparación del lote lo más cerca posible de la siembra, de modo de que no haya malezas germinando en el momento de la aplicación ya que no serán controladas. Si transcurren varios días entre la última labor cultural y la siembra se recomienda pasar una rastra de dientes liviana para eliminar las malezas en proceso de germinación. Se necesita lluvia dentro de los diez días de aplicado el herbicida para lograr su incorporación a la solución del suelo y su posterior actividad.

II) Restricciones de uso: desde el momento de la aplicación hasta la siembra de cultivos no indicados en el marbete, deberán transcurrir tres meses. Se puede volver a aplicar el producto si se siembra maíz, soja, girasol, poroto blanco (tipo alubia) o maní. Si se siembra algodón, no aplicar el producto por segunda vez.
III) Precauciones:
Inflamabilidad: combustible, NO almacenar cerca del fuego.
Posibles incompatibilidades: compatible con agua de 1000 ppm de dureza, o menos. Generalmente compatibles con los fertilizantes fluídos.
Corrosividad: no corrosivo para el acero inoxidable N°316 y 304, aluminio y heresita. Corrosivo para el acero y el hierro negro.
Limpieza de equipos: detergente diluído en agua.
Precauciones: evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. NO respirar vapores. Lavarse cuidadosamente después del manipuleo. La ropa contaminada debe lavarse antes de volver a usarse.

IV) Comportamiento fisiológico:
Absorción: es absorbido por las plántulas durante la germinación, principalmente a través del coleóptilo e hipocótilo (gramíneas y latifoliadas, respectivamente). La absorción radicular es la vía de absorción secundaria.
Sistemia: a través de toda la planta, concentrándose en las partes vegetativas más que en las reproductivas.
Mecanismo de acción: parece inhibir la síntesis de proteínas en las plantas susceptibles.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Comportamiento en el suelo:
Adsorción y Lixiviación: es adsorbido por la fracción coloidal del suelo.
Degradación microbiana: es la forma principal de degradación.
Pérdidas por fotodescomposición ó evaporación: bajas.
Persistencia en el suelo de 6 a 10 semanas, dependiendo del tipo de suelo y de las condiciones climáticas.
V) Características:
Fórmula molecular: C14 H20 Cl NO2
Peso molecular: 269.8
Estado físico, color y olor: sólido a temperatura ambiente, color crema, inodoro.
Peso específico: 1.133 a 25/15.6°C
Punto de fusión: 39.5 a 41.5°C
Punto de ebullición: 100°C A 0.02 mm Hg, 135°C a 0.3 mm Hg.
Temperatura de descomposición: 105°C
Resistencia relativa a la descomposición por radiación ultravioleta: buena.
Presión de vapor: 2.2 X 10(-5) mm Hg a 25°C, 0.02 mm Hg a 100°C.
Solubilidad: 242 ppm a 25°C en agua. Soluble en éter, acetona, benceno cloroformo, etanol, etilacetato, ligeramente soluble en heptano.
Otra nomenclatura química: 2-cloro-2,6-dietil-N-(metoximetil) acetanilida.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): K3(HRAC) ó 15(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.

Información Toxicológica:

Toxicidad aguda:
DL 50 oral, en ratas:
Principio activo: 930 mg/kg. Lazo CE: 1000 mg/kg. Lazo MT: >5000 mg/kg
No tóxico para abejas.

DL 50 Dermal, en conejos:
Principio activo: 13300 mg/kg, ligeramente irritante.
Lazo CE: 8000 mg/kg, moderadamente irritante.
Lazo MT: > 5000 mg/kg, prácticamente no irritante.
Irritación ocular en conejos:
Principio activo: no irritante.
Lazo CE: severamente irritante.
Lazo MT: prácticamente no irritante.

Posible daño por inhalación, CL 50 en ratas, 4 horas de inhalación.
Principio activo: > 5,1 mg/l, sin mortalidad.

Toxicidad en peces y vida silvestre (técnico):

Vida silvestre, dieta de 8 días.
CL 50 en pichones de pato silvestre de 10 - 15 días: > 5000 ppm.
CL 50 en pichones de codorniz de 10 - 15 días: > 5000 ppm.

Organismos acuáticos:
CL 50 (96 horas) en trucha Arco Iris.
Técnico: > 1,8 mg/l.
Lazo CE: 4,2 mg/l.
CE 50 (48 horas) en Daphnia magna.
Técnico: 10 mg/l.
Lazo CE: 35 mg/l.
CE 50 (48 horas) en langostino.
Técnico: > 320 mg/l.
DL 50 (48 horas) en abejas.
Lazo EC: 32 mg/l.

Riesgos ambientales: prácticamente no tóxico para abejas. Ligeramente tóxico para aves. Moderadamente tóxico para organismos acuáticos y peces.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.