AMINOACIDOS

Nomenclatura Química:
Aminoácidos.
Clasificación Química: orgánico.
Acción: estimulante.

Uso: bioestimulante y fertilizante (bioestimulante natural, aplicación radicular).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Ajo Berenjena Calabaza Cebolla Hortalizas de hoja Melón Pimiento Puerro Sandía Tomate	15 - 20 l/ha	Luego de plantación y/o trasplante.
Alcaucil	19 - 20 l/ha	20 días post trasplante. 40 días después de la primera aplicación. 40 días después de la segunda aplicación.
Apio	20 l/ha	Luego de plantación y/o trasplante.
Campos de Golf Césped Parques	5 l/ha	Tratamiento de mantenimiento. Riego aspersión, repetir cada 15 días. Zonas de mayor desgaste. Riego aspersión, repetir semanalmente.
Campos deportivos		Campos deportivos de intenso pisoteo (fútbol, rugby, etc). -Riego por aspersión. Repetir cada 15 días.
Frutilla	10 - 15 l/ha	Trasplante. - Con 4 a 5 hojas. - Primeras flores abiertas (fa). - 15 días después de floración. - 30 días después de floración.
Uva de mesa	15 - 20 l/ha	Al momento de la plantación. Junto con la fertilización de post cosecha. A yema hinchada.
Viñedos		-Al momento de la plantación. -Junto con la fertilización de post cosecha.

Información General:

Es un fertilizante natural orgánico con nitrógeno a base de L-alfa- aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática (lo que garantiza una alta concentración de aminoácidos).
Actúa fomentando el trabajo fotosintético del cultivo, especialmente cuando éste queda resentido por condiciones adversas (elevadas y bajas temperaturas, fitotoxicidad, sequía, frío, salinidad, viento, asfixia radicular, etc. y en tratamientos recuperadores después de períodos críticos (daños por viento, helada, granizo, etc.). También se utiliza en soluciones nutritivas como estimulante de la mayor asimilación de nutrientes por parte de la planta.

Se aplica en todo tipo de cultivos a través de agua de riego (localizado, aspersión, inundación).
El agua de riego no debe superar nunca los 2 ds/m o los 2 g de sal/litro.

Compatibilidad:
- Puede ser mezclado con los fertilizantes habituales, previa difusión en agua.

Aplicación:
Se aplica en todos los momentos en que el cultivo necesita un estímulo nutritivo y fisiológico, tales como:
- trasplante.
- inicio del ciclo vegetativo.
- prefloración y caída de pétalos.
- desarrollo de los órganos vegetales a recolectar.

En riego por inundación se recomienda aumentar la dosis.

Uso: bioestimulante (bioestimulante natural, aplicación foliar).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Acelga	2 a 3 l/ha	Desde el estado de 2 hojas verdaderas tratar con intervalos de 15 a 20 días, con

Ajo Cebolla Espinaca Puerro		un mínimo de 3 aplicaciones.
Ají Pimiento Tomate		Con 4 a 5 hojas. Apertura de flores de cada racimo floral.
Apio Coliflor Repollo		Trasplante. -20 días después del trasplante. -40 días después del trasplante. (en ciclos otoño/invierno)
Arveja o alverja Haba Lenteja Poroto		3 a 4 hojas verdaderas. Primeras flores. Vainas de 6 a 8 mm.
Espárrago		Apertura del meristema apical. 15 a 20 días después. 30 a 40 días después de la primera aplicación.
Frutilla		Trasplante. Con 4 a 5 hojas. Primeras flores abiertas (fa). 15 días después de fa. 30 días después de fa.
Melón Pepino Sandía Zapallo		Con 4 a 5 hojas. Primera flor abierta. Al cuajado de frutos. Desarrollo de frutos.
Papa		Tratar a partir del estado de brotes de 15 cm, con 3 aplicaciones a intervalos de 15 a 20 días.

Información General:

Modo de empleo:
Aplicación foliar, durante los períodos en que las plantas precisen mayor vigor, tales como:
a) inicio de la vegetación (en cuanto alcance suficiente masa foliar).
b) prefloración y caída de pétalos.
c) desarrollo de los órganos vegetales a recolectar.

Compatibilidad:
Este producto puede mezclarse con los productos hormonales, correctores en carencias, abonos y agroquímicos de uso habitual. En aplicaciones con compuestos cúpricos, azufres o aceites, se recomienda no sobrepasar la dosis de 150 cm3/100 l de agua.

Importante:
Este producto es un complemento y no un sustituto de la fertilización de fondo (aplicada en el suelo). Para lograr un buen mojado este producto debe aplicarse con un tensioactivo no iónico, no polar al 0.1 - 1.5.

Almacenamiento:
Almacenar en lugar aireado, seco y fresco al resguardo de la luz solar.

Derrames:
Contener el derrame de producto. Prevenir que los derrames ingresen en desagües, cursos de agua, piletas, etc. Evitar la generación de polvo.

Recoger y colocar el material en recipientes adecuados para su reciclado, reutilización o desecho.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Ante cualquier accidente químico consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.