BENOMIL

Nomenclatura Química:
benomil: metil 1-butilcarbamoil-2-bencimidazol-carbamato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: bencimidazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Ajo	Podredumbre del ajo (*Penicillium corymbiferum)*	200 g/hl		Una vez desgranado el ajo y preparada la "semilla" para iniciar la plantación, sumergir durante un período mínimo de media hora. Dejar orear antes de plantar.
Arroz	Bruzzone parasitario (*Magnaporthe grisea)*	1,0 - 2,0 kg/ha	21	Aplicar al embuchamiento y repetir a la espigazón. En ataques severos usar la dosis mayor.
Bulbos	Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*	200 - 400 g/hl		Sumergir los bulbos después de cosechados, y luego orearlos.
Cítricos o citrus	Antracnosis de los citrus (*Colletotrichum gloeosporioides)*	2,0 kg/ha	15	Iniciar las aplicaciones cuando se note en los primeros brotes florales el primer síntoma blanco de los pétalos. Repetir cada 15 días.
	Podredumbres de los frutos (*Diplodia spp.)* Podredumbres de los frutos (*Phomopsis spp.)* Podredumbres de los frutos (*Penicillium spp.)*	120 - 140 g/hl		Tratamiento post-cosecha: sumergir o pulverizar la fruta por un período de 5 minutos. Si las frutas presentan signos visibles de ataque, utilizar 450 g/hl.
	Sarna del naranjo dulce (*Sphaceloma fawcettii var.viscosa)*	1,5 - 3,0 kg/ha		Iniciar los tratamientos antes de la floración, y repetir a la caída de las 2/3 partes de los pétalos.
Cucurbitáceas	Antracnosis de las cucurbitáceas (*Colletotrichum lagenarium)*	30 - 60 g/hl	30	Iniciar los tratamientos cuando aparecen los primeros ataques. Repetir a intervalos de 7 a 14 días.
	Oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea)*	60 - 120 g/hl		
Frutales de carozo	Oídio del duraznero (*Sphaerotheca pannosa)*	1,5 kg/ha		Comenzar el tratamiento a botón rosado, y repetirlo después de la caída de los pétalos. Realizar otra aplicación a los 14 días.
	Sarna de los frutales de carozo (*Fusicladium carpophilum)*	1,8 kg/ha		
Frutales de pepita	Oídio del manzano y del peral (*Podosphaera leucotricha)*	15 - 20 g/hl		Comenzar los tratamientos a punta verde y repetir cada 7 a 14 días. Tratamientos de pre-cosecha: con la dosis menor, realizar una sola aplicación, entre 3 semanas y 1 día antes de la cosecha. Tratamientos de post-cosecha: con la dosis mayor, sumergir la fruta o pulverizarla durante 50 a 60 segundos. La suspensión debe cambiarse todos los días.
	Podredumbres (*Botrytis spp.)* Podredumbres de los frutos (*Gloeosporium spp.)* Podredumbres de los frutos (*Penicillium spp.)*	50 - 60 g/hl		
	Sarna del manzano (*Venturia inaequalis)*	15 - 20 g/hl		Comenzar los tratamientos a punta verde y repetir cada 7 a 14 días.
Frutilla	Antracnosis de la frutilla (*Colletotrichum fragariae)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)* Viruela de la frutilla (*Ramularia tulasnei)*	50 - 60 g/hl	15	Aplicar cuando la floración llega al 10% y en plena floración. Continuar a intervalos de 10 a 14 días.
Haba	Marchitamiento de las hortalizas (*Sclerotinia sclerotiorum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	1,5 - 2,0 kg/ha	28	Comenzar las aplicaciones con una floración del 25%, 50% y repetir a plena floración.
Lenteja	Oídio del poroto (*Erysiphe pisi)*	0,5 - 1,0 kg/ha		A comienzos de floración.
Maní	Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	0,28 kg/ha	14	Primera aplicación: cuando aparecen los primeros síntomas. Segunda aplicación: 15 días después.
Poroto	Antracnosis del poroto (*Colletotrichum lindemuthianum)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	40 g/hl	30	En general desde que nacen, con pulverizaciones preventivas cada 15 días.
Soja	Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)*	0,5 kg/ha	35	Primera aplicación: entre plena floración y comienzo de formación de vainas.

	Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*			Segunda aplicación: 15 días después.
Tomate	Viruela del tomate (*Septoria lycopersici)*	60 - 120 g/hl	20	Iniciar las aplicaciones cuando aparecen los primeros síntomas, y repetir a intervalos de 7 días.
Trigo	Golpe blanco del trigo (*Giberella zeae)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)*	0,5 kg/ha	35	Realizar dos aplicaciones: 1a) a la emergencia de las espiguillas. 2a) 7 a 14 días después.
Vid	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	120 g/hl	15	Iniciar los tratamientos con una floración del 5%. Repetir a los 14 días.

Información General:

Benomil es un fungicida sistémico. Su acción es preventiva y curativa, controlando a los hongos patógenos antes de su penetración en las plantas, o bien cuando la infección recién se ha producido.

Equipos y técnica de aplicación: en cultivos de bajo porte (plantas herbáceas) se puede aplicar con las pulverizadoras terrestres convencionales, provistas preferentemente de pastillas de cono hueco. Utilizar un caudal mínimo de 200 l/ha, con una presión de 60 a 80 libras/pulg2 (4 a 5,5 bar).
En montes frutales y viñedos, utilizar los equipos y caudales habituales para estos cultivos.
También se puede aplicar con equipos aéreos, utilizando un caudal no menor de 20 a 25 l/ha.

Compatibilidad: benomil es compatible con todos los plaguicidas, excepto los de reacción alcalina.

Restricciones de uso: el uso repetido y exclusivo de benomil puede resultar en la selección y desarrollo de razas tolerantes de ciertos patógenos, con la correspondiente disminución en la eficacia del fungicida.
Para evitar o disminuir este riesgo, se aconseja no utilizar benomil solo, sino en mezclas o en programas de tratamiento que incluyan otros fungicidas adecuados, de un grupo químico diferente y de un modo de acción distinto.

Derrames:
Barrer lentamente el producto derramado evitando generar polvo, recoger con pala y disponer en tambores para su disposición en sitios autorizados.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar anteojos, barbijo, guantes de goma o PVC, botas de goma y ropa adecuada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado 50%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 10000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL 50: > 10000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria (rata):	CL 50: > 4 mg/l.
Toxicidad aguda inhalatoria (perro):	CL 50: > 1.65 mg/l.
Irritación dermal (conejillo de Indias):	Levemente irritante.
Irritación ocular (conejo):	Leve irritación conjuntival.

Puede causar irritaciones en ojos, nariz, garganta y piel.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.
.