BETA - CIPERMETRINA

Nomenclatura Química:
beta-cipermetrina: mezcla en relación aproximada 2 : 3 de los isómeros (1Rcis) + (1Scis) y (1Rtrans)S + (1Strans)R de alfa-ciano-3-fenoxibencil-2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil)ciclorpropano-carboxilato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	30 - 40 cm3/ha	14	Tratamiento terrestre: cuando se observen 5 o más orugas/m2.
		50 - 60 cm3/ha		Tratamiento aéreo: cuando se observen 5 o más orugas/m2.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	75 - 100 cm3/ha		Cuando se observen 5 o más orugas/m2.
Algodón	Picudo del algodonero (*Anthonomus grandis)*	250 cm3/ha		Esta dosis se puede aplicar sobre el cultivo de algodón respetando la carencia o sobre su rastrojo.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	100 - 125 cm3/ha	30	Aplicar cuando el grado de infestación es de 5 orugas o más por planta. Utilizar las dosis mayores en cultivos densos de mucho follaje.
Lino	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)* Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	100 - 115 cm3/ha	20	Cuando se observen 5 o más orugas por planta.
Soja	Chinche verde (*Nezara viridula)*	50 - 60 cm3/ha	14	En mezcla solamente cuando haya más de 2 chinches por metro de surco, mezclando esta dosis con 500 cm3 de dimetoato 40%.
	Gata peluda norteamericana (*Spilosoma virginica)*	75 - 100 cm3/ha		Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación.
	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	40 - 50 cm3/ha		Cuando se observen 5 o más orugas/m2.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	50 - 75 cm3/ha		Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	80 - 140 cm3/ha		Antes de la floración con 15 isocas por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración cuando haya 10 orugas por metro lineal y más de 10% de daño al follaje.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	75 - 100 cm3/ha		Desde floración cuando haya 10 orugas por metro lineal y más de 10% de daño al follaje.
Trigo	Oruga desgranadora (*Faronta albilinea)*	75 cm3/ha	30	Al observar los primeros ataques.

Información General:

Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre varios lepidópteros y además posee acción de repelencia. Ejerce sus efectos sobre el sistema nervioso de los insectos, alterando el funcionamiento de las neuronas por su acción sobre el canal de sodio.

Equipos y técnica de aplicación: puede ser aplicado con cualquier máquina pulverizadora, aérea o terrestre perfectamente calibrada y provista de agitadores.

En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear volúmenes no inferiores a 15 a 20 litros por hectárea. En aplicaciones terrestres utilizar caudales para que el equipo y los picos empleados garanticen una distribución uniforme.

Compatibilidad: es compatible con los insecticidas y fungicidas de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina.

Derrames:
Inactivar con soda cáustica o cal. Adsorber con aserrín, tierra o arena e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su destrucción en sitios autorizados de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y aplicación usar ropa y elementos de protección: guantes impermeables y botas de goma, barbijo de tela para cubrir boca y nariz, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No aspirar las gotas de la aspersión. Lavarse bien con abundante agua y jabón después

de manipular el producto. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas.

Información Toxicológica:

Del principio activo:	
Toxicidad oral aguda (rata macho):	DL50: 178 mg/kg
Toxicidad oral aguda (rata hembra):	DL50: 166 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 1,97 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Riesgos ambientales:	
Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Extremadamente tóxico

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.
.